

「腎不全とくすりの使い方Q & A」の訂正

ご購入いただきました「腎不全とくすりの使い方Q & A」（平成17年4月10日発行）に下記の誤りがありました。お詫び致しますとともに、訂正下さいますようお願い申し上げます。

583頁 抗ウイルス化学療法剤：デノシン（ガンシクロビル）
「CLCr（mL/min）」の項目

【誤】

商品名 (一般名)	CLCr (mL/min)		
	> 50	10 ~ 50	< 10または透析
デノシン ガンシクロビル【内・ 注】	注射： 500mgを 12時間お き， 内服： 1,000mg を12時間 毎	注射： 500mgを 透析後に を24～48 時間おき， 内服： 1,000mg を24時間 毎	注射： 500mgを 透析後に を48～96時間おき，透析患者 では500mgを透析後に， 内服：500mgを1日おきに投 与，透析患者では1.25mg/kg を週3回透析後に 維持投与量：0.625mg/kgを 週3回透析後に（U）

【正】

商品名 (一般名)	CLCr (mL/min)		
	> 50	10 ~ 50	< 10または透析
デノシン ガンシクロビル【内・ 注】	注射： < 投与開始時 > 2.5mg/kgを12時間 おき < 維持投与 > 2.5mg/kgを24時間 おき 内服： 500mgを1日3回	注射： < 投与開始時 > 1.25～2.5mg/kg を24時間おき < 維持投与 > 0.625～1.25mg/kg を24時間おき 内服： 500mgを1日1～2 回	注射： < 投与開始時 > 1.25mg/kgを週3回 (透析患者は透析後) < 維持投与 > 0.625mg/kgを週3回 (透析患者は透析後) 内服： 500mgを週3回 (透析患者は透析後)