

「治療薬ハンドブック 2008—薬剤選択と処方のポイント」 お詫びと訂正

ご購入いただきました「治療薬ハンドブック 2008 - 薬剤選択と処方のポイント」(2008年1月発行)に下記の誤りがございました。お詫び致しますとともに、訂正くださいますようお願い申し上げます。

訂正箇所(頁数)	誤	正
執筆者一覧 解熱・鎮痛薬, 抗炎症薬(vi頁)	竹内 務	竹内 <u>勤</u>
アキネトン 品名, 規格単位欄(77頁)	錠 (塩酸塩)1mg, 2mg	錠 (塩酸塩) <u>1mg</u>
抗認知症薬 脳循環・代謝 改善薬 Topics欄(114頁)	2007年より, わが国でも高度アルツハイマー病に対して塩酸ドネペジル10mgが使用可能となった(5mgで1週間以上経過後)	2007年より, わが国でも高度アルツハイマー病に対して塩酸ドネペジル10mgが使用可能となった(5mgで <u>4週間以上経過後</u>)
ミケランLA 品名, 規格単位欄(162頁)	点眼液 10mg/mL(1%) : 5mL, 20mg/mL(2%) : 5mL	点眼液 10mg/mL(1%) : <u>2.5mL</u> , 20mg/mL(2%) : <u>2.5mL</u>
オリベス 品名, 規格単位欄(262頁)	注 [点滴](1%)2mg/200mL ▼	注 [点滴](1%) <u>2g</u> /200mL ▼
リドカイン (ジェネリック)欄(262頁)	パートラン, フリードカイン, アネトカイン, メドカイン	削除
亜硝酸アミル 品名, 規格単位欄(278頁)	亜硝酸アミル	亜硝酸アミル 吸入 <u>0.25mL</u>
コデインリン酸塩水和物 投与日数制限欄(376頁)	末 散 10mg/g(1%), 100mg/g(10%) 錠 5mg, 20mg	末 <u>14日</u> 散 10mg/g(1%), 100mg/g(10%) <u>14日</u> (1%除く) 錠 5mg, 20mg <u>14日</u> (5mg除く)

訂正箇所(頁数)	誤	正
ジヒドロコデインリン酸塩 投与回数制限欄(377頁)	散 0.01g/g(1%), 0.1g/g(10%) 14日	散 0.01g/g(1%), 0.1g/g(10%) 14日 (1%除く)
テオフィリン 臨床情報欄(401頁)	TDM：有効域 10(5)～20 mg/mL, 中毒域20mg/mL以上.	TDM：有効域 10(5)～20 <u>μg/mL</u> , 中毒域20 <u>μg/mL</u> 以上.
ラフチジン 警告, 禁忌, 副作用等欄(452頁)	排泄 腎排泄	排泄 <u>肝</u> 排泄
ジスチグミン臭化物 適応, 用法・用量欄(685頁)	1日5～20mgを1～4回に分服。1日5gから開始	1日5～20mgを1～4回に分服。1日 <u>5mg</u> から開始
カルタゾン 品名, 規格単位欄(792頁)	細 100mg/g(10%) [▼]	細 100mg/g(10%) [▼] 錠 30mg [▼]
アスピリン・ダイアルミネート ジェネリック 欄(812頁)	イスキア, バッサミン	<u>バッサミン, アスファネート, ニトギス, ファモター</u>
アスピリン・ダイアルミネート ジェネリック 欄(956頁)	アスファネート, イスキア, ニトギス, バッサミン, ファモター	<u>イスキア, バッサミン</u>
ロキソプロフェンナトリウム ジェネリック 欄(963～964頁)	ウナスチン, オキミナス, オロロックス [●] , カンファタニン, ケンタン, コバソニン [■] , コパロキニン, サンロキソ, シラブル, スリノフェン, ツルメリン, ノブフェン, ポナベルト, リングリーズ, レトラック, ロキソート, ロキソプロフェン, ロキソプロフェンナトリウム, ロキプロナール	ウナスチン, オキミナス, オロロックス [●] , カンファタニン, ケンタン, コバソニン [■] , コパロキニン, サンロキソ, シラブル, スリノフェン, ツルメリン, ノブフェン, ポナベルト, リングリーズ, レトラック, ロキソート, ロキソプロフェン, ロキソプロフェンナトリウム, <u>ロキプロナール, ロキフラン, ロゼオール, ロルフェナミン, ロブ, ロキベイン, ロキソマリン, ロキフェン</u>

訂正箇所(頁数)	誤	正
アセトアミノフェン 適応, 用法・用量 欄(974頁)	<p>シ 小児科領域の解熱 →小児に1回10mg/kgを発熱時, (1日最高)15mg/kg, 原則として1 日2回まで, 空腹時の投与は避け させることが望ましい。6~12歳 200mg, 3~5歳140mg, 1~2歳 100mg, 6~11カ月80mg, 3~5 カ月60mg 坐(シ参照) →1日1回直腸内に挿入。6~12歳 100~200mg, 3~5歳100mg, 1~ 2歳50~100mg, 1歳未満50mg</p>	<p>未細錠シ 小児科領域の解熱・ 鎮痛 →小児に1回10~15mg/kg. 投与 間隔4~6時間以上(1日最高)60mg/ kg. 空腹時の投与は避けさせる ことが望ましい。 坐(シ参照) →1回10~15mg/kg直腸内に挿入。 投与間隔4~6時間以上(1日最高) 60mg/kg.</p>
非ピリン系感冒薬 品名, 規格単位欄 (978頁)	ペレックス16	ペレックス1/6
セフジニル 臨床情報欄(1110頁)	<p>小児 鉄と赤色のキレートを形成 するためインクレミンシロップ との併用で吸収が10%低下, また 粉ミルク等の含有鉄分でおむつ の便, 尿が赤色を帯びることがあ る。併用は本剤投与後3時間あけ る</p>	<p>小児 鉄と赤色のキレートを形成 するためインクレミンシロップ との併用で吸収が10%にまで低 下。併用は本剤投与後3時間以上 あける。また粉ミルク等の含有 鉄分でおむつの便, 尿が赤色を 帯びることがある。</p>
サラゾスルファピリ ジン (ジェネリック) 欄 (1179頁)	アザスルファン, エミナピリン, サフィルジンEN, スラマ, ソ アレジン, ラノフェン	エミナピリン, スラマ, ラノフ エン
バラシクロピル塩 酸塩 適応, 用法・用量 欄(1217頁)	<p>④水痘 →成人・(錠のみ)体重40kg以上の 小児:1回1gを1日3回 (顆のみ)小児:1回25mg/kgを1日 3回(1日最高)1g</p>	<p>④水痘 →成人・(錠のみ)体重40kg以上の 小児:1回1gを1日3回 (顆のみ)小児:1回25mg/kgを1日 3回(1回最高)1g</p>
ベクロメタゾンプロ ピオン酸エステル (ジェネリック) 欄 (1304頁)	アルロイヤー, イベ, タウナス, タウナスアクア, ナイスピー, ナナドラ, ベクラシン, ベクラ ズン, ベクローゼAQ, ペンプ リンAQ, アルベゾン, エスペ タットAQ, マイリー	削除

訂正箇所(頁数)	誤	正
硫酸バリウム ジェネリック 欄 (1377頁)	エネマスター, バリエネマ, バリエネマHD, バリエネマLC, バロプロジェクト, バロスパース	削除

2008.9.1 株式会社じほう