

薬効・薬価リスト平成 20 年版追補

(平成 20 年 4 月 11 日及び平成 20 年 4 月 18 日告示分)

【訂正】

web でご案内している「薬効・薬価リスト 平成 20 年版 新医薬品情報のご案内」の「平成 20 年 4 月 11 日及び平成 20 年 4 月 18 日告示分」について、用法の箇所において誤りがありました(下記【誤】下線部)。下記の通り訂正するとともに、お詫び申し上げます。

【誤】

クレキサン皮下注キット 2000IU (サノフィ・アベンティス)	2,000 低分子 ヘパリン国際単位 0.2mL1 筒	劇 1,037
3334406G1020 / 620006786		

3334 血液凝固阻止剤 エノキサパリンナトリウム

適応 次の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 / 股関節全置換術, 膝関節全置換術, 股関節骨折手術。

用法 1 回 200 IU, 原則として 12 時間ごとに 1 日 2 回連日皮下注。

注) 原則として術後 24 ~ 36 時間に手術創等からの出血がないことを確認してから開始。

禁忌 本剤(成分)・ヘパリン, ヘパリン誘導体(低分子量ヘパリン等)に過敏症の既往歴 出血している者(頭蓋内出血, 後腹膜出血又は他の重要器官における出血等) 急性細菌性心内膜炎 重度の腎障害(クレアチニンクリアランス 30mL/分未満) ヘパリン誘発性血小板減少症(HIT)の既往歴

【正】

クレキサン皮下注キット 2000IU (サノフィ・アベンティス)	2,000 低分子 ヘパリン国際単位 0.2mL1 筒	劇 1,037
3334406G1020 / 620006786		

3334 血液凝固阻止剤 エノキサパリンナトリウム

適応 次の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 / 股関節全置換術, 膝関節全置換術, 股関節骨折手術。

用法 1 回 2000 IU, 原則として 12 時間ごとに 1 日 2 回連日皮下注。

注) 原則として術後 24 ~ 36 時間に手術創等からの出血がないことを確認してから開始。

禁忌 本剤(成分)・ヘパリン, ヘパリン誘導体(低分子量ヘパリン等)に過敏症の既往歴 出血している者(頭蓋内出血, 後腹膜出血又は他の重要器官における出血等) 急性細菌性心内膜炎 重度の腎障害(クレアチニンクリアランス 30mL/分未満) ヘパリン誘発性血小板減少症(HIT)の既往歴