

「OTC医薬品事典 第11版」正誤情報および追補情報について

ご購入いただきました「OTC 医薬品事典 第11版」(平成20年4月25日発行)に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正申し上げます。

また、本書掲載製品のうち、平成20年5月21日薬食発第0521001号により指定された指定第二类医薬品に該当する製品を一覧にまとめましたので、ご利用ください。

●正誤情報および追補情報は[こちら](#)から

「OTC医薬品事典 第11版 ー追補版ー」のご案内

平成21年1月に実施した製品調査に基づき、「OTC医薬品事典 第11版 ー追補版ー」を作成いたしました。前版まではメールサービスにより提供しておりましたが、今版では、さらに見やすくするために、PDFファイルにて提供いたします。

●製品情報は[こちら](#)から

●索引は[こちら](#)から

「OTC 医薬品事典 第 11 版」正誤表

ご購入いただきました「OTC 医薬品事典 第 11 版」(平成20年4月25日発行)に誤りがございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正申し上げます。

平成 20 年 9 月 株式会社じほう

該当箇所	誤	正
カラーページ (知っておきたいクスリの知識) p29	2006 年に「成分：トリアムシノロンアセトニド、薬効分類：口内炎治療薬」を追加	
50音順索引 p13	キューピーコーワゴールド〔新〕 ③	キューピーコーワゴールド〔新〕 ②
50音順索引 p18	新キューピーコーワゴールド ③	新キューピーコーワゴールド ②
50音順索引 p22	ネオ・シーダー ③	ネオシーダー ②
50音順索引 p24	ファンテユンケル ②	ファンテユンケル ③
50音順索引 p27	ユンケルジュニア ③	ユンケルジュニア (部外品)
会社名別索引 p31	ネオ・シーダー ③	ネオシーダー ②
会社名別索引 p36	新キューピーコーワゴールド (固形剤) ③	新キューピーコーワゴールド (固形剤) ②
会社名別索引 p40	ファンテユンケル (液剤) ②	ファンテユンケル (液剤) ③
会社名別索引 p40	ユンケルジュニア (液剤) ③	ユンケルジュニア (液剤) (部外品)
成分索引 p89	セルラーゼ AP (消炎酵素剤)	セルラーゼ AP3 (消化酵素剤)
製品情報 p108 ネオ・シーダー	製品名：ネオ・シーダー 区分：第 3 類医薬品	製品名：ネオシーダー 区分：第 2 類医薬品
製品情報 p571 ファンテユンケル	区分：第 2 類医薬品	区分：第 3 類医薬品
製品情報 p576 ユンケルジュニア	薬効分類：ビタミン含有保健薬／液剤	薬効分類：新範囲医薬部外品／ビタミンを含有する保健薬
製品情報 p585 新キューピーコーワゴールド	区分：第 3 類医薬品	区分：第 2 類医薬品
製品情報 p699 アロパノール	効能・効果：虚弱な体質で神経がたかぶる方の次の諸症：神経症，不眠症，小児夜なき，小児疳症	効能・効果：虚弱な体質で神経がたかぶる方の次の諸症：神経症，不眠症
巻末「お客様相談窓口」一覧 グラクソ・スミスクライン(株)	コンシューマーヘルスケア事業本部	お客様相談室
巻末「お客様相談窓口」一覧 第一三共ヘルスケア(株)	〒 103-0015 中央区日本橋箱崎町 36-2	〒 103-8541 中央区日本橋小網町 1-8

指定第二類医薬品一覧

本書掲載製品のうち、平成20年5月21日薬食発第0521001号により指定された指定第二類医薬品に該当する製品は下記のとおりです。薬効ごとに製品名の50音順で配列しています。

<ul style="list-style-type: none"> ●解熱鎮痛薬 頁 イブA錠 10 イブクイック頭痛薬 10 エキセドリンA錠 10 エキセドリンカプセル 11 グレランエース錠 11 解熱鎮痛ソフトカプセルA 11 ケロリン 12 ケロリンIBカプレット 12 ケロリンチュアブル 12 コンジスイとんぶく 12 サリドンA 13 サリドンエース 13 歯痛頭痛ヒロリン 13 歯痛リングル 13 シベラEV 13 小中学生用ノーシンピュア 13 新セデス錠 14 新バトシック錠 14 新リングル 14 スパシオンS 14 スバロミンエース 15 セデスV 15 セデスキュア 15 セデス・ハイ 15 セミドン顆粒 15 大正トンプク 15 ナロンエース 16 ナロンエースプラス 16 ナロン顆粒 16 ナロン錠 17 ナロンフレッシュC 17 ネスパンEV 17 ノーシン 17 ノーシン「細粒」 17 ノーシン錠 17 ノーシンピュア 18 ノーシンホワイト(細粒) 18 ノーシンホワイト錠 18 ノノン錠 18 バイエルアスピリン 18 ハイタミン錠 18 ハッキリエースa 19 バファリンA 19 バファリン顆粒 19 バファリンプラス 19 バファリンプラスカプセル 19 バファリンルナ 19 フツナロンEV錠 20 ベネスロン 20 ヘルピック鎮痛薬 20 ベレタック顆粒 20 ミグソフト 20 メリドンEV錠 21 「モリ」ハイツウ錠 21 ユニー 21 リングルAP 21 ロペラエース 22 	<ul style="list-style-type: none"> アルペンSこどもかぜシロップ 33 アルペンこどもかぜ薬J細粒 33 アルペンこどもかぜ薬K細粒 33 アルペンこどもかぜシロップ 33 アルペンゴールドカプセル 33 ウィーブエース錠 34 エスタックNT顆粒 34 エスタックNT錠 34 エスタックSR錠 34 エスタックイブ 34 エスタックイブ顆粒 35 エスタックゴールド錠 35 エスタックシロップ「小児用」 35 エスタック総合感冒 35 改源 36 改源かぜカプセル 36 学童ストナ 36 カコナルこどもシロップa 37 カコナルゴールドUP錠 37 カゼピタンゼリー 37 カゼンエース 38 顆粒ネオ真治S 38 キッズバファリンかぜシロップO 38 キッズバファリンかぜシロップP 38 キッズバファリンかぜシロップS 38 キューソフトG 39 KTかぜシロップこども用 40 ケンエーコフコール 40 こどもアナクルシロップ 40 こどもストナサット 40 コルゲンコーワIB錠 40 コルゲンコーワIB透明カプセル 40 コルテックかぜ錠 41 コンタック総合かぜ薬昼・夜タイプ 41 コンタック総合感冒薬 41 JPSかぜ1号錠 41 JPSかぜ2号錠 42 JPSかぜ5号錠 42 JPSかぜ6号錠 42 JPSかぜ7号錠 42 JPSかぜ薬(1号)N 42 JPSかぜこどもシロップ 43 ジキニンC 43 ジキニン顆粒A 43 ジキニン顆粒エース 44 ジキニン錠エースIP 44 小児用エスタックシロップ 44 小児用かぜシロップ三宝 44 小児用新ストナシロップ 44 小児用新マイフェロンシロップ 44 小児用ヒストミンセーフシロップ 45 小児用ロン三宝シロップA 45 小児用ロン三宝シロップB 45 新アナクル 45 新エスタックI2 46 新エスタックL錠 46 新エスタック「W」 46 新エスタックイブエース 46 新エスタックイブエースカプセル 46 新エスタックイブエース顆粒 46 新エスタック顆粒 47 新かぜゴールド顆粒 47 新グロンビターSゴールド 47 	<ul style="list-style-type: none"> 新コルゲンコーワかぜカプセル 47 新コルゲンコーワかぜ錠 47 新コンタックかぜ総合 47 新ジキニン顆粒 48 新ジキニン錠D 48 新小児ジキニンシロップ 48 新セビー液「小児用」 48 新ヒストミンカプセルS 48 新ルルAゴールド 49 新ルルAゴールドカプレット 49 新ルルAゴールド細粒 49 新ルル-A錠 49 新ルル-K細粒 50 新ルル-K錠 50 スズレックスD 50 スズレックス顆粒S 50 スズレックスシロップ(小児用) 50 ストナT 51 ストナT顆粒 51 ストナアイビー 51 ストナアイビー顆粒 51 ストナアイビージェル 51 ストナ三層 51 ストナジェルカプセル 52 ストナジェルサイナスS 52 ストナシロップA「小児用」 52 ストナシロップA小児用 52 ストナデイトタイム 52 ストナデイトタイムカプセル 53 ストナプラス2 53 ストナプラス2顆粒 53 セビーかぜハーフ錠 53 セビーゴールドカプセル 53 セビーゴールド顆粒 54 タイムコールド錠 54 ネオ真治カプセル 55 ハイカゼC 55 ハイカゼ顆粒a 55 バイロンa 55 バファリンジュニアかぜ薬 56 パブロンAG錠 56 パブロンN 56 パブロンN錠 56 パブロンS 56 パブロンSC 57 パブロンSC錠 57 パブロンSゴールド錠 57 パブロンSゴールド微粒 57 パブロンS錠 57 パブロンS小児液 58 パブロンエース顆粒 58 パブロンエース錠 58 パブロン(学童用) 59 パブロンゴールドA錠 59 パブロンゴールドA微粒 59 ヒストミンV 59 ヒストミンエースカプセルS 59 ヒストミンエース錠S 59 ヒストミンエース錠ハイ 60 ヒストミンかぜ液 60 ヒストミン「顆粒」 60 ヒットミンホワイト 60 フジコールドカプセル 61
<ul style="list-style-type: none"> ●かぜ薬 頁 アナクルエース 32 アネトンi総合感冒錠 32 アルペンFこどもかぜシロップ 33 		

フジコールド錠	61
プレコールド錠	61
プレコールド持続性カプセル	61
プレコールド持続性錠	61
プレコールド持続性ファミリー錠	62
ベラックコールド3	62
ベラックコールドTD錠	62
ベラックコールドTM顆粒	62
ヘルピックス顆粒	63
ヘルピックス顆粒・ゴールド	63
ベンザエースA	63
ベンザエースA錠	63
ベンザブロックIP	63
ベンザブロックIP細粒	63
ベンザブロックIP錠	64
ベンザブロックL	64
ベンザブロックL錠	64
ベンザブロックS	64
ベンザブロックS錠	64
マビロン顆粒	64
ムヒのこどもかぜ顆粒	65
ムヒのこどもかぜシロップP	65
ムヒのこどもかぜシロップS	65
リクレスかぜEV錠	65
リリス総合感冒薬	65
ルッケルソフトシロップ(小児用)	66
ルッケル総合感冒薬(錠)	66
ルルアタックIB	66
ロン三宝IP顆粒	67
ロン三宝IP錠	67
ロン三宝K顆粒	67
ロン三宝S錠	67
ワクナガフジコールド錠	68
●睡眠改善薬	
グ・スリーP	78
ドリエル	78
ドリエルEX	78
ドリーミオ	78
ナイトール	78
ネオデイ	78
ハルナー	78
マイレストS	79
●内服肩こり薬	
ドキシン錠	88
●その他の精神神経用薬	
コリホグス	88
●鎮咳去たん薬	
浅田飴	96
浅田飴子供せきどめドロップ	96
浅田飴子供せきどめドロップS	96
浅田飴せきどめ	96
浅田飴せきどめCL	96
浅田飴せきどめシロップ	96
アストフィリンS	97
アドレニンエース錠	97
アドレニンエースシロップ	97
アドレニンエースシロップ小児用	97
アナクールせき止め	97
アナクールせき止めZ液	97
アナクールせき止めZ液 分包	98
アナクールせき止めZ錠	98
アルペンFこどもせきどめシロップ	98
アルペンSこどもせきどめシロップ	98
エスエスプロン「カリュー」	99
エスエスプロン錠	99
改源咳止液W	99
キッズバファリンせきどめシロップS	99
クールワンせき止め	100

固形浅田飴クールS	100
固形浅田飴ニッキS	100
固形浅田飴パッションS	100
コデブロン「液剤」S	101
コデボン	101
こどもアナクールせき止め	101
こどもパブロンせき止め液	101
コルゲンコーワ咳止め液	101
散剤せきどめ「廣貫堂」	102
ジキニン液D	102
ジージーコデイン液	102
ジージーコデイン糖衣錠	102
小児用エスエスプロン液エース	102
小児用ヒストミンせき止めシロップS	102
新エスエスプロン錠エース	103
新トニン咳どめ	103
新トニン咳どめ液	103
新フステノン	103
新ブロン液エース	103
新ルビカップ	104
せきこえのどドロップYP〈A〉	104
せきこえのどドロップYP〈L〉	104
セキセチンSP錠	104
セキセチン咳止め	105
せきどめカプセル「廣貫堂」	105
咳止めフツナロンA	105
セキピタンSP	105
セビーせき止め液L	105
セビーせき止めカプセル	106
セビーせき止め顆粒	106
セフルセきどめ錠	106
ゼリアせき止めシロップ「小児用」	106
セルせき止め液	106
チミコデシロップN	106
ドッペル錠D	107
ドッペル錠せきどめ	107
トニン咳どめ液D	107
トニン咳どめ液「小児用」	107
トニン咳止サット	108
トニン咳止錠	108
南草舎利別	108
ネオシーダー	108
ノドカクサンEH	108
パブロンSせき止め	109
パブロンせき止め	109
ヒストミンせき止め	109
ヒストミンせき止め液	109
ピソルボンせき止め液	110
ヒットミンせき止めカプセル	110
フスコンZ液	110
プロコデせき止め液	110
プロコデせき止め錠	110
ベラックススイート バインS	110
ベラックススイート ブルーベリーS	111
ベラックススイート ライムS	111
ベリコデエース錠	111
ベリコデ咳シロップ	111
ベリコデ咳シロップ小児用	111
ベリコデせきどめ顆粒	111
ベンザブロックせき止め液	112
ベンザブロックせき止め錠	112
マビロンせき止め液	112
マビロンせき止め錠	112
ミルコデシロップ	113
ムヒのこどもせきどめシロップ	113
「モリ」ゼンチー錠	113
ユアシロップ12	113
龍角散せきどめ液A	114
龍角散せき止め錠	114
ルッケルせき止めカプセル	114
ルッケルエスローチ	114
ルルせき止めミニカプセル	114

●止しゃ薬(下痢止め)	
イノック下痢止め	198
シグナル下痢止め	198
ビタリット	201
マルビー下痢止めS	201
ロベラマックサット	202
●胃腸鎮痛鎮痙薬	
新イノンU	209
ナルコリン「カプセル」	209
●便秘薬	
ウイズワン	228
ウイズワンα	228
ウイズワンエル	228
ウイズワンプラス	228
ウエストン・S	229
ウエストン・ハイ	229
ウエストンファイバー	229
快通丸	229
快腹丸	230
カイベールC	230
健のう丸	230
小太郎漢方の生薬便秘薬	231
コーラックハーブ	231
コーラックファイバー	231
サトラックス	232
サトラックス・チョコタブ	232
サトラックスビオファイブ	232
サトラックス「分包」	232
三快錠	233
新サラリン	233
新ドクソウガンG	233
スルーラックBB	234
スルーラックS	234
スルーラックプラス	234
デタールA	235
ドクソウガンE便秘薬	235
ビオミットS	236
ビフィーナ便秘薬	236
ロンターゼリズム	237
●内服アレルギー用薬	
スラジン	249
スラジンA	249
スラジンシロップ	250
●鼻炎用内服薬	
アナクール鼻炎錠	310
アナトナルメディ鼻炎錠	310
アルガード鼻炎ソフトカプセルEX	311
アルペンFこども鼻炎シロップ	311
アルペンSこども鼻炎シロップ	311
キッズバファリン鼻炎シロップS	312
コルゲンコーワ鼻炎持続カプセル	313
コンタック600プラス	313
JPS鼻炎錠	314
ジキニン鼻炎AG顆粒	314
スカイナー鼻炎錠	314
ストナリニシロップ小児用	315
セビー鼻炎ソフトN	315
ダン鼻炎錠	315
パブロン鼻炎カプセルS	315
パブロン鼻炎カプセルS小児用	316
パブロン鼻炎錠S	316
鼻炎PEソフトカプセル	316
ヒストミン鼻炎カプセルLP	317
プラタギン鼻炎カプセルS	317
プラタギン鼻炎シロップS	317
プレコールド持続性鼻炎カプセルL	318
ベンザ鼻炎薬α(1日2回タイプ)	318
ムヒのこども鼻炎シロップ	318

ルックエス鼻炎カプセル	319
ルル鼻炎ミニカプセル	319
●乗物酔い薬 頁	
アネロン「キャップ」	325
アネロン「ニスキャップ」	325
エアミットサットF	325
●その他の感覚器官用薬 頁	
ナリピタン	331
●痔疾用坐薬 頁	
エスジールAE坐剤	363
サノールA坐剤	363
サブス坐剤	363
新エフレチンK(坐剤)	363
新コリミジン坐剤	363
ドルマインH坐剤	364
ブリザS	364
ブリザSハイ	364
ブリザエース坐剤	364
ヘルス坐剤	364
ヘルミチンH坐剤	364
ボラギノールA坐剤	364
メンソレータムリシーナ坐剤A	365
リナロンL	365
レックS坐剤	365
●痔疾用軟膏 頁	
エスジールAE軟膏	365
サノールA軟膏	365
サブス軟膏	366
ジーフォーL注入軟膏	366
新エフレチンK軟膏	366
新コリミジン軟膏	366
ドルマインH軟膏	366
ブリザS軟膏	366
ブリザSハイ軟膏	367
ブリザエース注入軟膏	367
ブリザエース軟膏	367
ヘルスG軟膏	367
ヘルス注入軟膏	367
ボラギノールA注入軟膏	368
ボラギノールA軟膏	368
メンソレータムリシーナ注入軟膏A	368
メンソレータムリシーナ軟膏A	368
リナロン痔軟膏	368
レックS軟膏	369
●痔疾用内服薬 頁	
ブジバインH錠	370
ヘルスカプセル	370
●外用殺菌消毒薬 頁	
マキロンSかゆみどめ液	379
●外用化膿性疾患用薬 頁	
ドルマイコーチ軟膏	383
●外用湿疹・皮膚炎用薬 頁	
アインK軟膏	426
アレルギールSK	426
アレルギールクリーム	426
アレルギールジェル	426
ウナコーワA	427
エスアランHクリーム	427
エスアランH軟膏	427
エマゼンクリーム	427
エマゼン軟膏	427
エマゼンローション	427
MOPバノア軟膏	427

エンクロン クリームEX	428
エンクロン 軟膏EX	428
オイチミン	428
オイチミンD	428
オイチミンクリーム	428
オイチミン「ローション」	428
オイラックスA	429
オイラックスPZクリーム	429
オイラックスPZ軟膏	429
オイラックスデキサS軟膏	429
カユミックアルファクリーム	429
カユミックアルファ軟膏	429
ギルメサゾンS	429
キンカン ルギンクリーム	430
シオノギD軟膏	430
新サニアゾLD	430
セロナクリーム	431
セロナソフト	431
セロナ軟膏	431
セロナローション	431
テレスハイクリーム	433
テレスハイ軟膏	433
テレスハイローション	433
ヒフールTクリーム	433
ヒフールT軟膏	433
ピロッドD	434
ピロッドXPクリーム	434
プレカクリーム	434
プレバリンαクリーム	434
プレバリンα軟膏	434
ベロナ・コーチゾン軟膏	435
メンソレータムAPソフトローション	436
メンソレータムメデイクイッククリームn	436
メンソレータムメデイクイック軟膏n	436
ラリエイ	438
ラリエイ軟膏	438
リビメックスコーワクリーム	438
リビメックスコーワ軟膏	438
リビメックスコーワローション	438
ロコイダンクリーム	438
ロコイダン軟膏	439
ロバックHi	439
ワクナガキョーチルベSクリーム	439
ワーボンプラス軟膏	440
●かゆみ・虫さされ用薬 頁	
ウナコーワα	446
液体ムヒS2a	446
液体ムヒアルファEX	446
タクトプラスクリーム	447
タクトプラスゼリー	447
プロタッチ	448
マキロンパッチエース	448
ムヒアルファEX	448
ムヒアルファS1	448
メモかゆみどめクールジェル	449
●水虫・たむし用薬 頁	
アトラントエース液	461
アトラントエースクリーム	461
スコルバEX	463
スコルバEX液	463
スコルバEXクリーム	463
セラミアクリーム	464
セラミアスプレー	464
ダマリンエース	465
ダマリンエース液	465
ダマリングランデ	466
ダマリングランデ液	466
ダマリングランデスプレー	466
タムシール液	466

タムシールクリーム	466
タムシールスプレー	466
トークール	467
トークール液	467
バリアクトH液	468
バリアクトHクリーム	468
ビボンエース液	469
ビボンエースクリーム	469
ブテナロックV エアー	469
ブテナロックV 液	470
ブテナロックV クリーム	470
ブテナロックV スプレー	470
メンソレータムエクシブクリームc	470
メンソレータムエクシブスプレーc	471
ラマストンMX2	471
ラマストンMX2液	471
ラマストンMX2ジェル	471
ラマストンMX液	471
ラマストンMXクリーム	471
ラマストンMXジェル	471
ラミシールAT液	472
ラミシールATクリーム	472
ラミシールATジェット	472
ラミシールAT噴霧液(スプレー)	472
ラミシールプラス液	472
ラミシールプラスクリーム	473
ラミシールプラスジェット	473
●真菌性・トリコモナス性皮膚炎用薬 頁	
強力トリコマイシンG	489
●女性用保健薬 頁	
ラムールQ	499
●ビタミンA主薬製剤 頁	
ステイタスA	516
●ビタミンAD主薬製剤 頁	
アイメートビゅん	535
アイリスエース錠	535
チョコラAD	535
ノアールADチュアブル	535
マイヴィーナスACED	535
●ビタミン含有保健薬(固形剤) 頁	
新キュービーコーワゴールド	585
パンピタンハイ	587
ビタミンネゴールド	588
フロロミンエース	588
マルチビタミンゴールドA	588
マルチビタミンゴールドEX	589
●その他の滋養強壮保健薬 頁	
ドックマン	603
●その他の漢方薬 頁	
越婢加朮湯エキス錠	697
十神湯分包顆粒	698
続命湯エキス散「コタロー」	698
●生薬製剤 頁	
カンボアズマ	699
再春痛散湯エキス顆粒	700
痛散湯	700
「モリ」シンニョウ錠	702
●禁煙補助薬 頁	
ニコレット	703
ニコレットクールミント	703
ニコレット・ミント	703

解熱鎮痛薬

コンビネートA錠
(龍角散)

かぜに伴う頭痛や発熱などの
症状に特化した解熱鎮痛薬

区分 第2類医薬品
成分 錠 3錠中：
アセトアミノフェン……………900mg
ケイヒ末……………102mg
添加物 エチルセルロース、セルロース、ステアリン酸Mg
効能 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おく
製剤 淡黄色の素錠
包装・価格 10錠 800円
その他 2008年11月1日発売
販売 総合メディカル

サリドンWi
(第一三共ヘルスケア)

イブプロピルアンチピリン、
イブプロフェンを配合

区分 第2類医薬品
成分 錠 1錠中：
イブプロピルアンチピリン……………150mg
イブプロフェン……………50mg
無水カフェイン……………50mg
添加物 クロスCMC-Na、ヒプロメロース、セルロース、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、タルク、乳糖水和物
効能 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱
用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は6時間以上おくこと
製剤 白色の錠剤
包装・価格 10錠 1,050円☆・20錠 1,785円☆
その他 2008年4月14日発売

かぜ薬

エスタックイブファイン
顆粒

(エスエス製薬)

アンプロキシール塩酸塩配合
顆粒タイプのかぜ薬

区分 第1類医薬品
成分 顆 1包中：
イブプロフェン……………150mg
アンプロキシール塩酸塩……………15mg
ジヒドロコデインリン塩酸塩……………8mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20mg
ヨウ化イソプロパミド……………2mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.5mg
無水カフェイン……………25mg
アスコルビン酸(ビタミンC)……………100mg
チアミン硝酸塩
(ビタミンB₁硝酸塩)……………8mg
添加物 CMC-Ca、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、タルク、酒石酸、サッカリンNa、l-メントール、ビタミンB₂、香料
効能 かぜの諸症状(発熱、悪寒、せき、たん、のどの痛み、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
用法・用量 成人(15才以上)1回1包を、1日3回食後なるべく30分以内に服用
製剤 帯黄白色顆粒剤
包装・価格 10包 1,680円
その他 2008年7月22日発売

コルゲンコーワIB
「1日2回」Tカプセル
(興和)

イブプロフェンを配合した、
1日2回服用タイプのかぜ薬

区分 指定第2類医薬品
成分 包 2カプセル中：
イブプロフェン……………200mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……………1.75mg
ヨウ化イソプロパミド……………2.5mg
デキストロメトルフアン臭化水
素酸塩水和物……………24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………30mg
無水カフェイン……………37.5mg
添加物 D-マンニトール、セルロース、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、タルク、ヒプロメロース、二酸化ケイ素、クエン酸トリエチル、黄色五号、酸化チタン、ラウリル硫酸Na、ゼラチン
効能 かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、

鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル、1日2回、朝夕食後なるべく30分以内に服用
製剤 黄赤色不透明と無色透明の硬カプセル
包装・価格 8カプセル 1,200円・12カプセル 1,600円・16カプセル 2,000円
その他 2008年7月1日発売
販売 興和新薬

小児用ヒストミン
かぜシロップS
(小林薬品工業)

3種類の生薬エキス配合のシ
ロップ剤

区分 指定第2類医薬品
成分 内液 30mL中：
アセトアミノフェン……………300mg
マレイン酸クロルフェニラミン……………2.5mg
リン酸ジヒドロコデイン……………8mg
dl-塩酸メチルエフェドリン……………20mg
グアイフェネシン……………45mg
無水カフェイン……………25mg
カンゾウエキス……………60mg
キキョウ流エキス……………0.3mL
ナンテンジツ流エキス……………0.36mL
添加物 白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、安息香酸Na、パラベン、香料、グリセリン、プロピレングリコール
効能 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
用法・用量 3～6才1回5mL、1～2才1回3.5mL、1日3回食後なるべく30分以内に服用。また、必要な場合には就寝前に用いてもよく、やむを得ない場合には、約4時間の間隔をおいて6回まで服用できる。添付の目盛付コップではかり服用
製品特有の注意 まれに沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する
製剤 淡褐色の液体
包装・価格 30mL1本 500円
その他 2008年11月発売

パイロンハイ
(塩野義製薬)

IPA+生薬配合 総合かぜ薬

区分 指定第2類医薬品
成分 錠 9錠中：
イブプロピルアンチピリン……………300mg

アセトアミノフェン……………450mg
 臭化水素酸デキストロメトルフアン… 48mg
dl-塩酸メチルエフェドリン…………… 60mg
 カンゾウエキス…………… 140mg
 (原生薬換算量：1,000mg)
 オウヒエキス…………… 120mg
 (原生薬換算量：2,000mg)
d-マレイン酸クロルフェニラミン…3.5mg
 無水カフェイン…………… 75mg
〔添加物〕 結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、フマル酸、ステアリン酸、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール6000、酸化チタン
〔効能〕 かぜの諸症状(発熱、せき、たん、頭痛、のどの痛み、悪寒、くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回3錠。1日3回。食後なるべく30分以内に服用
〔製剤〕 白色のフィルムコーティング錠
〔包装・価格〕 27錠 1,410円・45錠 1,886円
〔その他〕 2008年2月19日発売

パブロン50
 (大正製薬)

のどの痛み・せきに

〔区分〕 第2類医薬品
〔成分〕 錠 3錠中：
 アセトアミノフェン…………… 300mg
 グアヤコールスルホン酸カリウム……………83.33mg(9錠中250mg)
 デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物…………… 16mg
〔添加物〕 乳糖、セルロース、無水ケイ酸、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、タルク、カルナウバロウ
〔効能〕 かぜの諸症状(のどの痛み、せき、たん、頭痛、発熱、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
〔用法・用量〕 15才以上1回3錠、1日3回食後なるべく30分以内に服用
〔製剤〕 白色のフィルムコート錠
〔包装・価格〕 63錠 1,410円
〔その他〕 2008年9月25日発売

鎮咳去たん薬

浅田飴
子供せきどめドロップY
 (浅田飴)

シュガーレスタイプの子供用
 せきどめドロップ剤

〔区分〕 指定第2類医薬品
〔成分〕 12錠中：
dl-メチルエフェドリン塩酸塩………… 25mg
 クレゾールスルホン酸カリウム… 90mg
 セチルピリジニウム塩化物水和物…3mg
〔添加物〕 還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、ビタミンC、アセスルファミンK、アラビアゴム、カルナウバロウ、D-ソルビトール、ポリソルベート80、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、青色1号、香料
〔効能〕 せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
〔用法・用量〕 8～14才1回2錠、5～7才1回1錠。1日6回。口中に含み、かまずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用
〔製剤〕 微青色のヨーグルト味のドロップ剤
〔包装・価格〕 36錠 650円
〔その他〕 2008年9月1日発売

浅田飴せきどめGA
 (浅田飴)

サッパリとした清涼感がある
 シュガーレスドロップ剤

〔区分〕 指定第2類医薬品
〔成分〕 18錠中：
dl-メチルエフェドリン塩酸塩………… 37.5mg
 クレゾールスルホン酸カリウム… 135mg
 セチルピリジニウム塩化物水和物…3mg
〔添加物〕 還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、DL-リンゴ酸、アラビアゴム、カルナウバロウ、*l*-メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、黄色5号、青色1号、香料
〔効能〕 せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回3錠、8～14才1回2錠、5～7才1回1錠。1日6回。口中に含み、かまずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用
〔製剤〕 緑白色の青りんご味のドロップ剤

〔包装・価格〕 24錠 450円
〔その他〕 2008年9月1日発売

浅田飴せきどめLE
 (浅田飴)

サッパリとした清涼感がある
 シュガーレスドロップ剤

〔区分〕 指定第2類医薬品
〔成分〕 18錠中：
dl-メチルエフェドリン塩酸塩………… 37.5mg
 クレゾールスルホン酸カリウム… 135mg
 セチルピリジニウム塩化物水和物…3mg
〔添加物〕 還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、DL-リンゴ酸、レモン油、アラビアゴム、カルナウバロウ、カラメル、*l*-メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料
〔効能〕 せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回3錠、8～14才1回2錠、5～7才1回1錠。1日6回。口中に含み、かまずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用
〔製剤〕 黄白色のレモン味のドロップ剤
〔包装・価格〕 24錠 450円
〔その他〕 2008年9月1日発売

浅田飴せきどめOG
 (浅田飴)

サッパリとした清涼感がある
 シュガーレスドロップ剤

〔区分〕 指定第2類医薬品
〔成分〕 18錠中：
dl-メチルエフェドリン塩酸塩………… 37.5mg
 クレゾールスルホン酸カリウム… 135mg
 セチルピリジニウム塩化物水和物…3mg
〔添加物〕 還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファミンK、コハク酸2Na、DL-リンゴ酸、アラビアゴム、カルナウバロウ、カラメル、D-ソルビトール、ポリソルベート80、*l*-メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、香料
〔効能〕 せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ
〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回3錠、8～14才1回2錠、5～7才1回1錠。1日6回。口中に含み、かまずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用
〔製剤〕 淡黄色のオレンジ味のドロップ剤
〔包装・価格〕 24錠 450円

【その他】2008年9月1日発売

浅田飴せきどめSD

(浅田飴)

サッパリとした清涼感がある
シュガーレスドロップ剤

【区分】指定第2類医薬品

【成分】**ⓧ** 18錠中：

dl-メチルエフェドリン塩酸塩…37.5mg
クレゾールスルホン酸カリウム…135mg
セチルビリジニウム塩化物水和物…3mg

【添加物】還元水アメ、還元麦芽糖水アメ、グリチルリチン酸2K、アセスルファミンK、コハク酸2Na、アラビアゴム、カルナバロウ、D-ソルビトール、ポリソルベート80、*l*-メントール、タルク、サラシミツロウ、シリコーン樹脂、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、繊維素グリコール酸Na、青色1号、香料

【効能】せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】成人(15才以上)1回3錠、8~14才1回2錠、5~7才1回1錠。1日6回。口中に含み、かまわずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用

【製剤】淡青色のサイダー味のドロップ剤

【包装・価格】24錠 450円

【その他】2008年9月1日発売

コンビネートC錠

(龍角散)

かぜに伴うせき、たん症状に
特化したせき止め薬

【区分】指定第2類医薬品

【成分】**錠** 8錠中：

ジヒドロコデインリン酸塩…30mg
グアヤコールスルホン酸カリウム…270mg
セネガ末…150mg

【添加物】乳糖、無水ケイ酸、ステアリン酸Mg

【効能】せき、たん

【用法・用量】成人(15才以上)1回2錠。1日4回、食後及び就寝前に服用

【製剤】淡褐色の素錠

【包装・価格】20錠 800円

【その他】2008年11月1日発売

【販売】総合メディカル

ベリコンS

(龍角散)

大人1本のみきりタイプのせき止めシロップ

【区分】指定第2類医薬品

【成分】**内液** 60mL中：

リン酸ジヒドロコデイン…30mg
dl-塩酸メチルエフェドリン…45mg
塩酸ノスカピン…45mg
ジプロフィリン…120mg
マレイン酸クロロフェニラミン…12mg
無水カフェイン…75mg
グアイフェネシン…225mg
セネガ流エキス…0.9mL

【添加物】白糖、サッカリンNa、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、エタノール、黒糖フレーバー、香料

【効能】せき、たん

【用法・用量】成人(15才以上)1回10mL、11~14才1回6mL、8~10才1回5mL、5~7才1回3mL、1~4才1回2mL、3カ月~1才未満1回1mL、通常1日4回毎食後および就寝前。場合により6回まで服用して差し支えないがその場合は原則として約4時間の間隔をおいて服用

【製剤】褐色の液剤

【包装・価格】10mL×6本 1,500円・20mL×5本 2,000円

【その他】2007年12月発売

【販売】中外医薬生産

龍角散ダイレクト

スティックピーチ

(龍角散)

のどの粘膜に直接作用。水なしで服用。ピーチ味

【区分】第2類医薬品

【成分】**顆** 6包中：

キキョウ末…84.0mg
セネガ末…4.2mg
カンゾウ末…102.0mg
キョウニン…15.0mg
ニンジン末…84.0mg
アセンヤク末…8.4mg

【添加物】バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、エリスリトール、フマル酸Na、*l*-メントール、香料、赤色102号

【効能】たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感

【用法・用量】成人(15才以上)1回1包、11~14才1回 $\frac{2}{3}$ 包、7~10才1回 $\frac{1}{2}$ 包、3~6才1回 $\frac{1}{3}$ 包、1日6回、水なしで服用。間隔は2時間以上おく

【製品特有の注意】必ず水なしで服用すること

【製剤】うすい赤色の分包顆粒剤

【包装・価格】16錠 700円

【その他】2008年10月4日発売

龍角散ダイレクト

スティックミント

(龍角散)

のどの粘膜に直接作用。水なしで服用。ミント味

【区分】第2類医薬品

【成分】**顆** 6包中：

キキョウ末…84.0mg
セネガ末…4.2mg
カンゾウ末…102.0mg
キョウニン…15.0mg
ニンジン末…84.0mg
アセンヤク末…8.4mg

【添加物】バレイショデンプン、無水ケイ酸、エリスリトール、クエン酸、*l*-メントール、香料、黄色5号、青色1号

【効能】たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感

【用法・用量】成人(15才以上)1回1包、11~14才1回 $\frac{2}{3}$ 包、7~10才1回 $\frac{1}{2}$ 包、3~6才1回 $\frac{1}{3}$ 包、1日6回、水なしで服用。間隔は2時間以上おく

【製品特有の注意】必ず水なしで服用すること

【製剤】うすい緑色の分包顆粒剤

【包装・価格】16錠 700円

【その他】2008年10月4日発売

うがい薬

イソジンうがい薬P
(明治製菓)

ほんのりフルーティー
後味さわやか

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中：

ポビドンヨード…………… 70mg

添加物 エタノール、*l*-メントール、クエン酸、
リン酸水素Na、サッカリンNa、pH調整剤、
香料、ベンジルアルコール、バニリン、安
息香酸ベンジル

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗
浄、口臭の除去

用法・用量 1回、本剤2～4mLを水約60mL
にうすめて、1日数回うがいする

製品特有の注意 銀を含有する歯科材料(義
歯等)が変色することがある。目に入
らないよう注意する。万一目に入った
場合は水・ぬるま湯で洗う。症状が重
い場合は眼科医の診療を受ける

製剤 濃い褐色の澄明な液

包装・価格 50mL 580円・120mL 1,080円

その他 2008年9月1日発売

強心薬

虔脩本方六神丸S
(クラシエ薬品)

区分 第2類医薬品

成分 丸 4粒中：

ゴオウ…………… 2.0mg

センソ…………… 4.0mg

ジンコウ…………… 4.0mg

ガジュツ…………… 3.6mg

ニンジン…………… 4.4mg

ユウタン…………… 0.4mg

カンゾウ…………… 1.6mg

オウレンエキス…………… 0.6mg
(原生薬として4.28mg)

ロクジョウ…………… 1.0mg

添加物 サリチル酸、寒梅粉、炭酸Ca、薬用炭、
l-メントール、香料

効能 動悸、息切れ、気付け

用法・用量 成人(15才以上)2粒を1日2回水
又は白湯にて服用

包装・価格 60粒 2,520円・150粒 5,040円

その他 2008年12月4日発売

製造販売 廣貴堂

高コレステロール低下薬

シンプトップ
(アルフレッサ ファーマ)

血清コレステロールの改善薬

区分 第3類医薬品

成分 剤 6カプセル中：

ポリエノホスファチジルコリン…………… 1,500mg

添加物 酢酸トコフェロール、トコフェロール、
ヒマワリ油、ダイズ油、ゼラチン、グリセ
リン、三二酸化鉄、パラオキシ安息香酸エ
チル、パラオキシ安息香酸プロピル

効能 血清高コレステロールの改善

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル。
1日3回。食後に服用

製品特有の注意 噛まずに服用する

製剤 濃褐色の軟カプセル

包装・価格 100カプセル 3,300円・200カプ
セル 6,000円

その他 2009年3月2日発売

ソシアテロンプ
(三宝製薬)

血清高コレステロール改善薬

区分 第3類医薬品

成分 剤 6カプセル(1日量)中：

パンテチン(80%パンテチン水溶液)…………… 375mg

大豆油不けん化物…………… 600mg

酢酸*d*- α -トコフェロール

(天然型ビタミンE)…………… 100mg

添加物 ポリソルベート80、サフラワー油、ゼ
ラチン、グリセリン、D-ソルビトール、サ
ンセットイエローFCF、酸化チタン

効能 血清高コレステロールの改善。血
清高コレステロールに伴う末梢血行障
害(手足の冷え・しびれ)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル、
1日3回食後に服用

製剤 淡黄色不透明の軟カプセル

包装・価格 180カプセル 4,800円

その他 2008年9月1日発売

製造販売 東海カプセル

ドルチトール
(小林製薬)

血中の脂質が多く、血流がス
ムーズでない方に

区分 第3類医薬品

成分 錠 1日量：4錠中：

リボフラビン酪酸エステル…………… 60mg

添加物 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、
ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロ

ーCa, ステアリン酸Mg
効能 血清高コレステロールの改善
用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を1日2回, 食後に服用
製剤 橙色の錠剤
包装・価格 60錠 2,500円・120錠 4,000円
その他 2008年3月26日発売

制酸薬

太田胃散チュアブルNEO
(太田胃散)

胸やけ, 胃の膨満感, 胃の不快感にかんでスッキリ

区分 第3類医薬品
成分 錠 6錠中：
 水酸化マグネシウム……………600mg
 炭酸マグネシウム……………600mg
 沈降炭酸カルシウム……………960mg
 ジメチルポリシロキサン……………120mg
添加物 L-メントール, ヒドロキシプロピルセルロース, 香料, 銅クロロフィリンNa, ステアリン酸Mg, セルロース, 粉末還元麦芽糖水アメ, キシリトール
効能 胸やけ, 胃部膨満感, 胃部不快感, 胃痛, 胃酸過多, 胃もたれ, 胃重, 飲みすぎ, はきけ(胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 悪心), 胸つかえ, げっぷ, 嘔吐
用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日3回。かみくだくか, 口の中できちんと服用。服用間隔は4時間以上おくこと
製剤 淡緑白色の錠剤
包装・価格 18錠 780円
その他 2008年9月3日発売
製造販売 明治薬品

パンシロンAZ
(ロート製薬)

荒れた胃粘膜をしっかり修復・保護

区分 第2類医薬品
成分 顆 3包中：
 アズレンスルホン酸ナトリウム……6mg
 L-グルタミン……………900mg
 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム…600mg
 ロートエキス……………30mg
 炭酸水素ナトリウム……………1,800mg
 重質炭酸マグネシウム……………180mg
 沈降炭酸カルシウム……………540mg
添加物 カンゾウ, L-メントール, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒドロキシプロピルスターチ, D-マンニトール
効能 胃痛, 胃部不快感, 胸やけ, 胃重, 胃もたれ, 胃酸過多, 胃部膨満感, 胸つかえ, はきけ(むかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 悪心), 嘔吐, げっぷ(おくび), 飲みすぎ
用法・用量 15才以上1包, 11~14才 $\frac{1}{2}$ 包。1日3回, 食前または食間の空腹時に服用
製剤 淡黄色及び青色の2種混合の顆粒剤

包装・価格 20包 930円・36包 1,480円

パンシロンキュア
(ロート製薬)

ストレスや飲み過ぎなどからくる胃痛・胸やけに

区分 第2類医薬品
成分 散 3包中：
 水酸化マグネシウム……………450mg
 合成ヒドロタルサイト……………780mg
 沈降炭酸カルシウム……………900mg
 ホップ乾燥エキス-S……………33mg (ホップとして471.5mg)
 アルジオキサ……………150mg
 ピレンゼピン塩酸塩水和物……………46.9mg
添加物 キシリトール, D-マンニトール, ヒドロキシプロピルセルロース, 軽質無水ケイ酸, 炭酸水素ナトリウム, アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物), トコフェロール酢酸エステル, L-メントール, 香料
効能 胃酸過多, 胸やけ, 胃部不快感, 胃部膨満感, もたれ(胃もたれ), 胃重, 胸つかえ, げっぷ(おくび), はきけ(むかつき, 胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 嘔吐, 悪心), 嘔吐, 飲み過ぎ(過飲), 胃痛
用法・用量 成人(15才以上)1回1包を1日3回, 食前または食間の空腹時に服用
製剤 白色~微黄白色の散剤
包装・価格 4包 500円・14包 1,500円
その他 2008年10月17日発売

H₂ブロッカー

ガスター10内服液 (第一三共ヘルスケア)

胃痛、むかつきに適した1本
飲みきりの液体タイプ

区分 第1類医薬品

成分 内液 1本(10mL)中：

ファモチジン…………… 10mg

添加物 エデト酸カルシウム二ナトリウム、スクラロース、香料、L-メントール、エタノール、pH調整剤

効能 胃痛、胸やけ、もたれ、むかつき
(本剤は胃のヒスタミンH₂受容体に拮抗する薬を含んでいる)

用法・用量 成人(15才以上80才未満)1回1本。1日2回まで。

- ・服用後8時間以上たっても症状が治まらない場合は、もう1本服用する。ただし、1日2回(2本)を超えて服用してはいけない。
- ・症状が治まった場合は、服用を止める。

- ・3日間服用しても症状の改善がみられない場合は、服用を止めて、医師又は薬剤師に相談すること。
- ・2週間を超えて続けて服用しない

製剤 透明の液

包装・価格 10mL×2本 683円☆

その他 指

2008年10月16日発売

健胃薬

太田胃散<内服液> (太田胃散)

11種の有効成分が飲みすぎ、
二日酔いのむかつきに効く

区分 第2類医薬品

成分 内液 1本(50mL)中：

コウボク流エキス……………0.45mL
(原生薬換算量：450mg)

ソウジュツ流エキス…………… 0.6mL
(原生薬換算量：600mg)

ゲンチアナ流エキス…………… 0.2mL
(原生薬換算量：200mg)

ケイヒ流エキス…………… 0.3mL
(原生薬換算量：300mg)

ウイキョウ流エキス……………0.15mL
(原生薬換算量：150mg)

チョウジエキス……………606mg
(原生薬換算量：200mg)

チンビエキス…………… 60mg
(原生薬換算量：300mg)

ショウキョウ流エキス…………… 0.3mL
(原生薬換算量：300mg)

モッコウエキス…………… 100mg
(原生薬換算量：200mg)

カンゾウ抽出物…………… 35mg
(原生薬換算量：500mg)

カルニチン塩化物…………… 160mg

添加物 L-メントール、安息香酸Na、バラベン、

エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシ

シプロピレングリコール、ポリオキシエチ

レン硬化ヒマシ油、pH調整剤、香料、白糖、

ハチミツ

効能 飲みすぎ、はきけ(二日酔・悪酔

のむかつき、胃のむかつき、悪心)、

胃もたれ、食欲不振、胃弱、消化不良、

食べすぎ、胸やけ、嘔吐、胃部・腹部

膨満感、胸つかえ

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本

(50mL)を食前、食後又は就寝前に服

用

製品特有の注意 沈殿を生じることがある。

よく振ってから服用する

製剤 黄褐色の液

包装・価格 2本 760円

その他 2008年9月3日発売

製造販売 日新薬品工業

新ガロール錠 (日水製薬)

胆汁末、消化酵素、生薬のウ
コン・ケイヒ配合胃腸薬

区分 第3類医薬品

成分 錠 15錠中：

胆汁末…………… 300mg

ビオチン…………… 45mg

ウコン末…………… 200mg

ケイヒ油…………… 15mg

添加物 無水ケイ酸、セルロース、ヒドロキシ

プロピルスターチ、無水リン酸水素Ca、ス

テアリン酸Mg

効能 食欲不振、胃部・腹部膨満感、消

化不良、胃弱、食べ過ぎ、飲み過ぎ、

胸やけ、もたれ、胸つかえ、はきけ

(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、

悪心)、嘔吐、消化促進

用法・用量 成人(15才以上)1回5錠、11～

14才1回4錠、8～10才1回3錠、5～7才1

回2錠、1日3回食後に服用

製剤 黄褐色の錠剤

包装・価格 450錠 1,750円・990錠 3,150円

その他 2008年10月1日発売

ピーマTP健胃薬 (三宝製薬)

胃のもたれ、胸やけ、飲みす
ぎに

区分 第2類医薬品

成分 顆 3包(1日量4.5g)中：

テブレノン……………112.5mg

ソウジュツ乾燥エキス-S……………150mg
(原生薬換算量：1.5g)

コウボク乾燥エキス…………… 83.4mg
(原生薬換算量：1.0g)

カンゾウエキス…………… 200mg
(原生薬換算量：0.6g)

添加物 無水ケイ酸、乳糖、D-マンニトール、

CMC-Ca、L-メントール、ケイヒ末、トコ

フェロール酢酸エステル、香料、エタノ

ール、トウモロコシデンプン

効能 胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、

胸やけ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、

はきけ(むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、

胸つかえ

用法・用量 成人(15才以上)1回1包、1日3

回食後に服用

製剤 淡褐色～褐色の顆粒

包装・価格 14包 1,350円

その他 2008年9月1日発売

複合胃腸薬

新キャベ2コーフ
(興和)

胃に保護膜を作りながら胃の働きをよくする食前胃腸薬

区分 第2類医薬品

成分 顆 3包中：

乾燥水酸化アルミニウムゲル…… 450mg
 合成ヒドロタルサイト…… 450mg
 水酸化マグネシウム…… 325mg
 ウイキョウ末…… 200mg
 チョウジ末…… 50mg
 ショウキョウ末…… 50mg
 ウコン末…… 300mg
 ニンジン乾燥エキス-E…… 20mg
 (ニンジンとして290mg)
 カンゾウエキス末…… 75mg
 (カンゾウとして525mg)
 メチルメチオニンスルホニウム

クロライド…… 30mg
 ベンフォチアミン…… 25mg

添加物 トウモロコシデンプン、カルメロースCa、硬化油、キシリトール、二酸化ケイ素、l-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース

効能 もたれ、胃部・腹部膨満感、胃部不快感、食欲不振、消化不良、胃弱、胃重、胃痛、飲み過ぎ、食べ過ぎ、胃酸過多、胸やけ、げっぷ、胸つかえ、はきけ(二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量 成人(15才以上)1回1包、1日3回毎食前に服用

製剤 白色及び褐色の混合顆粒

包装・価格 18包 1,000円・30包 1,500円

その他 2008年10月22日発売

販売 興和新薬

新キャベジンコーフS
(興和)

MMSCにソウジュツを配合。弱ってきた胃を元気に

区分 第2類医薬品

成分 錠 6錠中：

メチルメチオニンスルホニウム
 クロライド(MMSC)…… 150.0mg
 水酸化マグネシウム…… 100.0mg
 炭酸水素ナトリウム…… 900.0mg
 沈降炭酸カルシウム…… 1200.0mg
 ロートエキス3倍散…… 90.0mg
 (ロートエキスとして30.0mg)
 ソウジュツ乾燥エキス…… 50.0mg
 (原生薬換算量：500.0mg)

センブリ末…… 30.0mg
 ビオチンアスターゼ2000…… 24.0mg
 リパーゼAP12…… 15.0mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、カルメロースCa、トウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシド、セラック、タルク、ケイヒ、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、セルロース、l-メントール、二酸化ケイ素、デキストリン

効能 胃部不快感、胃弱、もたれ、胃痛、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食欲不振、消化不良、胃酸過多、げっぷ、胸つかえ、消化促進、胃部・腹部膨満感、胃重

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、8～14才1回1錠、1日3回毎食後服用

製品特有の注意 特有のニオイがある

製剤 淡黄褐色の有核錠

包装・価格 100錠 1,150円・210錠 1,900円・320錠 2,600円

その他 2008年7月22日発売

販売 興和新薬

ハイウルソグリーンS
(佐藤製薬)

ウルソデオキシコール酸配合の総合胃腸薬

区分 第2類医薬品

成分 細 3包(1包1.2g)中：

ビオチンアスターゼ1000…… 60mg
 プロザイム…… 20mg
 ウルソデオキシコール酸…… 20mg
 銅クロロフィリンナトリウム…… 45mg
 炭酸水素ナトリウム…… 1200mg
 炭酸マグネシウム…… 500mg
 ロートエキス3倍散…… 90mg
 ケイヒ末…… 320mg
 カンゾウ末…… 150mg
 ウイキョウ末…… 80mg
 ショウキョウ末…… 50mg
 ウコン末…… 100mg
 ゲンチアナ末…… 60mg
 チョウジ末…… 50mg

添加物 カルメロースカルシウム、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、l-メントール、乳糖、バレイショデンプン

効能 胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部・腹部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胃痛、食欲不振(食欲減退)、消化不良、胃弱、消化促進

用法・用量 成人(15才以上)1回1包、11～14才1回3/4包、8～10才1回1/2包、いずれも1日3回、食前又は食後に服用

製剤 緑と茶褐色の散剤

包装・価格 12包 800円・30包 1,500円

整腸薬

インナーバランス
(資生堂)

ビフィズス菌と納豆菌を配合した整腸薬

区分 第3類医薬品

成分 錠 6錠中：

ビフィズス菌…………… 30mg
 納豆菌末…………… 10mg
 ビスベンチアミン
 (ビタミンB₁誘導体)…………… 25mg
 リポフラビン 酪酸エステル
 (ビタミンB₂)…………… 12mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)… 50mg
 アスコルビン酸カルシウム……………605.4mg
 (ビタミンCとして500mg)
 パントテン酸カルシウムS…………… 46.2mg
 (パントテン酸カルシウムとして30mg)
添加物 乳糖水和物, セルロース, ヒドロキシ
 プロピルセルロース, ステアリン酸Mg, メ
 タクリル酸コポリマー-L, メタクリル酸コポ
 リマー-LD, クエン酸トリエチル, タルク,
 酸化チタン, 乳酸カルシウム水和物, サン
 セットイエロー-FCF

効能 整腸(便通を整える), 腹部膨満感,
 軟便, 便秘

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 8~14
 才1回1錠, 1日3回毎食後服用

製剤 だいたい色のフィルムコート錠

包装・価格 60錠 1,200円・180錠 2,500円

その他 2008年8月4日発売

製造販売 日東薬品工業

販売 資生堂薬品

フェカルミンゴールド錠
(日東薬品工業)

整腸・軟便・便秘の方に

区分 第3類医薬品

成分 錠 6錠中：

ラクタミン…………… 30mg
 ビフィズス菌…………… 12mg
 酪酸菌末…………… 50mg
 納豆菌末…………… 10mg
 ビリドキシン塩酸塩…………… 20mg

添加物 乳糖, セルロース, 無水ケイ酸, ステ
 アリン酸Mg

効能 整腸(便通を整える), 腹部膨満感,
 軟便, 便秘

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 8~14
 才1回1錠, 1日3回食後に服用

製剤 白色の錠剤

包装・価格 60錠 1,300円・168錠 2,800円

その他 2008年11月1日発売

販売 エバース・ジャパン

止しゃ薬(下痢止め)

セイドーストッピー
(アラクス)

水なしでものめるシナモン味
 の顆粒の下痢止め薬

区分 第2類医薬品

成分 顆 3包(3g)中：

タンニン酸ベルベリン…………… 300mg
 ロートエキス3倍散…………… 180mg
 ゲンノショウコ乾燥エキス…………… 100mg
 ケイヒ末…………… 100mg
添加物 バレイショデンプン, エリスリトール,
 D-マンニトール, CMC-Ca, クロスホビド
 ン, スクラロース, バニリン

効能 下痢, 腹痛を伴う下痢, 消化不良
 による下痢, くだり腹, 軟便, 食あた
 り, 水あたり, はき下し

用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日3
 回を限度として服用。服用間隔は4時
 間以上おくこと

製剤 黄褐色の顆粒剤

包装・価格 6包 580円・12包 1,100円

その他 2008年3月11日発売

浣腸薬

イチジク浣腸薬おし
(イチジク製薬)

薬に押せる／液残りが少ない

区分 第2類医薬品

成分 外液 1個(30g)中：

グリセリン…………… 15g

添加物 ベンザルコニウム塩化物

効能 便秘

用法・用量 12才以上1回1個(30g)を直腸内
 に注入する。効果のみられない場合に
 は, さらに同量をもう一度注入する

製剤 青色のポリエチレン容器, 液は無
 色澄明の浣腸剤

包装・価格 2個 400円・10個 1,800円

その他 2009年3月1日発売

便秘薬

インナーハーブ

(資生堂)

植物から生まれたナチュラルな便秘薬

区分 指定第2類医薬品**成分** 顆 2包(3.5g)中:

センナ実……………1,125mg

センナ……………375mg

ヨクイニン……………2,000mg

効能 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ,吹出物,頭重,のぼせ,食欲不振,腹部膨満,腸内異常発酵,痔**用法・用量** 成人(15才以上)1回 $\frac{1}{2}$ ~1包を1日2回を限度とし,なるべく空腹時に服用。服用間隔は4時間以上おく。初回は最小量を用い,便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する**製品特有の注意** 服用により,尿が黄褐色又は赤色になることがある**製剤** 緑褐色~褐色の顆粒剤**包装・価格** 14包 1,400円・44包 3,000円**その他** 2008年8月4日発売**製造販売** カーヤ**販売** 資生堂薬品

ウエストンサラ

(小林薬品工業)

5種類の生薬成分と乳酸菌配合

区分 指定第2類医薬品**成分** 錠 1錠中:

センナ末……………125mg

ダイオウ乾燥エキス……………13.2mg

ケンゴシ末……………12mg

シャクヤク乾燥エキス……………8mg

カンゾウ乾燥エキス……………7.2mg

有胞子性乳酸菌……………6mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース, CMC-Ca, メチルセルロース, ステアリン酸Ca, ケイ酸Al, ケイ酸Ca, 無水ケイ酸, 乳糖, セルロース, ヒプロメロース, マクロゴール, 酸化チタン, カルナウバロウ, 三酸化鉄**効能** 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重,のぼせ,肌あれ,吹出物,食欲不振(食欲減退),腹部膨満,腸内異常発酵,痔**用法・用量** 2~3日便通がないとき:成人(15才以上)2~4錠, 11~14才1~2錠, 7~10才1~2錠, 1日1回就寝前(又は空腹時)に服用。4日以上便通がないとき:成人(15才以上)4~6錠, 11~14才

2~4錠, 7~10才2~3錠, 1日1回就寝前(又は空腹時)に服用。ただし,初回は最小量を用い,便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する

製品特有の注意 尿が黄褐色又は赤色になることがある**製剤** 淡紅色のフィルムコート錠**包装・価格** 27錠 580円・56錠 980円・125錠 1,850円**その他** 2008年10月発売

カイベールアロエプラス

(アラクス)

センナ由来成分にアロエを配合したハーブ系便秘薬

区分 指定第2類医薬品**成分** 錠 3錠中:

センノサイド……………60mg

アロエ軟糊エキス……………178mg

ジオクチルソジウムスルホサク

シネート(DSS)……………24mg

添加物 クロスCMC-Na, 無水ケイ酸, バレイショデンプン, 乳糖, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, 銅クロロフィリンNa, 酸化チタン, カルナウバロウ**効能** 便秘に伴う次の症状の緩和:肌あれ,吹出物,頭重,のぼせ,食欲不振(食欲減退),腹部膨満,腸内異常発酵,痔。便秘**用法・用量** 成人(15才以上)2~3日便通がない時1~2錠, 4日以上便通がない時2~3錠。1日1回就寝前(又は空腹時)に服用。ただし,初回は最小量を用い,便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量**製剤** 淡緑色のフィルムコート錠**包装・価格** 28錠 880円・56錠 1,650円**その他** 2008年10月7日発売スルーラック
デトファイバー

(エスエス製薬)

腸内に溜まった老廃物(滞留便)をスムーズに排出

区分 指定第2類医薬品**成分** 顆 4包中:

ブラントゴ・オバタ種皮末……………4,400mg

アロエエキス……………375mg

(アロエ750mgに相当)

センノサイドカルシウム……………40mg

(センノシドA・Bとして14.4mg)

ジュウヤク末……………500mg

添加物 無水ケイ酸, D-ソルビトール, ヒドロキシプロピルセルロース, タルク, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール, アルコール, グリセリン, プロピレ

ングリコール, クエン酸Na, アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物), カンゾウ, グリチルリチン酸2K, 香料

効能 便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重,のぼせ,肌あれ,吹出物,食欲不振(食欲減退),腹部膨満,腸内異常発酵,痔**用法・用量** 成人(15才以上)1回1~2包。1日1~2回。なるべく空腹時に服用。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし,初回は最小量を用い,便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量**製品特有の注意** 服用により,尿が橙色又は赤みを帯びることがある**製剤** 茶褐色の顆粒剤**包装・価格** 15包 1,300円**その他** 2008年12月1日発売**製造販売** 共栄製薬

内服アレルギー用薬

アルガード
抗アレルギーカプセル

(ロート製薬)

鼻のアレルギー症状に

区分 第1類医薬品

成分 力 2カプセル中：

エメダスチンフマル酸塩……………2mg

添加物 トウモロコンデンブ、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、エチルセルロース、ステアリン酸Mg、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり。じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮膚のはれ、かゆみ

用法・用量 成人(15才以上)1回1カプセル、1日2回、朝食後及び就寝前に服用する。ただし、鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮膚の症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

製剤 白色不透明の硬カプセル剤

包装・価格 20カプセル 2,200円

その他 2009年1月13日発売

一般点眼薬

アイビットウルーノ

(テイカ製薬)

乳白色澄明な液

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中：

塩化ナトリウム……………450mg

塩化カリウム……………160mg

塩化カルシウム水和物……………15mg

添加物 ホウ酸、クエン酸水和物、乾燥炭酸ナトリウム、ボビドン、ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、クロルヘキシジングルコン酸塩液

効能 目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1日5～6回、1回2～3滴点眼

製剤 乳白色澄明な液

包装・価格 10mL 700円

その他 2008年6月1日発売

サンテ40i

(参天製薬)

6種の有効成分が浸透して、
目のかすみ・疲れを改善

区分 第3類医薬品

成分 外液 12mL中：

ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.005%

天然型ビタミンE……………0.05%

タウリン……………0.5%

パンテノール……………0.05%

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム……………0.5%

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.03%

添加物 アミノカブロン酸、エデト酸ナトリウム水和物、クロロブタノール、グラニオール、デキストラン、ヒドロキシエチルセルロース、ベンザルコニウム塩化物液、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、*d*-ボルネオール、*l*-メントール、等張化剤、pH調節剤

効能 目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼

製剤 無色透明の薬液

包装・価格 12mL 980円

その他 2008年10月10日発売

ロートV11

(ロート製薬)

現代人のつらい疲れ目に

区分 第2類医薬品

成分 外液：

塩酸テトラヒドロゾリン……………0.05%

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.03%

ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.005%

ビタミンB₆……………0.1%

酢酸*d*- α -トコフェロール……………0.05%

L-アスパラギン酸カリウム……………1.0%

アミノエチルスルホン酸……………0.5%

アラントイン……………0.1%

硫酸亜鉛水和物……………0.05%

グリチルリチン酸二カリウム……………0.1%

コンドロイチン硫酸ナトリウム……………0.1%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、*l*-メントール、*dl*-カンフル、エデト酸Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、pH調節剤

効能 目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1～2滴、1日5～6回点眼

製剤 無色澄明の液

包装・価格 13mL 1,300円

その他 2008年5月9日発売

ロートアルガード's

(ロート製薬)

花粉アレルギーなどの目のかゆみに しみないさし心地

区分 第2類医薬品

成分 外液：

グリチルリチン酸二カリウム……………0.25%

マレイン酸クロルフェニラミン……………0.03%

塩酸テトラヒドロゾリン……………0.01%

塩酸ピリドキシン……………0.10%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、*l*-メントール、*d*-カンフル、*d*-ボルネオール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤

効能 目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目の疲れ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1～2滴、1日3～6回点眼

製剤 無色澄明の液

包装・価格 10mL 930円

ロートクール40α
(ロート製薬)

冷たい清涼感。目をリフレッシュ

区分 第3類医薬品

成分 外液：

酢酸d-α-トコフェロール……0.05%
塩酸ピロキシリン……0.1%
コンドロイチン硫酸ナトリウム……0.1%
L-アスパラギン酸カリウム……1%
メチル硫酸ネオスチグミン……0.005%
マレイン酸クロルフェニラミン……0.03%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、d-ボルネオール、ユーカリ油、クロロブタノール、塩化ベンザルコニウム、エデト酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調節剤

効能 目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、目のかゆみ、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼

製剤 無色澄明の液

包装・価格 12mL 480円

アレルギー用点眼薬

**マイティアアイテクト
アルピタット**

(武田薬品工業)

花粉・ハウスダストなどによる目のかゆみ・充血に効く

区分 第2類医薬品

成分 外液 1mL中：

クロモグリク酸ナトリウム……10mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.15mg
プラノプロフェン……0.5mg

添加物 ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物、ジブチルヒドロキシトルエン、ベンザルコニウム塩化物、l-メントール、ポリソルベート80、ホウ砂、pH調整剤

効能 花粉・ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1～2滴、1日4回点眼。2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師または薬剤師に相談すること

製品特有の注意 光による品質の変化を防ぐため、密栓して必ず添付の携帯用袋に入れること

製剤 無色～微黄色澄明の点眼液

包装・価格 15mL 1,400円

その他 2009年1月19日発売

製造販売 千寿製薬

**ロート
アルガードST点眼薬**
(ロート製薬)

つらいアレルギー症状の緩和に

区分 第2類医薬品

成分 外液：

クロモグリク酸ナトリウム……1%
クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.015%
ピロキシリン塩酸塩……0.1%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いとき等)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1～2滴、1日4～6回点眼。2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談すること

製剤 無色～微黄色澄明の液

包装・価格 13mL 1,400円

その他 2009年1月13日発売

**ロート
アルガードクリアブロック**

(ロート製薬)

アレルギー症状が続き、かつ炎症を伴う方に

区分 第2類医薬品

成分 外液：

クロモグリク酸ナトリウム……1%
プラノプロフェン……0.05%
クロルフェニラミンマレイン酸塩……0.015%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、l-メントール、BHT、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いとき等)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)

用法・用量 1回1～2滴、1日4回点眼。2日間使用しても症状の改善がみられない場合には、医師又は薬剤師に相談すること

製剤 無色～微黄色澄明の液

包装・価格 13mL 1,580円

その他 2009年1月13日発売

人工涙液

眼涼潤

(久光製薬)

ドライアイ(目のかわき)に涙に近い一滴を

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中:

L-アスパラギン酸カリウム……1.2mg
 塩化カリウム……1.27mg
 塩化カルシウム水和物……0.15mg
 塩化ナトリウム……7.33mg
 ブドウ糖……0.05mg
 硫酸マグネシウム水和物……0.1mg
 リン酸水素ナトリウム水和物……2.73mg

添加物 エデト酸ナトリウム水和物、乾燥炭酸ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物液

効能 目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、ハードコンタクトレンズ又はソフトコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1回2~3滴、1日3~6回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 13mL 780円

その他 2008年12月4日発売

製造販売 佐賀製薬

スマイルコンタクト
ドライテクト

(ライオン)

とろりベール、潤い保つ

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中:

ヒプロメロース……0.3g
 コンドロイチン硫酸ナトリウム……0.5g
 塩化カリウム……0.05g
 塩化ナトリウム……0.3g

添加物 ヒアルロン酸Na、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、プロピレングリコール、L-メントール

効能 ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1日3~6回、1回1~3滴を点眼

製剤 無色透明の液剤

包装・価格 12mL 600円

その他 2008年5月16日発売

なみだロートドライアイ・
コンタクト

(ロート製薬)

レンズ装着時の目の乾きや不快感に

区分 第3類医薬品

成分 外液:

コンドロイチン硫酸ナトリウム……0.5%
 塩化カリウム……0.07%
 塩化ナトリウム……0.3%
 ヒドロキシエチルセルロース……0.35%
 ブドウ糖……0.09%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸Na、pH調節剤

効能 涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~2滴、1日5~6回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 13mL 700円

その他 2008年10月8日発売

ロートCキューブ
ダブルチャージ

(ロート製薬)

装着液として使えるコンタクト対応目薬

区分 第3類医薬品

成分 外液:

塩化カリウム……0.080%
 塩化ナトリウム……0.440%
 ブドウ糖……0.090%
 ヒプロメロース……0.250%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エデト酸Na、ソルビン酸K、pH調節剤

効能 点眼の場合:ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)。コンタクトレンズ装着の場合:ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズの装着を容易にする

用法・用量 点眼の場合:1回1~2滴、1日5~6回点眼。コンタクトレンズ装着の場合:コンタクトレンズの両面を1回1~2滴でぬらした後装着

製剤 無色透明の液

包装・価格 18mL 750円

その他 2008年4月9日発売

ロートドライエイドEX

(ロート製薬)

つらい目の乾きに、超・高粘度&保潤目薬

区分 第3類医薬品

成分 外液:

コンドロイチン硫酸ナトリウム……0.5%
 塩化カリウム……0.08%
 塩化ナトリウム……0.44%
 ヒドロキシエチルセルロース……0.6%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、L-メントール、ベルガモット油、ペパーミントオイル、プロピレングリコール、エデト酸Na、ポリソルベート80、ゴマ油、ヒアルロン酸Na、pH調節剤

効能 涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~2滴、1日3~4回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 7mL 1,100円

その他 2008年10月8日発売

ロート
ドライエイドコンタクト

(ロート製薬)

超・高粘度&保潤目薬
すべてのコンタクトに対応

区分 第3類医薬品

成分 外液:

コンドロイチン硫酸ナトリウム……0.5%
 塩化カリウム……0.08%
 塩化ナトリウム……0.22%
 ヒドロキシエチルセルロース……0.6%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、L-メントール、エデト酸Na、ポリソルベート80、pH調節剤

効能 涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回1~2滴、1日3~4回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 7mL 1,100円

その他 2008年10月8日発売

コンタクトレンズ装着液

ロートCキューブ
ダブルチャージ
(ロート製薬)

装着液として使えるコンタクト対応目薬

区分 第3類医薬品

成分 外液：

塩化カリウム……………0.080%
塩化ナトリウム……………0.440%
ブドウ糖……………0.090%
ヒプロメロース……………0.250%

添加物 ホウ酸、ホウ砂、ポリソルベート80、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、エドト酸Na、ソルビン酸K、pH調節剤

効能 点眼の場合：ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)。コンタクトレンズ装着の場合：ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズの装着を容易にする

用法・用量 点眼の場合：1回1～2滴、1日5～6回点眼。コンタクトレンズ装着の場合：コンタクトレンズの両面を1回1～2滴でぬらした後装着

製剤 無色澄明の液

包装・価格 18mL 750円

その他 2008年4月9日発売

鼻炎用点鼻薬

ロートアルガードST
鼻炎スプレー
(ロート製薬)

つらいアレルギー症状の緩和に

区分 第2類医薬品

成分 外液：

クロモグリク酸ナトリウム……………1%
クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.25%
ナファゾリン塩酸塩……………0.025%
ベンゼトニウム塩化物……………0.005%

添加物 エドト酸Na、クロロブタノール、エタノール、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、L-メントール、ポリソルベート80、グリセリン、CMC-Na、pH調節剤

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)等による次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)

用法・用量 7才以上1回1度ずつ、1日3～5回両鼻腔内に噴霧。使用間隔は3時間以上おく。3日間使用しても症状の改善がみられない場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること

製剤 無色～微黄色の液

包装・価格 15mL 1,400円

その他 2009年1月13日発売

鼻炎用内服薬

アルガード
鼻炎クールアップ
(ロート製薬)

クール感・やわらかさがアップした、鼻炎チューアブル

区分 第2類医薬品

成分 錠3錠中：

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩…6.0mg
フェニレフリン塩酸塩……………15.0mg
ベラドンナ総アルカロイド……………0.4mg
無水カフェイン……………60.0mg

添加物 トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート80、スクラロース、酒石酸、無水ケイ酸、L-メントール、ハッカ油、セルロース、ステアリン酸Mg、香料

効能 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日3回、口中で溶かすか、又はかみくだいて服用。服用間隔は4時間以上

製剤 白色～微黄色の素錠

包装・価格 15錠 1,200円

コンビネートB錠
(龍角散)

かぜに伴うくしゃみ、鼻水などの鼻症状に特化した鼻炎薬

区分 第2類医薬品

成分 錠3錠中：

クロルフェニラミンマレイン酸塩…12mg
グリチルリチン酸二カリウム……………150mg
ショウキョウ末……………102mg
無水カフェイン……………60mg

添加物 乳糖、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、三酸化鉄

効能 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠。1日3回。服用間隔は4時間以上おく

製剤 淡黄色の素錠

包装・価格 10錠 800円

その他 2008年11月1日発売

販売 総合メディカル

乗物酔い薬

こどもセンパアS液

(大正製薬)

乗り物酔い／こども用

区分 第2類医薬品

成分 内液 1本(20mL)中：

塩酸メクリジン…………… 12.5mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物… 0.08mg

添加物 白糖, D-ソルビトール, ポビドン, クエン酸, クエン酸Na, パラベン, 香料

効能 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量 3～10才1回1本(20mL), 乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用。なお必要に応じて追加服用する場合には, 1回1本を4時間以上の間隔をおき服用。1日2回を限度とする

製剤 無色～微黄色の液

包装・価格 20mL×2本 580円

その他 2008年11月1日発売

センパア液

(大正製薬)

乗りもの酔い／酔ってからでも効く

区分 第2類医薬品

成分 内液 1本(20mL)中：

塩酸メクリジン…………… 25mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物… 0.1mg

添加物 白糖, D-ソルビトール, ポビドン, クエン酸, クエン酸Na, パラベン, 香料

効能 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量 11才以上1回1本(20mL), 乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用。なお, 必要に応じて追加服用する場合には, 1回1本を4時間以上の間隔をおき服用。1日2回を限度とする

製剤 無色～微黄色の液

包装・価格 20mL×2本 660円・20mL×5本 1,460円

その他 2008年11月1日発売

トラベルミン チュロップ
ぶどう味

(エーザイ)

乗りもの酔い薬

区分 第2類医薬品

成分 錠 2錠中：

d-クロルフェニラミンマレイン

酸塩…………… 1.33mg

スコポラミン臭化水素酸塩水和物 0.166mg

添加物 エタノール, クエン酸, プロピレングリコール, l-メントール, 香料, アセスルファミンK, 還元パラチノース, グリセリン脂肪酸エステル, 銅クロロフィリンNa

効能 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量 成人(15才以上)及び11～14才1回2錠, 5～10才1回1錠。1日2回までとし, 乗物酔いの予防には乗物に乗る30分前に1回量をかむか, 口中で溶かして服用。追加服用する場合は, 1回量を4時間以上の間隔をおくこと

製剤 淡緑色の円形のチュアブル錠

包装・価格 6錠 474円

その他 2009年2月16日発売

製造販売 高市製薬

口内炎用薬

トラフル錠

(第一三共ヘルスケア)

つらい口内炎・のどの痛みに効く

区分 第3類医薬品

成分 錠 6錠中：

トラネキサム酸…………… 750mg

カンゾウ乾燥エキス…………… 198mg

(原生薬として990mg)

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)… 50mg

リボフラビン(ビタミンB2)…………… 12mg

L-アスコルビン酸ナトリウム

(ビタミンCナトリウム)…………… 500mg

添加物 セルロース, 無水ケイ酸, ポリビニールアルコール(部分けん化物), トウモロコシデンプン, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, 酸化チタン, タルク, プロピレングリコール, ジメチルポリシロキサン, 二酸化ケイ素, 三酸化鉄, カルナウバロウ

効能 口内炎, 咽頭炎・扁桃炎(のどのはれ, のどの痛み)

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。7～14才1回1錠。1日3回(朝昼晩)服用

製品特有の注意 ①服用により尿が黄色くなることもある ②服用により尿及び大便の検査値に影響を与えることがある。医師の検査を受ける場合、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせること

製剤 淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 1,575円☆

その他 2008年7月8日発売

製造販売 滋賀県製薬

歯槽膿漏薬

アセスE

(佐藤製薬)

ビタミンE配合。
医薬品の歯肉炎・歯槽膿漏薬

【区分】第2類医薬品

【成分】軟：

カミツレチンキ……………1.25%
ラタニアチンキ……………1.25%
ミルラチンキ……………0.62%
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)……2.0%

【添加物】炭酸水素Na, D-ソルビトール, グリセリン, ハッカ油, ラウリル硫酸Na, アルギン酸Na, 薬用石ケン, パラベン, L-メントール, サッカリンNa, 黄色5号, 香料

【効能】歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状(口のねばり・歯ぐきのむずがゆさ・はれ・発赤・歯ぐきからのうみ・出血・口臭)の緩和

【用法・用量】適量(1.0g, 約3cm)を歯ブラシにつけて, 1日2回(朝・夕)歯肉をマッサージするように磨く

【製剤】赤褐色のペースト

【包装・価格】60g 1,200円

アセスメディクリーン

(佐藤製薬)

日本初の薄めず使える医薬品のマウスウォッシュ

【区分】第2類医薬品

【成分】外液 150g中：

カミツレチンキ……………1.25mg
ラタニアチンキ……………1.25mg
ミルラチンキ……………0.62mg

【添加物】薬用石ケン, チモール, パラベン, プロピレングリコール, D-ソルビトール, アルコール, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, カラメル, クエン酸, 水, 香料

【効能】歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状(口のねばり・歯ぐきのむずがゆさ・はれ・発赤・歯ぐきからのうみ・出血・口臭)の緩和

【用法・用量】1日2回(朝・夕)歯肉をブラッシングした後, 本剤15mLで歯肉部分を中心に約30秒間激しく口をすすぐ

【製剤】黄褐色の液剤

【包装・価格】450mL 1,100円

口唇用薬

ユースキン メディリップ

(ユースキン製薬)

唇のひび割れ・皮むけに 黄色い口唇炎・口角炎治療薬

【区分】第3類医薬品

【成分】軟 1g中：

アラントイン……………5mg
グリチルレチン酸……………3mg
ビタミンE酢酸エステル……………2mg
塩酸ピリドキシン……………1mg
パンテノール……………5mg

【添加物】グリセリン, オリブ油, スクワラン, ビタミンB₂, ワセリン, ジメチルポリシロキサン, パルミチン酸デキストリン, ステアリン酸ソルビタン, パラフィン, 流動パラフィン, ポリソルベート60, パラベン

【効能】口唇のひびわれ, 口唇のただれ, 口唇炎, 口角炎

【用法・用量】1日数回適量を患部に塗布

【製剤】黄色の軟膏

【包装・価格】8.5g 1,100円

【その他】2008年9月10日発売

痔疾用坐薬

ジーフォーL

(佐藤製薬)

痔の痛み・かゆみ・はれ・出血に

【区分】指定第2類医薬品

【成分】坐 1個(1.75g)中：

プレドニゾン酢酸エステル……………1mg
ジフェンヒドラミン……………10mg
アラントイン……………10mg
トコフェロール酢酸エステル(VE)……50mg
塩酸リドカイン……………60mg

【添加物】無水ケイ酸, メタケイ酸アルミン酸Mg, ヒドロキシプロピルセルロース, スクワラン, アクリル酸デンプン, ハードファット

【効能】きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

【用法・用量】成人(15才以上)1回1個を1日1～2個肛門内に挿入

【製剤】白色の坐剤

【包装・価格】10個 1,580円

痔疾用軟膏

ジーフォーL軟膏

（佐藤製薬）

きれ痔・さけ痔・いぼ痔に

区分 指定第2類医薬品

成分 軟 1g中：

プレドニゾロン酢酸エステル……1mg
 リドカイン……… 30mg
 クロロフェニラミンマレイン酸塩……2mg
 アラントイン……… 10mg
 トコフェロール酢酸エステル(VE)…… 30mg
 塩化セチルピリジニウム………2mg
 ナファゾリン塩酸塩………0.3mg

添加物 スクワラン，セタノール，ワセリン

効能 きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和及び消毒

用法・用量 1日3回，適量を肛門部に塗布

製剤 白色の軟膏

包装・価格 20g 1,380 円

外用殺菌消毒薬

マキロンsキズ軟膏

（第一三共ヘルスケア）

きりキズ，すりキズによく効く透明タイプの軟膏

区分 第3類医薬品

成分 軟 100g中：

ベンゼトニウム塩化物……… 100mg
 クロロフェニラミンマレイン酸塩…… 200mg
 アラントイン……… 200mg

添加物 1,3-ブチレングリコール，ヒドロキシエチルセルロース，pH調整剤，香料，チモール，l-メントール

効能 切傷，すり傷，さし傷，かき傷，靴ずれ，創傷面の殺菌・消毒，痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

用法・用量 1日数回，適量を患部に塗布

製剤 無色～微黄色澄明なゲル状軟膏

包装・価格 10g 525円☆

その他 2008年4月14日発売

製造販売 ジャパンメディック

外用鎮痛・消炎薬（貼付薬）

オムニード0.5%ID

（テイコクファルマケア）

インドメタシン0.5%配合。ハーフサイズのバップ剤

区分 第2類医薬品

成分 膏体100g(1,000cm²)中：

インドメタシン……… 0.5g

添加物 マクロゴール，l-メントール，酸化チタン，エデト酸Na，D-ソルビトール，ポリアクリル酸，ポリアクリル酸部分中和物，メチルセルロース，CMC-Na，グリセリン，ポリソルベート80，香料，pH調整剤，その他3成分

効能 腰痛，筋肉痛，肩こりに伴う肩の痛み，関節痛，腱鞘炎(手・手首の痛み)，肘の痛み(テニス肘など)，打撲，捻挫

用法・用量 ライナー(プラスチックフィルム)をはがし，1日2回を限度として患部に貼付

製剤 膏体が白～淡黄色のバップ剤

包装・価格 12枚 1,000円

その他 2008年6月1日発売

製造販売 帝國製薬

サロンパスEX

（久光製薬）

インドメタシン3.5%配合
 微香性・目立ちにくい色

区分 第2類医薬品

成分 硬 膏体100g中：

インドメタシン……… 3.5g

l-メントール……… 3.5g

添加物 BHT，脂環族飽和炭化水素樹脂，ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体，ポリイソブチレン，流動パラフィン，その他3成分

効能 肩こりに伴う肩の痛み，腰痛，関節痛，筋肉痛，腱鞘炎(手・手首の痛み)，肘の痛み(テニス肘など)，打撲，捻挫

用法・用量 表面のプラスチックフィルムをはがし，1日2回を限度として患部に貼る

製品特有の注意 11才未満は使用しないこと

製剤 肌色の貼付剤

包装・価格 20枚 880円・40枚 1,400円

その他 2008年11月5日発売

トクホンハップ(温)ID
(トクホン)

においが気にならない イン
ドメタシン配合温感パップ剤

区分 第2類医薬品

成分 **ア** 膏体100g(0.1m²)中:

インドメタシン……………0.5g
トウガラシエキス……………0.036g

添加物 l-メントール, N-メチル-2-ピロリドン, グリセリン, ポリアクリル酸部分中和物, CMC-Na, カルボキシビニルポリマー, 還元水アメ, マクロゴール, 酒石酸, 酸化チタン, 水酸化Al, ポリソルベート80, パラベン, その他2成分

効能 関節痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘等), 筋肉痛, 腰痛, 打撲, 捻挫, 肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量 薬剤面をおおったフィルムをはがし, 1日2回を限度として患部に貼付する

製剤 白色～淡黄色のパップ剤

包装・価格 18枚 1,600円

その他 2008年8月26日発売

トクホンハップ(冷)ID
(トクホン)

微香性でインドメタシン
0.5%配合のパップ剤

区分 第2類医薬品

成分 **ア** 膏体100g中:

インドメタシン……………0.5g

添加物 カオリン, 酸化チタン, ポリビニルアルコール(部分けん化物), ポリアクリル酸部分中和物, カルボキシビニルポリマー, CMC-Na, D-ソルビトール, グリセリン, エデト酸Na, N-メチル-2-ピロリドン, ケイ酸アルミン酸Mg, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, l-メントール

効能 関節痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘等), 筋肉痛, 腰痛, 打撲, 捻挫, 肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量 薬剤面をおおったフィルムをはがし, 1日2回を限度として患部に貼付する

製剤 白色～淡黄色のパップ剤

包装・価格 18枚 1,600円

その他 2009年3月2日発売

製造販売 東光薬品工業

ナボリン フェルビナク70
(エーザイ)

つらい痛みでフェルビナク
70mgが浸透して効く

区分 第2類医薬品

成分 **硬** 膏体100g中:

フェルビナク……………5.0g

添加物 ゴムラテックス, ジイソプロパノールアミン, BHT, l-メントール, 流動パラフィン, SBR合成ラテックス, オレイン酸ソルビタン, クロタミトン, 1,3-ブチレンジリコール, ポリブテン, メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー

効能 肩こりに伴う肩の痛み, 腰痛, 関節痛, 筋肉痛, 腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫

用法・用量 1日2回を限度として患部に貼付する

製剤 微黄色半透明～黄色半透明の膏体

包装・価格 7枚 1,000円・20枚 2,300円

その他 **指**

2009年3月3日発売

製造販売 救急薬品工業

パスタタイムFX-L温感
(祐徳薬品工業)

ワイドサイズのフェルビナク
温感タイププラスター剤

区分 第2類医薬品

成分 **硬** 1枚中:

フェルビナク……………10mg
ノニル酸ワニルアミド……………0.5mg

添加物 l-メントール, 流動パラフィン, ステレン・イソブレン・ステレンブロック重合体, その他4成分

効能 関節痛, 筋肉痛, 腰痛, 腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫, 肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量 表面のライナーをはがし, 1日2回を限度として患部に貼付する

製品特有の注意 ①貼った患部をコタツや電気毛布等で温めない。②強い刺激を感じるがあるので, 入浴の30分以上前にはがす。また, 入浴後は30分位してから使用する

製剤 淡褐色の貼付剤

包装・価格 7枚 1,480円・14枚 2,680円

その他 **指**

2008年10月20日発売

貼るアクテージL
(武田薬品工業)

ひざなどの関節痛・腰痛に

区分 第2類医薬品

成分 **硬** 膏体100g中:

インドメタシン……………1.0g

添加物 l-メントール, パラベン, エデト酸ナトリウム水和物, プロピレングリコール, グリセリン, ポリアクリル酸, ポリアクリル酸部分中和物, ヒドロキシプロピルセルロース, pH調整剤, その他3成分

効能 関節痛, 腰痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 筋肉痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫

用法・用量 プラスチックフィルムをはがし, 1日2回を限度として患部に貼付

製剤 白色～淡黄色のプラスター

包装・価格 (サイズ10cm×14cm)7枚 1,425円・14枚 2,380円・21枚 2,855円

その他 2009年3月24日発売

貼るアクテージミニ
(武田薬品工業)

肩こりの痛み・首すじなどの
筋肉痛に

区分 第2類医薬品

成分 **硬** 膏体100g中:

インドメタシン……………1.0g

添加物 l-メントール, パラベン, エデト酸ナトリウム水和物, プロピレングリコール, グリセリン, ポリアクリル酸, ポリアクリル酸部分中和物, ヒドロキシプロピルセルロース, pH調整剤, その他3成分

効能 肩こりに伴う肩の痛み, 筋肉痛, 腰痛, 関節痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫

用法・用量 プラスチックフィルムをはがし, 1日2回を限度として患部に貼付

製剤 白色～淡黄色のプラスター

包装・価格 (サイズ7cm×10cm)7枚 855円・14枚 1,425円・21枚 1,900円

その他 2009年3月24日発売

フェイスL温感
(久光製薬)

温感タイプの経皮鎮痛消炎テ
ープ剤 腰などの広い部位に

区分 第2類医薬品

成分 **硬** 膏体100g中:

フェルビナク……………0.5g

ノニル酸ワニルアミド……………0.025g

【添加物】 L-メントール、流動パラフィン、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、その他4成分

【効能】 腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【用法・用量】 表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付

【製品特有の注意】 15才未満は使用しないこと

【製剤】 肌色のテープ剤

【包装・価格】 7枚 1,480円・14枚 2,680円

【その他】 指

2008年10月20日発売

【製造販売】 祐徳薬品工業

フェイタスシップ （久光製薬）

深く浸透して効く フェルビ
ナク配合の鎮痛消炎パップ剤

【区分】 第2類医薬品

【成分】 硬 膏体100g中：

フェルビナク……………0.7g

【添加物】 エデト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、メタケイ酸アルミン酸Mg、N-メチル-2-ピロリドン、L-メントール、その他3成分

【効能】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】 1日2回を限度として、患部に貼る

【製品特有の注意】 15才未満は使用しないこと

【製剤】 白色のパップ剤

【包装・価格】 12枚 1,400円・24枚 2,300円

【その他】 指

2008年10月20日発売

外用鎮痛・消炎薬（塗布薬）

エアースロンパスDX

（久光製薬）

フェルビナク3.0%配合
筋肉・関節のつらい痛み

【区分】 第2類医薬品

【成分】 噴 原液100g中：

フェルビナク……………3g

L-メントール……………3g

【添加物】 エタノール、トリエタノールアミン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、DME

【効能】 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）

【用法・用量】 1日2～4回、適量を患部に噴霧又は塗布。よく振り、ノズルを下に向けて使用する。患部まで約10cmの距離で噴射する。連続して3秒以上噴霧しない

【製品特有の注意】 15才未満は使用しないこと

【製剤】 無色のスプレー剤

【包装・価格】 80mL 1,100円・120mL 1,550円

【その他】 2008年5月26日発売

サロンパスローション

（久光製薬）

スーッと心地よいサロンパス
の刺激がコリをほぐす

【区分】 第3類医薬品

【成分】 外液 100g中：

サリチル酸グリコール……………3.0g

ノナン酸バニルアミド……………0.015g

ニコチン酸ベンジルエステル……………0.02g

グリチルレチン酸……………0.05g

L-メントール……………5.0g

【添加物】 プロピレングリコール、エタノール

【効能】 肩こり、腰痛、関節痛、筋肉疲労、筋肉痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1日数回適量を患部に塗布

【製品特有の注意】 刺激が強すぎる時は使用を中止する。石鹸で洗い流すと刺激は緩和する

【製剤】 無色透明の液剤

【包装・価格】 85mL 750円

【その他】 2007年8月23日発売

【製造販売】 ジャパンメディック

タイガーバーム スティックN

（龍角散）

肩こり、筋肉痛、腰痛などに。
手を汚さずに塗れます

【区分】 第3類医薬品

【成分】 軟 100g中：

d-カンフル……………24.9g

ハッカ油……………15.9g

ユーカリ油……………12.9g

L-メントール……………8.0g

チョウジ油……………1.5g

【添加物】 ステアリン酸Na、グリセリン、プロピレングリコール、八アセチルしょ糖、エタノール、ステアリン酸グリセリン

【効能】 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦する

【製剤】 半透明固形タイプの軟膏剤（スティックタイプ）

【包装・価格】 22g 950円

【その他】 2008年10月3日発売

バンテリンコーワ1.0% クリーミーゲルLT

（興和）

使い易いラミネートチューブ
採用。使用感の良い独自製剤

【区分】 第2類医薬品

【成分】 軟 1g中：

インドメタシン……………10mg

L-メントール……………30mg

【添加物】 ミリスチン酸オクチルドデシル、アジピン酸ジイソプロピル、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ステアリン酸ソルビタン、ステアリン酸グリセリン、ポリソルベート60、エデト酸Na、亜硫酸水素Na、ジイソプロパノールアミン、イソプロパノール

【効能】 筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】 1日4回を限度として適量を患部に塗擦

【製剤】 黄色の軟膏剤

【包装・価格】 35g 1,700円・60g 2,600円

【その他】 2008年6月10日発売

【販売】 興和新薬

バンテリンコーワ1.0% クリームLT

(興和)

使い易いラミネートチューブ
採用。マッサージ向きの製剤

区分 第2類医薬品

成分 ⑦ 1g中:

インドメタシン…………… 10mg

l-メントール…………… 30mg

添加物 カルボキシビニルポリマー, ステアリン酸グリセリン, ステアリン酸ソルビタン, ポリソルベート60, ポリオキシエチレンセチルエーテル, エデト酸Na, 亜硫酸水素Na, 水酸化Na, パラベン, グリセリン, ミリスチン酸オクチルドデシル, アジピン酸ジイソプロピル

効能 筋肉痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 腰痛, 関節痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫

用法・用量 1日4回を限度として適量を患部に塗擦

製剤 淡黄色の乳剤性軟膏剤

包装・価格 35g 1,650円

その他 2008年6月10日発売

販売 興和新薬

バンテリンコーワ1.0% ゲルLT

(興和)

使い易いラミネートチューブ
採用。吸収の速いゲル製剤

区分 第2類医薬品

成分 ⑧ 1g中:

インドメタシン…………… 10mg

l-メントール…………… 30mg

添加物 カルボキシビニルポリマー, ヒプロメロース, エデト酸Na, 亜硫酸水素Na, 香料, ジイソプロパノールアミン, プロピレングリコール, ベンジルアルコール, アジピン酸ジイソプロピル, イソプロパノール

効能 筋肉痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 腰痛, 関節痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫

用法・用量 1日4回を限度として適量を患部に塗擦

製剤 黄色のゼリー状軟膏剤

包装・価格 35g 1,650円

その他 2008年6月10日発売

販売 興和新薬

フェイタスゲル

(久光製薬)

フェルビナク3.0%配合
なめらかに伸び、塗りやすい

区分 第2類医薬品

成分 ⑧ 100g中:

フェルビナク…………… 3.0g

l-メントール…………… 3.0g

添加物 アジピン酸ジイソプロピル, エタノール, エデト酸Na, カルボキシビニルポリマー, ジイソプロパノールアミン, ハアセチルしょ糖, ヒプロメロース, プロピレングリコール

効能 肩こりに伴う肩の痛み, 腰痛, 関節痛, 筋肉痛, 打撲, 捻挫, 腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ), 肘の痛み(テニス肘など)

用法・用量 1日2~4回, 適量を患部に塗擦
製品特有の注意 15才未満は使用しないこと

製剤 無色透明のゲル剤

包装・価格 50g 1,500円

その他 2008年10月20日発売

製造販売 東光薬品工業

フェイタスチックEX

(久光製薬)

フェルビナク3.0%に加えl-メントール6.0%配合

区分 第2類医薬品

成分 ⑧ 100g中:

フェルビナク…………… 3.0g

l-メントール…………… 6.0g

添加物 エタノール, グリセリン, 水酸化Na, ステアリン酸Na, ハアセチルしょ糖, 1,3-ブチレングリコール, ミリスチン酸イソプロピル, ラウリル硫酸Na

効能 関節痛, 筋肉痛, 腰痛, 腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫, 肩こりに伴う肩の痛み

用法・用量 1日2~4回, 適量を患部に塗擦

製品特有の注意 15才未満は使用しないこと。患部の汗などをふきとって清潔にしてから使用する。容器が直接患部に当たらないように、容器の中の薬剤を3~4mm出してから使用する

製剤 固形タイプ透明ゲル

包装・価格 53g 1,750円

その他 2008年10月20日発売

製造販売 東光薬品工業

外用湿疹・皮膚炎用薬

オイラックスソフト

(第一三共ヘルスケア)

かぶれ・かゆみに効く

区分 第3類医薬品

成分 ⑦ 1g中:

クロタミトン…………… 100mg

ジフェンヒドラミン塩酸塩…………… 10mg

グリチルレチン酸…………… 5mg

アラントイン…………… 2mg

イソプロピルメチルフェノール…………… 1mg

トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE酢酸エステル)…………… 5mg

添加物 ワセリン, ステアリアルアルコール, ジメチルポリシロキサン, グリセリン, ステアリン酸マクロゴール, 香料

効能 かゆみ, かぶれ, しっしん, 虫さされ, じんましん, しもやけ, 皮膚炎, あせも, ただれ

用法・用量 1日1~3回, 適量を患部に塗布

製品特有の注意 塗布後ほてり(熱感)を感じるがあるが, ごく短期間のうちに消失する

製剤 白色のクリーム剤

包装・価格 12g 840円☆

その他 2008年3月14日発売

製造販売 ジャパンメディック

セロトピークリーム

(佐藤製薬)

アンテドラッグステロイド配合の皮膚炎用薬

区分 指定第2類医薬品

成分 ⑦:

吉草酸酢酸ブレドニゾロン…………… 0.15%

クロタミトン…………… 5%

酢酸トコフェロール…………… 0.5%

イソプロピルメチルフェノール…………… 0.1%

添加物 プロピレングリコール, ステアリアルアルコール, セタノール, セバシン酸ジエチル, ポリソルベート60, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, カルボキシビニルポリマー, パラベン, トリエタノールアミン

効能 湿疹, 皮膚炎, あせも, かぶれ, かゆみ, 虫さされ, じんましん

用法・用量 1回数回, 適量を患部に塗擦する

製剤 白色のクリーム

包装・価格 10g 1,680円

セロトピー軟膏
(佐藤製薬)

アンテドラグステロイド配合の皮膚炎用薬

区分 指定第2類医薬品
成分 **軟**：
 吉草酸酢酸プレドニゾロン………0.15%
 クロタミトン………5%
 酢酸トコフェロール………0.5%
 イソプロピルメチルフェノール………0.1%
添加物 マクロゴール
効能 湿疹，皮膚炎，ただれ，あせも，かぶれ，かゆみ，虫さされ，じんましん
用法・用量 1回数回，適量を患部に塗擦する
製剤 白色の軟膏剤
包装・価格 10g 1,680円

マキロンS
かゆみどめジェル
(第一三共ヘルスケア)

べたつかない，スーッとした使いごこちのクールジェル

区分 指定第2類医薬品
成分 **軟** 100g中：
 酢酸デキサメタゾン………0.025g
 ジフェンヒドラミン塩酸塩………1g
 グリチルレチン酸………0.3g
 イソプロピルメチルフェノール………0.1g
 クロタミトン………5g
 l-メントール………3.5g
 dl-カンフル………3g
添加物 1,3-ブチレングリコール，カルボキシビニルポリマー，ヒプロメロース，ジイソプロパノールアミン，エデト酸ナトリウム水和物，エタノール
効能 虫さされ，かゆみ
用法・用量 1回数回，適量を患部に塗布
製品特有の注意 塗布後ほてり(熱感)を感じることもあるが，ごく短期間のうちに消失する
製剤 微黄色透明なゲル状軟膏
包装・価格 20g 1,050円☆
その他 2008年3月14日発売
製造販売 ジャパンメディック

かゆみ・虫さされ用薬

キンカン クールソフト
(金冠堂)

かゆみ，虫さされ用のヒヤッと冷たく，さわやかなにおいの薬

区分 第3類医薬品
成分 **外液** 100mL中：
 ジフェンヒドラミン塩酸塩………2.0g
 dl-カンフル………2.0g
 l-メントール………3.0g
添加物 アルコール
効能 虫さされ，かゆみ，かぶれ，湿疹，皮膚炎，じんましん，あせも，しもやけ
用法・用量 1回数回適量を患部に塗布
製品特有の注意 火気に近づけないこと
製剤 無色透明の液体
包装・価格 50mL 760円
その他 2009年3月12日発売
販売 キンカン

ケアレケア
(池田模範堂)

むだ毛処理後などの赤み・ブツブツ・かゆみ治療薬

区分 第3類医薬品
成分 **ゲル** 100g中：
 ジフェンヒドラミン………1.0g
 グリチルリチン酸二カリウム………0.5g
 アラントイン………0.5g
 パンテノール………5.0g
添加物 エデト酸Na，カルボキシビニルポリマー，グリシン，グリセリン，スクワラン，ステアリアルアルコール，疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース，トリイソオクタン酸グリセリン，1,3-ブチレングリコール，ベヘニルアルコール，グリセリン脂肪酸エステル，ポリオキシエチレンセチルエーテル，ステアリン酸ソルビタン，リン酸二水素Na
効能 かゆみ，皮ふ炎，かぶれ，しっしん，ただれ，じんましん，あせも，しもやけ，虫さされ
用法・用量 1回数回，適量を患部に塗布
製剤 白色のクリーム剤
包装・価格 15g 950円
その他 2009年3月6日発売

プチウナコーワ
(興和)

プチサイズの携帯容器。プチピンクとプチブルーの2製品

区分 第2類医薬品
成分 **外液** 1mL中：
 ジフェンヒドラミン塩酸塩………20.0mg
 リドカイン………5.0mg
 l-メントール………30.0mg
 dl-カンフル………20.0mg
添加物 エデト酸Na，クエン酸，グラニオール，エタノール
効能 かゆみ，虫さされ
用法・用量 1回数回適量を患部に塗布
製剤 無色透明な液剤(塗布型)
包装・価格 12mL 500円
その他 2008年4月4日発売
販売 興和新薬

水虫・たむし用薬

メンソレータム
エクシブクリームd
(ロート製薬)

1日1回の使用で効く水虫治療薬。せっけんの香り

区分 指定第2類医薬品

成分 7 100g中:

テルビナフィン塩酸塩……………1g
添加物 エタノール, ワセリン, スクワラン, パルミチン酸イソプロピル, セタノール, セトマクロゴール, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, カルボキシビニルポリマー, ヒドロキシエチルセルロース, 大豆レシチン, トリエタノールアミン, エデト酸Na, BHT, 香料

効能 みずむし, いんきんたむし, ぜいたむし

用法・用量 1日1回, 適量を患部に塗布する

製剤 白色～淡黄色の軟膏

包装・価格 15g 1,600円

その他 2009年3月9日発売

メンソレータム
エクシブスプレーd
(ロート製薬)

奥に潜んだ水虫菌を逃さず殺菌。せっけんの香り

区分 指定第2類医薬品

成分 噴 原液100g中:

テルビナフィン塩酸塩……………1g
添加物 エタノール, ベンジルアルコール, クエン酸, BHT, 香料

効能 みずむし, いんきんたむし, ぜいたむし

用法・用量 1日1回, 適量を患部に噴霧する

製剤 淡黄色～淡黄褐色の液

包装・価格 70g 2,000円

その他 2009年3月9日発売

皮膚軟化薬
(乾燥性皮膚用薬)

ウレパールプラスクリーム
(大鵬薬品工業)

かゆみを伴う乾燥肌に患部になじむクリームタイプ

区分 第2類医薬品

成分 7 100g中:

尿素……………10.0g
ジフェニヒドラミン塩酸塩……………1.0g
d-カンフル……………1.0g
リドカイン……………2.0g
トコフェロール酢酸エステル……………0.3g

添加物 メチルパラベン, BHT, トリイソオクタン酸グリセリン, ミリスチン酸オクチルドデシル, コレステロール, メチルポリシロキサン, ステアリルアルコール, セタノール, ベヘニルアルコール, ステアリン酸グリセリン, ステアリン酸ソルビタン, ポリオキシエチレンベヘニルエーテル, ステアリン酸マクロゴール, ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸Na, グリシン, DL-アラニン, 塩化Na, グリセリン, 乳酸Na, 乳酸, 精製水

効能 かゆみを伴う乾燥性皮ふ(老人・成人の乾皮症, 小児の乾燥性皮ふ)

用法・用量 1日1～数回, 適量を患部に塗布

製剤 白色のクリーム

包装・価格 80g 1,600円

その他 2008年9月3日発売

製造販売 大塚製薬工場

ウレパールプラス
ローション10
(大鵬薬品工業)

かゆみを伴う乾燥肌に透明ローションタイプ

区分 第2類医薬品

成分 外液 100mL中:

尿素……………10.0g
リドカイン……………2.0g
ジフェニヒドラミン塩酸塩……………1.0g
添加物 グリセリン, セバシン酸ジイソプロピル, 乳酸, 乳酸Na, ヒドロキシプロピルセルロース, 精製水, 香料, エタノール

効能 かゆみを伴う乾燥性皮ふ(老人・成人の乾皮症, 小児の乾燥性皮ふ)

用法・用量 1日1～数回, 適量を患部に塗布

製品特有の注意 火気に近づけない

製剤 無色～微黄色のアルコール性ローション

包装・価格 100mL 1,600円

その他 2008年9月3日発売

製造販売 大塚製薬工場

フェルゼア
レチノバイタルクリーム
(資生堂)

レチノール誘導体を配合した手指のあれ・角化症治療薬

区分 第3類医薬品

成分 7 1g中:

尿素……………200mg
ビタミンA油(レチノールパルミチン酸エステル)……………5mg
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)……………20mg
グリチルリチン酸二カリウム……………5mg

添加物 流動パラフィン, ワセリン, ジメチルポリシロキサン, ベヘニルアルコール, ステアリン酸, ベヘン酸, ミリスチン酸イソプロピル, トリイソオクタン酸グリセリン, グリセリン, 1,3-ブチレングリコール, ヒアルロン酸Na, 2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, ポリオキシエチレンベヘニルエーテル, ステアリン酸グリセリン, ジイソプロパノールアミン, クエン酸Na, エデト酸Na, ジブチルヒドロキシトルエン, パラベン, 三酸化鉄, 香料, その他1成分

効能 手指のあれ, ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症, 老人の乾皮症, さめ肌

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 淡黄色のクリーム

包装・価格 30g 1,800円

その他 2008年9月1日発売

販売 資生堂薬品

メンソレータム
やわらか素肌クリームU
(ロート製薬)

荒れた手肌やかたいかかとをすべすべなめらかに

区分 第3類医薬品

成分 7 1g中:

尿素……………200mg
トコフェロール酢酸エステル……………5mg
グリチルリチン酸モノアンモニウム……………5mg

添加物 l-メントール, 流動パラフィン, 1,3-ブチレングリコール, セタノール, スクワラン, ワセリン, カルボキシビニルポリマー, 2-エチルヘキサン酸セチル, ペクチン, 乳酸, トリエタノールアミン, ステアリン酸グリセリン, セトマクロゴール, パラベン, BHT, エデト酸Na, グリシン

効能 手指のあれ, ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症, 老人の乾皮症, さめ肌

用法・用量 1日数回適量を患部に塗擦する

製剤 白色の軟膏

包装・価格 90g 1,380円・145g 1,780円

その他 2008年9月9日発売

膣カンジダ用薬

メディトリート
(大正製薬)

膣カンジダの再発治療薬

区分 第1類医薬品

成分 錠 1個中：

ミコナゾール硝酸塩……………100mg

添加物 ハードファット

効能 膣カンジダの再発(過去に医師の診断・治療を受けた方に限る)

用法・用量 成人(15才以上60才未満)1日1回1個を就寝前に膣深部に挿入。なお、6日間連続して使用。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は、医師の診療を受けること

製剤 白色の坐剤

包装・価格 6個 2,839円

その他 指

2008年10月1日発売

メンソレータム
フレディCC膣錠
(ロート製薬)

膣カンジダの再発治療薬

区分 第1類医薬品

成分 錠 1錠中：

イソコナゾール硝酸塩……………100mg

添加物 乳糖水和物、セルロース、ステアリン酸Mg

効能 膣カンジダの再発。(以前に医師から、膣カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。)

用法・用量 成人(15才以上60才未満)1日1回(できれば就寝前)、1錠を膣深部に挿入する。6日間毎日続けて使用すること。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合は医師の診断を受けること

製剤 白色の膣剤

包装・価格 6錠 3,500円

その他 指

2008年4月22日発売

その他の女性用薬

レディガードコーフ
(興和)

女性専用の頻尿・残尿感改善薬

区分 第1類医薬品

成分 錠 3錠中：

フラボキサート塩酸塩……………600mg

添加物 トウモロコシデンブン、カルメロース、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、プロピレングリコール、カルナウバロウ、三二酸化鉄

効能 女性における頻尿(排尿の回数が多い)、残尿感

用法・用量 成人女性(15才以上)1回1錠、1日3回服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 20錠 2,300円・60錠 5,800円

その他 指

2008年8月19日発売

販売 興和新薬

ビタミンE主薬製剤

ホットミン
(エーザイ)

末梢の血の巡りをよくして手足の冷え、肩こりに効く

区分 第3類医薬品

成分 錠 4錠中：

ニンジンエキス……………120.0mg

(原生薬としてニンジン1.2g)

ニコチン酸……………50.0mg

酢酸*d*- α -トコフェロール

(天然型ビタミンE)……………200.0mg

添加物 タルク、トウモロコシデンブン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、三二酸化鉄、ステアリン酸Mg、セルロース、二酸化ケイ素、ヒプロメロース、ポビドン、マクロゴール

効能 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：手足のしびれ・冷え、肩・首すじのこり、しもやけ。月経不順。更年期における次の諸症状の緩和：冷え、手足のしびれ、のぼせ、肩・首すじのこり。

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンEの補給：老年期

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日1～2回。2回服用する場合は朝晩服用

製剤 淡黄色～淡黄褐色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 1,219円・56錠 2,648円

その他 2008年9月16日発売

レグトールE300
(小林薬品工業)

アルファ型天然ビタミンE剤

区分 第3類医薬品

成分 包 3カプセル中：

d- α -トコフェロール……………300mg

ガンマーオリザノール……………10mg

添加物 大豆レシチン、コムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン、パラベン

効能 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ。更年期障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ。月経不順。

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンEの補給：老年期
用法・用量 成人(15才以上)1回1カプセル、1日3回食後服用する
製品特有の注意 本剤に配合されている成分が、まれにカプセル内に析出することがある
製剤 淡黄～淡黄褐色の球形をした軟カプセル
包装・価格 100カプセル 4,800円・240カプセル 7,500円
その他 2008年12月発売

ビタミンB₂主薬製剤

**チョコラBB
ドリンクピット
(エーザイ)**

ビタミンB₂配合の50mLドリンク剤

区分 第3類医薬品
成分 **内液** 1瓶50mL中：
 ビタミンB₂リン酸エステル…………… 20mg
 ビタミンB₆…………… 25mg
 ビタミンB₁硝酸塩…………… 5mg
 ニコチン酸アミド…………… 30mg
 ヨクイニンエキス…………… 100mg
 (ヨクイニンとして1300mg)
 (エタノール…………… 0.1mL以下)
添加物 安息香酸Na, クエン酸, クエン酸Na, バニリン, パラベン, プロピレングリコール, 香料, アセスルファミンK, エリスリトール, スクラロース, 没食子酸プロピル, DL-リンゴ酸
効能 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび、口内炎、口角炎、口唇炎、かぶれ、ただれ、湿疹、皮膚炎、舌炎、赤鼻、目の充血、目のかゆみ。
 「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
 次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
用法・用量 成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用
製品特有の注意 服用により尿が黄色くなることがある。生薬エキスを配合のため、濁りを生じることがある
製剤 黄色のほとんど透明な液
包装・価格 50mL 190円
その他 2008年10月15日発売
製造販売 第一薬品工業

ビタミンC主薬製剤

**シトリーヌα
(湧永製薬)**

しみ、そばかす、日焼けによる色素沈着に

区分 第3類医薬品
成分 **力** 6カプセル中：
 アスコルビン酸(ビタミンC)…………… 300mg
 L-システイン…………… 240mg
 d-α-トコフェロール
 (天然ビタミンE)…………… 100mg
添加物 サラシミツロウ, コハク化ゼラチン, グリセリン, 赤色102号, クロスボドン, グリセリン脂肪酸エステル, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, カラメル, 酸化チタン
効能 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着。次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血。次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期
用法・用量 1回15才以上2カプセル、7～14才1カプセル、1日3回食前又は食後に服用
製品特有の注意 服用により、尿及び大便の検査値に影響をおよぼすことがあるので、尿及び大便の検査を受ける場合には、本剤を服用していることを医師に知らせること
製剤 赤褐色のソフトカプセル
包装・価格 180カプセル 2,800円
その他 2009年2月1日発売

**チョコラBBルーセントC
(エーザイ)**

L-システイン配合ビタミンC主薬製剤

区分 第3類医薬品
成分 **錠** 6錠中：
 アスコルビン酸(ビタミンC)…………… 600mg
 L-システイン…………… 240mg
 リポフラビンリン酸エステルナ
 トリウム(ビタミンB₂リン酸エステル)…… 15mg
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…… 20mg
 コハク酸d-α-トコフェロール
 (天然型ビタミンE)…………… 100mg
 ニコチン酸アミド…………… 25mg
添加物 タルク, ヒドロキシプロピルセルロース, 酸化チタン, ステアリン酸Mg, セルロース, ヒプロメロース, マクロゴール
効能 1.次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日焼け・かぶれによる色素沈着。2.次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体

力低下時、老年期。3次の場合の出血
予防：歯ぐきからの出血，鼻出血。

「ただし，上記1および3の症状について，1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師，薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠，7～14才1回1錠。1日3回。食前又は食後に服用

製品特有の注意 尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある。服用により尿が黄色くなることもある

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 60錠 1,695円・120錠 2,838円

その他 2008年3月6日発売

製造販売 日東薬品工業

ビタミンB₂B₆主薬製剤

ヘアA錠

(ライオン)

大人のニキビ，肌あれに効く

区分 第3類医薬品

成分 錠 2錠中：

グルクロノラクトン……………200mg

ヨクイニンエキス……………77mg

(原生薬換算量：1,001mg)

L-システイン……………30mg

リポフラビン(ビタミンB₂)……………30mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…100mg

添加物 トウモロコシデンプン，ヒドロキシプロピルセルロース，セルロース，ステアリン酸Mg，フマル酸，ステアリン酸，ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート，ヒドロキシプロピルメチルセルロース，酸化チタン，三酸化鉄，マクロゴール

効能 次の諸症状の緩和：にきび，肌あれ，皮膚炎，かぶれ，ただれ，湿疹，口内炎，口角炎，口唇炎，舌炎。

「ただし，これらの症状について，1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂B₆の補給：肉体疲労時，妊娠・授乳期，病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠を，1日2回(朝・夕)服用

製剤 淡黄色のフィルムコーティング錠

包装・価格 60錠 1,440円・120錠 2,700円

その他 2008年7月11日発売

ビタミンEC主薬製剤

ビトン-ハイリッチ

(第一三共ヘルスケア)

天然型ビタミンE/ビタミンC・B₂・B₆配合

区分 第3類医薬品

成分 顆 3包中：

アスコルビン酸(ビタミンC)……2,000mg

酢酸d- α -トコフェロール

(天然型ビタミンE)……………300mg

リポフラビン酪酸エステル

(ビタミンB₂)……………12mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…15mg

添加物 還元麦芽糖水アメ，ヒドロキシプロピルセルロース，アセスルファムカリウム，タウマチン，レモン油，香料，トコフェロール

効能 次の諸症状の緩和：しみ，そばかす，日焼け・かぶれによる色素沈着。

末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり，手足のしびれ・冷え，しもやけ。次の場合の出血

予防：歯ぐきからの出血，鼻出血。

「ただし，これらの症状について，1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は，医師，薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンECの補給：肉体疲労時，病中病後の体力低下時，老年期

用法・用量 成人(15才以上)1回1包，11～14才1回 $\frac{3}{4}$ 包，7～10才1回 $\frac{1}{2}$ 包，3～6才1回 $\frac{1}{4}$ 包，1～2才1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日1～3回服用。ただし，1日2回服用する場合は朝食及び夕食後，1日3回服用する場合は毎食後服用

製品特有の注意 ①服用により尿及び大便の検査値に影響を与えることがある。医師の検査を受ける場合，ビタミンEC製剤を服用していることを医師に知らせること ②服用により尿が黄色くなることもある

製剤 黄色の顆粒

包装・価格 60包 4,515円☆・90包 6,195円

☆

その他 2008年11月25日発売

製造販売 日野薬品工業

ビタミン含有保健薬(液剤)

ホルユニーキングドリンク

(小林薬品工業)

6種類の生薬配合

区分 第2類医薬品

成分 内液 100mL中:

人参流エキス……………0.6mL
 黄精流エキス……………0.5mL
 五味子流エキス……………0.3mL
 ゴオウチンキ……………0.2mL
 イカリ草流エキス……………0.5mL
 ローヤルゼリー……………200mg
 タウリン……………2,000mg
 チアミン硝酸物……………10mg
 リポフラビンリン酸エステル
 ナトリウム……………5mg
 ビリドキシン塩酸塩……………30mg
 ニコチン酸アミド……………30mg
 塩化カルニチン……………100mg
 無水カフェイン……………50mg
 (アルコール……………1mL以下)

添加物 カラメル, エタノール, 白糖, D-ソルビトール, メタリン酸Na, クエン酸, 安息香酸Na, パラベン, 香料, ミツロウ, エチルパニリン, グリセリン, パニリン, プロピレングリコール

効能 滋養強壮。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1瓶(100mL)を服用

製品特有の注意 まれに沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する

製剤 淡黄褐色の液体

包装・価格 100mL1本 300円

その他 2008年12月発売

レオピンファイブネオ

(湧永製薬)

濃縮熟成ニンニク抽出液配合の滋養強壮剤

区分 第2類医薬品

成分 内液 2mL中:

濃縮熟成ニンニク抽出液……………1.6mL
 ニンジンエキス……………200mg
 ゴオウチンキ……………0.025mL
 シベットチンキ……………0.016mL
 ビタミンB₆……………20mg
 ニコチン酸アミド……………12mg

添加物 果糖, 香料, カラメル, ゼラチン

効能 滋養強壮, 虚弱体質, 肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期な

どの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回1mL, 1日2回服用

製品特有の注意 カプセルに薬液を入れると軟化し, しばらくすると溶けるので服用のつど入れる

製剤 液剤

包装・価格 60mL 6,000円・120mL 11,000円・240mL 19,400円

その他 2008年9月1日発売

ビタミン含有保健薬(固形剤)

**若甦インペリアル
ソフトカプセルα**

(日東薬品工業)

6種の植物性生薬+3種の動物生薬+ビタミン配合

区分 第2類医薬品

成分 固 4カプセル中:

コウジン(紅参)乾燥エキス……………80mg
 (原生薬換算量800mg)
 ゴオウ(牛黄)末……………5mg
 ロクジョウ(鹿茸)末……………30mg
 インヨウカク(淫羊藿)乾燥エキス……………40mg
 (原生薬換算量320mg)
 オキソアミヂン末……………100mg
 カイクジン(海狗腎)末……………20mg
 オウギ乾燥エキス……………25mg
 (原生薬換算量200mg)
 カシユウ乾燥エキス……………10mg
 (原生薬換算量100mg)
 ガラナ乾燥エキス……………70mg
 (原生薬換算量525mg)

酢酸d-α-トコフェロール

(天然型ビタミンE)……………10mg

チアミン硝酸物

(ビタミンB₁硝酸塩)……………20mg

リポフラビン(ビタミンB₂)……………5mg

ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………10mg

添加物 サラシミツロウ, ダイズ油, コハク化ゼラチン, グリセリン, パラベン, 黒酸化鉄, 三酸化鉄

効能 滋養強壮, 虚弱体質。肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・妊娠授乳期・発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセルを1日2回服用

製剤 褐色の軟カプセル剤

包装・価格 10カプセル 1,500円・60カプセル 8,000円・120カプセル 15,000円・240カプセル 25,000円

その他 (特)

2008年11月1日発売

販売 日邦薬品工業

保元黄

(日水製薬)

ゴオウ, ニンジン, オウギ配合滋養強壮薬

区分 第2類医薬品

成分 顆 2包中:

ゴオウ(牛黄)末……………20mg

ニンジン(人参)乾燥エキス……………60mg

(原生薬換算量: 600mg)

オウギ(黄耆)乾燥エキス…………… 90mg
 (原生薬換算量：1,800mg)
 カンゾウ(甘草)エキス…………… 150mg
 (原生薬換算量：600mg)
 ショウキョウ(生姜)流エキス……… 0.3mL
 (原生薬換算量：300mg)
 チアミン塩化物塩酸塩
 (ビタミンB₁)…………… 10mg
〔添加物〕 乳糖水和物, トウモロコシデンプン,
 ヒドロキシプロピルセルロース, 香料
〔効能〕 滋養強壯, 虚弱体質, 肉体疲労・
 病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱
 性消耗性疾患・産前産後などの場合の
 栄養補給
〔用法・用量〕 成人(15才以上)1回1包。1日2
 回服用
〔製剤〕 茶褐色の顆粒剤
〔包装・価格〕 60包 16,800円
〔その他〕 2008年1月1日発売

生薬主薬保健薬

活蔘28ROYAL

(明治製菓)

6年根高麗紅蔘3,000mgが効く

区分 第3類医薬品

成分 内液 1瓶(50mL)中：

コウジンエキス…………… 1,500.0mg
 (原生薬として3,000mg)
 オウギエキス…………… 428.6mg
 (原生薬として1,200mg)
 ショウキョウエキス…………… 20.5mg
 (原生薬として500mg)
 ゴミシエキス…………… 157.9mg
 (原生薬として300mg)
 タイソウエキス…………… 476.2mg
 (原生薬として1,000mg)
 ロクジョウチンキ…………… 0.105mL
 (原生薬として30mg)
 ローヤルゼリー…………… 100.0mg

〔添加物〕 果糖, クエン酸水和物, 水アメ, カラメル, 安息香酸Na, クエン酸Na水和物, ポリソルベート80, 香料, エタノール

〔効能〕 次の場合の滋養強壯：肉体疲労, 病中病後, 虚弱体質, 胃腸虚弱, 食欲不振, 血色不良, 冷え症

〔用法・用量〕 成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用

〔製品特有の注意〕 まれに沈殿を生じることがある

〔製剤〕 褐色のドリンク

〔包装・価格〕 1本 1,380円

〔その他〕 2009年1月13日発売

〔製造販売〕 スノーデン

乙字湯

「クラシエ」漢方
乙字湯エキス顆粒

(クラシエ薬品)

区分 第2類医薬品

成分 顆 3包中：

乙字湯エキス粉末M…………… 2,100mg
 (トウキ3.0g・サイコ2.5g・オウゴン1.5g・カンゾウ1.0g・ショウマ0.75g・ダイオウ0.5g)

〔添加物〕 ヒドロキシプロピルセルロース, 乳糖, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール

〔効能〕 大便秘がたくて便秘傾向のあるものの次の諸症：痔核(いぼ痔), きれ痔, 便秘

〔用法・用量〕 成人(15才以上)1包, 7~14才 $\frac{2}{3}$ 包, 4~6才 $\frac{1}{2}$ 包, 2~3才 $\frac{1}{3}$ 包, 2才未満 $\frac{1}{4}$ 包を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用

〔包装・価格〕 45包 3,990円

〔その他〕 2008年9月発売

〔製造販売〕 クラシエ製薬

葛根湯

カコナル2葛根湯顆粒
〔満量処方〕

(第一三共ヘルスケア)

ひきはじめのかぜに1日2回の服用でしっかり効く

【区分】第2類医薬品

【成分】顆粒 2包中：

葛根湯エキス(乾燥)……………5.56g
下記生薬の水製抽出エキス

カクコン8g・マオウ4g・タイソウ4g・
ケイヒ3g・シャクヤク3g・カンゾウ2g・
ショウキョウ1g

【添加物】D-マンニトール、アセスルファムカリウム、
ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

【効能】感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、
手や肩の痛み

【用法・用量】成人(15才以上)1回1包、7～14才1回 $\frac{1}{2}$ 包、
4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包、2～3才1回 $\frac{1}{3}$ 包、1日2回。朝夕、食前又は食間に服用。
またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服

【製剤】淡褐色～褐色の顆粒

【包装・価格】6包 1,103円☆・12包 1,785円☆

【その他】2008年8月25日発売

【製造販売】新生薬品工業

カコナル葛根湯顆粒
〔満量処方〕

(第一三共ヘルスケア)

ひきはじめのかぜに良く効く
葛根湯製剤

【区分】第2類医薬品

【成分】顆粒 3包中：

葛根湯エキス(乾燥)……………5.56g
下記生薬の水製抽出エキス

カクコン8g・マオウ4g・タイソウ4g・
ケイヒ3g・シャクヤク3g・カンゾウ2g・
ショウキョウ1g

【添加物】D-マンニトール、アセスルファムカリウム、
ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg

【効能】感冒、鼻かぜ、頭痛、肩こり、筋肉痛、
手や肩の痛み

【用法・用量】成人(15才以上)1回1包、7～14才1回 $\frac{1}{2}$ 包、
4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包、2～3才1回 $\frac{1}{3}$ 包、1日3回。朝昼夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用。
またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服

【製剤】淡褐色～褐色の顆粒

【包装・価格】12包 1,103円☆

【その他】2008年8月25日発売

【製造販売】新生薬品工業

龍角散葛根湯液DX
(龍角散)

かぜのひきはじめにシナモン味の飲みやすい葛根湯液剤

【区分】第2類医薬品

【成分】内液 90mL中：

葛根湯エキス……………4,340mg
(カクコン8.0g・マオウ4.0g・タイソウ4.0g・
ケイヒ3.0g・シャクヤク3.0g・カンゾウ2.0g・
ショウキョウ1.0g)

【添加物】白糖、D-ソルビトール液、ハチミツ、
ステアリン酸ポリオキシル、安息香酸Na、
バラベン、香料

【効能】かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、
頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻づまり、鼻水、
のどの痛み)

【用法・用量】成人(15才以上)1回1本、1日3回
食間によく振ってから服用

【製剤】褐色の内用液剤

【包装・価格】30mL×3本 980円

【その他】2008年4月1日発売

【製造販売】滋賀県製薬

小青竜湯

ロート小青竜湯錠
(ロート製薬)

アレルギー反応などに働き、グズグズ鼻水、
鼻炎に効く

【区分】第2類医薬品

【成分】錠 12錠中：

小青竜湯エキス……………2.5g
(ハング3.0g・カンゾウ1.5g・ケイヒ1.5g・
ゴミシ1.5g・サイシン1.5g・シャクヤク1.5g・
マオウ1.5g・ショウキョウ1.5gより抽出)

【添加物】CMC-Ca、水酸化Al/Mg、メタケイ酸アルミン酸Mg、
ステアリン酸Mg、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、
セルロース

【効能】気管支炎、気管支ぜんそく、鼻水、
うすい水様のたんを伴う咳、鼻炎

【用法・用量】成人(15才以上)1回4錠、7～14才1回3錠、
5～6才1回2錠、1日3回食前又は食間に服用

【製剤】淡褐色～褐色の素剤

【包装・価格】84錠 1,600円

【その他】2009年1月13日発売

【製造販売】大峰堂薬品工業

しんいせいはいとう
 辛夷清肺湯

 チクナイン
 (小林製薬)

症状を楽にしながら、ちくのう症を改善していく内服薬

区分 第2類医薬品

成分 顆 2包(1日量)中：

辛夷清肺湯エキス粉末……………2,500mg
 (シンイ1.5g・オウゴン1.5g・セッコウ3.0g・チモ1.5g・サンシシ0.75g・ショウマ0.75g・ビヤクゴウ1.5g・バクモンドウ3.0g・ビワヨウ0.5g)

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、含水二酸化ケイ素、乳糖水和物

効能 蓄膿症、慢性鼻炎、鼻づまり

用法・用量 次の量を朝夕1日2回、食前または食間に水または白湯で服用する。
 成人(15才以上)1包、7～14才 $\frac{2}{3}$ 包、4～6才 $\frac{1}{2}$ 包、2～3才 $\frac{1}{3}$ 包

製剤 淡褐色～褐色の顆粒

包装・価格 14包 2,000円

その他 2008年9月18日発売

 せいしんれんしんいん
 清心蓮子飲

 ユリナール J
 (小林製薬)

夜2回以上トイレに行く「夜間頻尿」に

区分 第2類医薬品

成分 錠 12錠(1日量)中：

清心蓮子飲乾燥エキスEX……………2,238mg
 (レンニク3.5g・バクモンドウ2.1g・ブクリョウ2.8g・ニンジン3.5g・シャゼンシ2.1g・オウゴン2.1g・オウギ2.8g・ジコッピ2.1g・カンゾウ0.7g)

添加物 無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、結晶セルロース、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、クロスポビドン、ステアリン酸Mg、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、香料

効能 全身倦怠感があり、口や舌が乾き、尿が出しづるものの諸症：頻尿、残尿感、排尿痛

用法・用量 成人(15才以上)1回4錠、1日3回。食前または食間に服用

製剤 淡褐色～褐色の錠剤

包装・価格 72錠 2,500円

その他 2008年9月4日発売

製造販売 共栄製薬工業

 まおうとう
 麻黄湯

 コルゲンコーワ液体かぜ薬
 (興和)

寒け・発熱、ふしぶしの痛みなどのかぜの初期症状に

区分 第2類医薬品

成分 内液 3本(90mL)中：

麻黄湯エキス……………81mL
 (マオウ5.0g・ケイヒ4.0g・キョウニン5.0g・カンゾウ1.5g)

添加物 白糖、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール

効能 風邪のひきはじめて、さむけがして発熱、頭痛があり、身体の不しぶしが痛い場合の次の諸症：感冒、鼻かぜ

用法・用量 成人(15才以上)1回1本、1日3回、食前又は食間によく振ってから服用

製品特有の注意 本剤は生薬成分配合のため、沈殿を生じることがあるので、服用の際にはピンをよく振ること

製剤 黄褐色の内服液

包装・価格 3本 1,000円

その他 2008年10月3日発売

販売 興和新薬

生薬製剤

扁鵲

(大鵬薬品工業)

11種類の生薬が脂肪過多症に効く

区分 第2類医薬品

成分 散 3包中：

- タクシャ末……………0.86g
- ダイオウ末……………0.43g
- ショウキョウ末……………0.43g
- カンゾウ末……………0.43g
- ケイヒ末……………0.43g
- シャクヤク末……………0.43g
- ボタンビ末……………0.43g
- チョレイ末……………0.86g
- サイコ末……………0.86g
- ハンゲ末……………0.43g
- ショウマ末……………0.43g

効能 脂肪過多症

用法・用量 成人(16才以上)1回1包, 7~15才1回½包。1日3回食間に水又はお湯にて服用

製品特有の注意 天然の生薬を原料として製造しているため、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがある

製剤 茶色の散剤

包装・価格 60包 4,800円

その他 2007年7月3日発売

製造販売 建林松鶴堂

禁煙補助薬

シガノンCQ1

(大正製薬)

パッチタイプの禁煙補助剤

区分 第1類医薬品

成分 硬 1枚(44mm×34mm)中：

ニコチン……………78mg

添加物 エチレン, 酢酸ビニル共重合体, ポリイソブチレン, ポリエチレン

効能 禁煙時のイライラ・集中困難・落ちつかないなどの症状の緩和

用法・用量 胸, 背中, 腕のいずれかを選び, 次の期間1日1回1枚を起床時に貼付し, 就寝前にはがす。なお, 貼付部位は毎日変える。シガノンCQ1: 最初の6週間。シガノンCQ2: 次の2週間。ただし, シガノンCQ1を6週間貼付後, 禁煙時のイライラなどの症状がなくなり, 禁煙継続に自信がある場合は, シガノンCQ2を使用しなくてもよい

製剤 うすいだい色の硬膏剤

包装・価格 7枚 2,800円・14枚 5,400円

その他 指

2008年7月1日発売

製造販売 グラクソ・スミスクライン

シガノンCQ2

(大正製薬)

パッチタイプの禁煙補助剤

区分 第1類医薬品

成分 硬 1枚(25mm×28mm)中：

ニコチン……………36mg

添加物 エチレン, 酢酸ビニル共重合体, ポリイソブチレン, ポリエチレン

効能 禁煙時のイライラ・集中困難・落ちつかないなどの症状の緩和

用法・用量 胸, 背中, 腕のいずれかを選び, 次の期間1日1回1枚を起床時に貼付し, 就寝前にはがす。なお, 貼付部位は毎日変える。シガノンCQ1: 最初の6週間。シガノンCQ2: 次の2週間。ただし, シガノンCQ1を6週間貼付後, 禁煙時のイライラなどの症状がなくなり, 禁煙継続に自信がある場合は, シガノンCQ2を使用しなくてもよい

製剤 うすいだい色の硬膏剤

包装・価格 7枚 2,500円

その他 指

2008年7月1日発売

製造販売 グラクソ・スミスクライン

ニコチネル パッチ10

(ノバルティス ファーマ)

1日1回貼るだけ
2ステップの禁煙プログラム

区分 第1類医薬品

成分 硬 1枚(10cm²)中：

ニコチン……………17.5mg

添加物 アミノアルキルメタアクリレートコポリマー-E, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, その他1成分

効能 禁煙時のイライラ・集中困難・落ちつかないなどの症状の緩和

用法・用量 最初の6週間はニコチネルパッチ20を1日1回, 1枚を起床時から就寝時まで貼付し, 次の2週間はニコチネルパッチ10を1日1回, 1枚を起床時から就寝時まで貼付。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり, 禁煙を続ける意志が強く, 禁煙を続けられる自信がある場合には, 6週間のニコチネルパッチ20を使用後, 7週目以降のニコチネルパッチ10を使用せずに, 本剤の使用を中止してもよい。上腕部, 腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付

製剤 粘着面が微黄色～淡黄色, 支持体がうすいだい色の円形の平板

包装・価格 7枚 2,500円・14枚 4,800円

その他 指

2008年5月31日発売

ニコチネル パッチ20

(ノバルティス ファーマ)

1日1回貼るだけ
2ステップの禁煙プログラム

区分 第1類医薬品

成分 硬 1枚(20cm²)中：

ニコチン……………35mg

添加物 アミノアルキルメタアクリレートコポリマー-E, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, その他1成分

効能 禁煙時のイライラ・集中困難・落ちつかないなどの症状の緩和

用法・用量 最初の6週間はニコチネルパッチ20を1日1回, 1枚を起床時から就寝時まで貼付し, 次の2週間はニコチネルパッチ10を1日1回, 1枚を起床時から就寝時まで貼付。禁煙によるイライラなどの症状がなくなり, 禁煙を続ける意志が強く, 禁煙を続けられる自信がある場合には, 6週間のニコチネルパッチ20を使用後, 7週目以降のニコチネルパッチ10を使用せずに, 本剤の使用を中止してもよい。上腕部, 腹部あるいは腰背部に毎日場所を変えて貼付

【製剤】 粘着面が微黄色～淡黄色，支持体がうすいだいだいの円形の平板

【包装・価格】 7枚 2,800円・14枚 5,400円

【その他】 指

2008年5月31日発売

ニコチネル ミント
(ノバルティス ファーマ)

糖衣タイプでミント風味のニコチンガム製剤

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 阻 1個中：

ニコチン.....2mg

【添加物】 BHT，タルク，炭酸カルシウム，炭酸ナトリウム，炭酸水素ナトリウム，グリセリン，L-メントール，ハッカ油，D-ソルビトール，サッカリン，サッカリンナトリウム，アセスルファムカリウム，キシリトール，D-マンニトール，ゼラチン，酸化チタン，カルナウバロウ，その他9成分

【効能】 禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

【用法・用量】 タバコを吸いたいと思ったとき，1回1個をゆっくりと間をおきながら，30～60分間かけてかむ。1日の使用個数は，通常，1日4～12個から始めて適宜増減するが，1日の総使用個数は24個を超えないこと。禁煙になれてきたら(1ヵ月前後)，1週間ごとに1日の使用個数を1～2個ずつ減らし，1日の使用個数が1～2個となった段階で使用をやめる。なお，使用期間は3ヵ月をめどとする

【製剤】 灰白色の四角形の糖衣ガム

【包装・価格】 10個 933円・30個 2,648円

【その他】 2008年10月7日発売

ニコレット パッチ1
(武田薬品工業)

タバコをやめたい人に

【区分】 第1類医薬品

【成分】 硬 1枚中：

ニコチン.....24.9mg

【添加物】 ポリイソブチレン，ポリブテン

【効能】 禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

【用法・用量】 最初の6週間はニコレットパッチ1を1日1回1枚，起床時に貼付し，約16時間を目安に使用し，就寝前にはがす。次の2週間はニコレットパッチ2を，その次の2週間はニコレットパッチ3を1日1回1枚，同様に使用する。なお本剤は，上腕部または腰周辺部に貼付し，貼付場所は毎日変える。ニコレットパッチ1を6週間貼付以降，禁煙によるイライラなどの症状がなくなり，禁煙を

続けられる自信がある場合にはニコレットパッチ2あるいはニコレットパッチ3を使用せずに，本剤の使用を中止することもできる

【製品特有の注意】 貼付したまま入浴する場合は，入浴後，上からそっと叩くように水気を拭き取ること

【製剤】 白色～淡黄色のプラスター

【包装・価格】 7枚 2,800円・14枚 5,400円

【その他】 指

2008年7月1日発売

【製造販売】 ジョンソン・エンド・ジョンソン

ニコレット パッチ2
(武田薬品工業)

タバコをやめたい人に

【区分】 第1類医薬品

【成分】 硬 1枚中：

ニコチン.....16.6mg

【添加物】 ポリイソブチレン，ポリブテン

【効能】 禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

【用法・用量】 最初の6週間はニコレットパッチ1を1日1回1枚，起床時に貼付し，約16時間を目安に使用し，就寝前にはがす。次の2週間はニコレットパッチ2を，その次の2週間はニコレットパッチ3を1日1回1枚，同様に使用する。なお本剤は，上腕部または腰周辺部に貼付し，貼付場所は毎日変える。ニコレットパッチ1を6週間貼付以降，禁煙によるイライラなどの症状がなくなり，禁煙を続けられる自信がある場合にはニコレットパッチ2あるいはニコレットパッチ3を使用せずに，本剤の使用を中止することもできる

【製品特有の注意】 貼付したまま入浴する場合は，入浴後，上からそっと叩くように水気を拭き取ること

【製剤】 白色～淡黄色のプラスター

【包装・価格】 7枚 2,500円

【その他】 指

2008年7月1日発売

【製造販売】 ジョンソン・エンド・ジョンソン

ニコレット パッチ3
(武田薬品工業)

タバコをやめたい人に

【区分】 第1類医薬品

【成分】 硬 1枚中：

ニコチン.....8.3mg

【添加物】 ポリイソブチレン，ポリブテン

【効能】 禁煙時のイライラ・集中困難・落ち着かないなどの症状の緩和

【用法・用量】 最初の6週間はニコレットパッチ1を1日1回1枚，起床時に貼付し，約16時間を目安に使用し，就寝前にはがす。次の2週間はニコレットパッチ2を，その次の2週間はニコレットパッチ3を1日1回1枚，同様に使用する。なお本剤は，上腕部または腰周辺部に貼付し，貼付場所は毎日変える。ニコレットパッチ1を6週間貼付以降，禁煙によるイライラなどの症状がなくなり，禁煙を続けられる自信がある場合にはニコレットパッチ2あるいはニコレットパッチ3を使用せずに，本剤の使用を中止することもできる

【製品特有の注意】 貼付したまま入浴する場合は，入浴後，上からそっと叩くように水気を拭き取ること

【製剤】 白色～淡黄色のプラスター

【包装・価格】 7枚 2,400円

【その他】 指

2008年7月1日発売

【製造販売】 ジョンソン・エンド・ジョンソン

のど清涼剤

薬用
エスタックのど飴EX
 エスエスのど飴EX
 (エスエス製薬)

8種の生薬成分配合 かぜな
 のどの炎症に

成分 12粒中：
 オウヒエキス…………… 12mg
 (オウヒ300mgに相当)
 カンゾウエキス…………… 62.5mg
 (カンゾウ250mgに相当)
 キキョウエキス…………… 50mg
 (キキョウ200mgに相当)
 セネガエキス…………… 10mg
 (セネガ100mgに相当)
 ケイヒエキス……………22.51mg
 (ケイヒ500mgに相当)
 ショウキョウエキス……………29.13mg
 (ショウキョウ300mgに相当)
 ソヨウエキス…………… 40mg
 (ソヨウ200mgに相当)
 チンビエキス…………… 100mg
 (チンビ500mgに相当)

添加物 白糖, 水アメ, グリセリン脂肪酸エステル, l-メントール, 香料

効能 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ, たん

用法・用量 成人(15才以上)1回2粒を1日3回, 口中に含み, かまわずにゆっくり溶かす

製剤 褐色トローチ剤

包装・価格 12粒 305円

その他 2008年9月22日発売

製造販売 高市製薬

薬用
ルルのど飴
はちみつキンカン味
 ルルのど飴HK
 (第一三共ヘルスケア)

のどのあれ, 痛みにスーッと
 効く, 4種の生薬配合

成分 12粒中：
 オウヒエキス…………… 12mg
 (オウヒとして300mg)
 カンゾウエキス…………… 62.5mg
 (カンゾウとして250mg)
 キキョウエキス…………… 200mg
 (キキョウとして200mg)
 ショウキョウエキス……………29.13mg
 (ショウキョウとして300mg)

添加物 シリコーン樹脂, ポリソルベート80,

アセスルファミカリウム, 塩化ナトリウム, コハク酸二ナトリウム六水和物, l-メントール, DL-リンゴ酸, 還元水アメ, ソルビタン脂肪酸エステル, グリセリン脂肪酸エステル, 繊維素グリコール酸ナトリウム, 香料, トコフェロール

効能 のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・声がれ・のどのはれ・のどの不快感, たん

用法・用量 成人(15才以上)1回2粒, 1日3回, 口中に含み, かまわずにゆっくり溶かして服用

製剤 褐色のトローチ剤

包装・価格 12粒 280円☆

その他 2008年9月22日発売

製造販売 浅田飴

口腔咽喉薬

アサダアメ
ガードドロップAP
 (浅田飴)

のどのあれ, 痛みに

成分 12粒中：
 セチルピリジニウム塩化物水和物…………6mg

添加物 還元水アメ, グリチルリチン酸2K, アセスルファミK, DL-リンゴ酸, 銅クロロフィリンNa, ポリソルベート80, l-メントール, D-ソルビトール, シリコーン樹脂, ソルビタン脂肪酸エステル, グリセリン脂肪酸エステル, 繊維素グリコール酸Na, 香料, エタノール

効能 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ, 口腔内の殺菌・消毒, 口臭の除去

用法・用量 成人(15才以上)及び5才以上の小児1回2粒。1日3～6回。1粒ずつ2粒までを口中に含み, かまわずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用

製剤 淡緑色の青リンゴ味のドロップ剤

包装・価格 24粒 350円

その他 2008年9月1日発売

アサダアメ
ガードドロップGF
 (浅田飴)

のどのあれ, 痛みに

成分 12粒中：
 セチルピリジニウム塩化物水和物…………6mg

添加物 還元水アメ, グリチルリチン酸2K, アセスルファミK, DL-リンゴ酸, カラメル, ポリソルベート80, l-メントール, D-ソルビトール, シリコーン樹脂, ソルビタン脂肪酸エステル, グリセリン脂肪酸エステル, 繊維素グリコール酸Na, 香料

効能 のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ, 口腔内の殺菌・消毒, 口臭の除去

用法・用量 成人(15才以上)及び5才以上の小児1回2粒。1日3～6回。1粒ずつ2粒までを口中に含み, かまわずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用

製剤 淡黄色のグレープフルーツ味のドロップ剤

包装・価格 24粒 350円

その他 2008年9月1日発売

愛称 エスタック
クールトローチ

エスタックトローチC
(エスエス製薬)

のどの痛い時 かぜなどの
どの炎症に

成分 1錠中：
セチルピリジニウム塩化物水和物……6mg
グリチルリチン酸二カリウム……15mg
キキョウエキス……120mg
(キキョウ480mgに相当)

添加物 キシリトール、白糖、ポピドン、マクロゴール、ステアリン酸Ca、プロピレングリコール、エリスリトール、L-メントール、黄色5号、香料

効能 口腔内の殺菌・消毒、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口臭の除去

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠を1日6回、5才～14才1回1錠を1日3回、口中に含み、かまわずにゆっくり溶かす。使用間隔は2時間以上おく

製剤 褐色トローチ剤

包装・価格 12錠 500円

その他 2008年9月29日発売
製造販売 日新薬品工業

愛称 パブロンうがい365

パブロンうがいSP
(大正製薬)

お口の中の殺菌・消毒に

成分 外液 100mL中：
塩化セチルピリジニウム……0.25g
グリチルリチン酸二カリウム……0.25g
L-メントール……0.25g

添加物 エタノール、青色1号、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回約1mL(1押し)を約50mL(コップ約1/4量)の水でうすめ、1日数回うがいをする

製品特有の注意 プラスチック類、塗装面に付着すると変質することがある

製剤 青色澄明の液

包装・価格 270mL 1,500円

その他 2008年8月28日発売
製造販売 前田薬品工業

健胃清涼剤

太田胃散<内服液>S
(太田胃散)

二日酔・食べすぎのムカムカ
にスッキリ味が効く

成分 内液 1本(50mL)中：
ホップ流エキス……0.17mL
(原薬換算量：170mg)
ケイヒ流エキス……0.25mL
(原薬換算量：250mg)
ウイキョウ流エキス……0.15mL
(原薬換算量：150mg)
チョウジエキス……606mg
(原薬換算量：200mg)
チンピエキス……50mg
(原薬換算量：250mg)
ショウキョウ流エキス……0.25mL
(原薬換算量：250mg)
カンゾウ抽出物……10.5mg
(原薬換算量：150mg)
カルニチン塩化物……160mg

添加物 L-メントール、安息香酸Na、バラベン、エタノール、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、pH調整剤、香料、白糖

効能 飲みすぎ又は食べすぎによる胃部不快感及びはきけ(二日酔・悪酔いのむかつき、胃のむかつき、悪心)

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を食前、食後又は就寝前に服用

製品特有の注意 沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する

製剤 淡黄褐色の液

包装・価格 1本 350円

その他 2008年9月3日発売
製造販売 日新薬品工業

キャベ2コーワソフト
(興和)

7種の健胃生薬を配合した食
前服用タイプの健胃清涼剤

成分 顆粒 3包中：
塩化カルニチン……120mg
ウコン末……100mg
サンショウ軟エキス……25mg
(サンショウとして82.5mg)
ニンジン乾燥エキス-E……10mg
(ニンジンとして145mg)
ショウキョウ末……180mg
チンピエキス……40mg
(チンピとして320mg)
ウイキョウ末……100mg
チョウジ末……50mg

カンゾウエキス末……70mg
(カンゾウとして490mg)

添加物 カルメロースCa、硬化油、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、二酸化ケイ素、L-メントール、キシリトール、エタノール

効能 食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

用法・用量 成人(15才以上)1回1包、1日3回食前に服用

製剤 黄褐色の顆粒剤

包装・価格 1包 120円

その他 2008年11月3日発売
販売 興和新薬

健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの

顆粒わかもと

(わかもと製薬)

消化酵素、乳酸菌、ビール酵母配合の顆粒タイプ胃腸薬

成分 顆 3包中:

アスペルギルス・オリゼーNK菌
(消化酵素産生菌)培養末…………… 3,375mg
乳酸菌培養末…………… 675mg
乾燥酵母(ビール酵母)…………… 2,490.1mg
チアミン硝酸化物(ビタミンB₁)…………… 3.4mg
リボフラビン(ビタミンB₂)…………… 2mg
ニコチン酸アミド…………… 2mg

添加物 沈降炭酸カルシウム

効能 胃もたれ、食欲不振、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、食べ過ぎ、胸つかえ、消化促進。整腸(便通を整える)、軟便、便秘、腹部膨満感。滋養強壯、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回1包、11～14才1回 $\frac{1}{2}$ 包、8～10才1回 $\frac{1}{4}$ 包、5～7才1回 $\frac{1}{8}$ 包。1日3回。食後に服用

製品特有の注意 1包の分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してなるべく湿気を防いで保管し、2日以内に服用

製剤 淡灰褐色の顆粒

包装・価格 24包 998円

その他 2008年8月1日発売

ビタミンEC剤

ハイチオール ECドリンク

エスプラスEC
(エスエス製薬)

カラダの内側からビタミンE & Cの補給

成分 内液 1瓶(50mL)中:

ビタミンC…………… 500mg
酢酸*d*- α -トコフェロール…………… 100mg
ビタミンB₆…………… 25mg
パンテノール…………… 15mg
ニコチン酸アミド…………… 20mg
添加物 白糖、アルコール、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸Na、メタリン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料

効能 肉体疲労時、病中病後の体力低下時又は中高年期のビタミンECの補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用

製剤 黄色内服液剤

包装・価格 50mL 220円

その他 2008年3月発売

ビタミン含有保健剤

アリナミンR

(武田薬品工業)

肉体疲労時の栄養補給、滋養強壯に

成分 内液 1瓶(80mL)中:

フルスルチアミン塩酸塩(ビタミンB誘導体)…………… 5mg
リボフラビン…………… 2mg
ピリドキシン塩酸塩…………… 10mg
L-バリン…………… 80mg
L-ロイシン…………… 160mg
L-イソロイシン…………… 80mg
カルニチン塩化物…………… 50mg

添加物 還元麦芽糖水アメ、スクラロース、ステビア抽出精製物、クエン酸水和物、酒石酸、DL-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、pH調整剤

効能 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給。滋養強壯。虚弱体質

用法・用量 15才以上は1日1回1瓶(80mL)を服用

製品特有の注意 服用により尿が黄色くなることがある

製剤 黄色の澄明な液

包装・価格 80mL 300円

その他 2009年3月2日発売

アルフェネオ

(大正製薬)

鉄分配合なのに服用しやすいミニドリンク剤

成分 内液 50mL中:

クエン酸鉄アンモニウム…………… 20mg
ローヤルゼリー…………… 100mg
L-アスパラギン酸マグネシウム…………… 150mg
リン酸水素カルシウム水和物…………… 130mg
チアミン硝酸化物(ビタミンB₁)…………… 2.5mg
リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム(ビタミンB₂)…………… 3mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…………… 5mg
タウリン…………… 500mg
無水カフェイン…………… 50mg

添加物 ブドウ糖、D-ソルビトール、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、スクラロース、アセスルファムK、pH調節剤、安息香酸、没食子酸プロピル、香料、バニリン

効能 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。滋養強壯。虚弱体質

用法・用量 成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用
製品特有の注意 服用により尿が黄色になることがある
製剤 黄色の液
包装・価格 50mL 220円・50mL×3本 660円
その他 2008年7月21日発売

（変称） **エスタック**
サーモ滋養液C
 エスタック滋養液S-II
 （エスエス製薬）
 弱った体 早めの1本 栄養補給

（成分）内液 50mL中：
 ショウキョウエキス……………111.1mg
 （ショウキョウ1,000mgに相当）
 シゴカエキス…………… 30mg
 （シゴカ600mgに相当）
 タイソウエキス…………… 100mg
 （タイソウ250mgに相当）
 シャクヤクエキス…………… 30mg
 （シャクヤク120mgに相当）
 ケイヒ流エキス……………0.15mL
 （ケイヒ150mgに相当）
 カンゾウ流エキス…………… 0.1mL
 （カンゾウ100mgに相当）
 アスכולビン酸（ビタミンC）……217.3mg
 アスכולビン酸ナトリウム………318mg
 （ビタミンCとして282.7mg）
 ニコチン酸アミド…………… 60mg
 ビリドキシン塩酸塩（ビタミンB₆）… 10mg
 リポフラビンリン酸エステルナ
 トリウム（ビタミンB₂リン酸エステル）… 10mg
 タウリン……………1,500mg
 ローヤルゼリーチンキ…………… 100mg
 （生ローヤルゼリー100mgに相当）
 （アルコール…………… 0.2mL以下）
（添加物） D-ソルビトール、白糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、香料
（効能） 発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・栄養障害・食欲不振・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
（用法・用量） 成人（15才以上）1日1回1瓶（50mL）服用
（製品特有の注意） 濁りを生じることがある。よく振ってから服用すること
（製剤） 褐色の液
（包装・価格） 50mL 475円
（その他） 2008年9月29日発売

（変称） **エスタック滋養液**
Wプラス
 エスタック滋養液W-II
 （エスエス製薬）
 ローヤルゼリー配合 かぜなどの発熱で体がだるい時の栄養補給

（成分）内液 50mL中：
 ローヤルゼリーチンキ…………… 100mg
 （生ローヤルゼリー100mgに相当）
 シャクヤクエキス30mg
 （シャクヤク120mgに相当）
 カンゾウ流エキス…………… 0.1mL
 （カンゾウ100mgに相当）
 ケイヒ流エキス……………0.15mL
 （ケイヒ150mgに相当）
 タイソウエキス…………… 100mg
 （タイソウ250mgに相当）
 ショウキョウエキス…………… 50mg
 （ショウキョウ450mgに相当）
 ビタミンB₂リン酸エステル………… 10mg
 ビタミンB₆…………… 10mg
 ニコチン酸アミド…………… 60mg
 タウリン……………1,000mg
 L-バリン……………24mg
 L-ロイシン……………24mg
 L-イソロイシン……………24mg
 コンドロイチン硫酸ナトリウム… 120mg
 （アルコール…………… 0.2mL以下）
（添加物） D-ソルビトール、白糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、カラメル、DL-リンゴ酸、香料
（効能） 発熱性消耗性疾患・病中病後・肉体疲労・栄養障害・食欲不振・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
（用法・用量） 成人（15才以上）1日1回1瓶（50mL）服用
（製品特有の注意） 濁りを生じることがある。よく振ってから服用すること
（製剤） 褐色の液
（包装・価格） 50mL 286円
（その他） 2008年10月6日発売

幸健生彩
 （養命酒製造）
 生薬にビタミン、タウリンを配合した滋養強壮薬です

（成分）錠 4錠中：
 シャクヤクエキス…………… 34.3mg
 ケイヒエキス…………… 23.4mg
 カンゾウエキス…………… 25mg
 タイソウエキス…………… 80mg
 ショウキョウエキス…………… 22.2mg

ニンジンエキス……………181.8mg
 リン酸リポフラビンナトリウム……5mg
 塩酸ビリドキシン…………… 10mg
 酢酸トコフェロール…………… 10mg
 ニコチン酸アミド…………… 20mg
 アミノエチルスルホン酸…………… 300mg
（添加物） 無水ケイ酸、乳糖、還元麦芽糖水アメ、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール、酸化チタン、マクロゴール、タルク、三酸化鉄
（効能） 胃腸障害・肉体疲労・病中病後・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、虚弱体質、滋養強壮
（用法・用量） 成人（15才以上）1回2錠を、1日2回朝夕に服用
（製剤） フィルムコート錠
（包装・価格） 80錠 2,940円
（その他） 2006年4月1日発売
（製造販売） 松浦薬業

（変称） **エスエス滋養錠**
シスミンC
 （エスエス製薬）
 かぜなどの熱で体がだるい・食欲不振時の栄養補給に

（成分）錠 6錠中：
 アスכולビン酸（ビタミンC）……… 500mg
 L-システイン…………… 160mg
 ニコチン酸アミド…………… 60mg
 リポフラビン（ビタミンB₂）……… 12mg
（添加物） 無水ケイ酸、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、リン酸水素Ca、アラビアゴム、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン
（効能） 発熱性消耗性疾患・食欲不振・肉体疲労・病中病後・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給、滋養強壮、虚弱体質
（用法・用量） 成人（15才以上）1回2錠を1日3回、毎食後に服用
（製品特有の注意） 服用により尿が黄色になることがある
（製剤） 白色の糖衣錠
（包装・価格） 6錠 314円
（その他） 2008年10月6日発売
（製造販売） 寧薬化学工業

チョコラBBローヤル2 (エーザイ)

ビタミンB₂配合の50mLドリンク剤

成分 **内液** 1瓶(50mL)中：
 ビタミンB₂リン酸エステル…………… 15mg
 ビタミンB₆…………… 10mg
 ビタミンB₁硝酸塩…………… 10mg
 ローヤルゼリーチンキ…………… 300mg
 (ローヤルゼリーとして300mg)
 タウリン…………… 1000mg
 グリシン…………… 50mg
 L-アルギニン塩酸塩…………… 100mg
 L-リジン塩酸塩…………… 100mg
 トチュウ葉流エキス…………… 0.06mL
 (トチュウ葉として60mg)
 ニコチン酸アミド…………… 40mg
 カフェイン水和物…………… 50mg
 (アルコール…………… 0.49mL以下)
添加物 安息香酸Na, エチルバニリン, 果糖, クエン酸, クエン酸Na, グリセリン, バニリン, パラベン, プロピレングリコール, 香料, アセスルファムK, DL-アラニン, エリスリトール, スクラロース, 没食子酸プロピル, DL-リンゴ酸
効能 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。滋養強壯。虚弱体質
用法・用量 成人(15才以上)1日1回1瓶(50mL)を服用
製剤 黄色のほとんど澄明な液
包装・価格 50mL 286円
その他 2008年5月12日発売
 製造販売 第一薬品工業

ユンケル滋養液ゴールド (佐藤製薬)

6種類の生薬に各種ビタミンを配合した滋養強壯剤

成分 **内液** 50mL中：
 エゾウコギ流エキス…………… 1,000mg
 セイヨウサンザシエキス…………… 20mg
 クコシエキス…………… 300mg
 トシシ流エキス…………… 200mg
 トチュウ流エキス…………… 250mg
 ローヤルゼリー…………… 200mg
 リポフラビンリン酸エステル
 ナトリウム…………… 5mg
 酢酸d- α -トコフェロール…………… 10mg
 ニコチン酸アミド20mg
 コンドロイチン硫酸ナトリウム… 120mg
 無水カフェイン…………… 50mg
 (アルコール…………… 0.49mL以下)
添加物 白糖, ハチミツ, リンゴ濃縮果汁, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, カラメル,

安息香酸ナトリウム, パラベン, クエン酸, 香料
効能 滋養強壯。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
用法・用量 通常成人(15才以上)1回1本(50mL)を1日1回服用する
製剤 黄褐色のドリンク
包装・価格 50mL 762円

ユンケルローヤル顆粒 (佐藤製薬)

5種類の生薬に各種ビタミンを配合した顆粒の滋養強壯剤

成分 **顆** 2包(1包2g)中：
 ローヤルゼリー末…………… 50mg
 ニンジン流エキス…………… 41.38mg
 ガラナ流エキス…………… 60mg
 トシシ流エキス…………… 60mg
 クコシ流エキス…………… 200mg
 ドライビタミンE50%…………… 20mg
 ビリドキシリン塩酸塩…………… 10mg
 リポフラビン…………… 5mg
 無水カフェイン…………… 40mg
添加物 無水ケイ酸, 還元麦芽糖水アメ, マクロゴール, ヒドロキシプロピルセルロース, 白糖, d-リンゴ酸, サッカリンNa, 香料
効能 滋養強壯。虚弱体質。肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
用法・用量 通常成人(15才以上)1回1包を1日2回朝夕に服用する
製剤 黄色の顆粒
包装・価格 2包 300円

リポビタミンノンカフェ (大正製薬)

ノンカフェインの100mLドリンク剤

成分 **内液** 100mL中：
 タウリン…………… 1,000mg
 イノシトール…………… 50mg
 ニコチン酸アミド…………… 20mg
 チアミン硝化物(ビタミンB₁)…………… 5mg
 リポフラビンリン酸エステル
 ナトリウム(ビタミンB₂)…………… 15mg
 ビリドキシリン塩酸塩(ビタミンB₆)…………… 5mg
添加物 白糖, D-ソルビトール, クエン酸水和物, 安息香酸Na, 香料, グリセリン, バニリン
効能 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給。滋養強壯。虚弱体質

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用
製品特有の注意 服用により尿が黄色になることがある
製剤 黄色の液
包装・価格 100mL 146円
その他 2008年10月6日発売

ビタミンを含有する保健薬

（愛称） エスカップ3000

エスカップEX3000
（エスエス製薬）

ハードな仕事の疲れに

（成分） 内液 100mL中：

ビタミンB₁硝酸塩…………… 10mg
 ビタミンB₂リン酸エステル…………… 5mg
 ビタミンB₆…………… 5mg
 ニコチン酸アミド…………… 20mg
 無水カフェイン…………… 50mg
 カルニチン塩化物…………… 100mg
 グルコン酸カルシウム水和物…………… 450mg
 タウリン…………… 3,000mg
 コウジン流エキス…………… 0.6mL
 （紅参600mgに相当）
 ローヤルゼリーエキス…………… 200mg
 （ローヤルゼリー200mgに相当）
 （アルコール…………… 0.5mL以下）

（添加物） スクラロース、白糖、アルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、バラベン、カラメル、バニリン、*l*-メントール、*dl*-リンゴ酸、香料

（効能） 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給，滋養強壮，虚弱体質

（用法・用量） 成人（15才以上）1日1回1瓶服用

（製剤） 黄褐色内服液剤

（包装・価格） 100mL 300円

（その他） 2008年4月7日発売

**（愛称） リゲイン24
エグゼクティブ**

リゲインX3
（第一三共ヘルスケア）

タウリン3,000mg, リバオール
30mg, ビオタミ10mg配合

（成分） 内液 1本(100mL)中：

ビオタミ1（ベンフォチアミン：
 ビタミンB₁誘導体）…………… 10mg
 ビタミンB₂リン酸エステル…………… 5mg
 ビタミンB₆…………… 10mg
 ニコチン酸アミド…………… 20mg
 無水カフェイン…………… 50mg
 タウリン
 （アミノエチルスルホン酸）…………… 3,000mg
 リバオール（ジクロロ酢酸ジイソ
 プロピルアミン）…………… 30mg
 イノシトール…………… 150mg

（添加物） 白糖，D-ソルビトール，安息香酸Na，

マクログール，カラメル，クエン酸，DL-リンゴ酸，クエン酸Na，メタリン酸Na，香料，バニリン，プロピレングリコール，ビタミンE，グリセリン，エチルバニリン，ミツロウ，アルコール

（効能） 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・病中病後・栄養障害・食欲不振・産前産後などの場合の栄養補給，滋養強壮，虚弱体質

（用法・用量） 成人（15才以上）1日1回1本（100mL）を服用

（製剤） 黄褐色の液体

（包装・価格） 100mL 350円☆

（その他） 2008年3月25日発売

（製造販売） 田村薬品工業

50音順索引

(1)：第1類医薬品, (2)：指定第2類医薬品, (3)：第2類医薬品, (4)：第3類医薬品を表します)

【あ】

- アイビットウルノ ③ 10
- アサダアメガードドロップAP (部外品) 31
- アサダアメガードドロップGF (部外品) 31
- 浅田飴子供せきどめドロップY ② 2
- 浅田飴せきどめGA ② 2
- 浅田飴せきどめLE ② 2
- 浅田飴せきどめOG ② 2
- 浅田飴せきどめSD ② 3
- アセスE ② 15
- アセスメディクリーン ② 15
- アリナミンR (部外品) 33
- アルガード抗アレルギーカプセル ① 10
- アルガード鼻炎クールアップ ② 13
- アルフェネオ (部外品) 33

【い】

- イソジンうがい薬P ③ 4
- イチジク浣腸薬おし ② 8
- インナーハーブ ② 9
- インナーバランス ③ 8

【う】

- ウエストンサラ ② 9
- ウレバールプラスクリーム ② 21
- ウレバールプラスローション10 ② 21

【え】

- エアーサロンパスDX ② 18
- (変称) エスエス滋養錠 (部外品) 34
- エスエスのど飴EX (部外品) 31
- (変称) エスカップ3000 (部外品) 36
- エスカップEX3000 (部外品) 36
- エスタックイブファイン顆粒 ① 1
- (変称) エスタッククルトローチ (部外品) 32
- (変称) エスタックサーモ滋養液c (部外品) 34
- エスタック滋養液S-II (部外品) 34
- エスタック滋養液W-II (部外品) 34
- (変称) エスタック滋養液Wプラス (部外品) 34
- エスタックトローチC (部外品) 32
- エスプラスEC (部外品) 33

【お】

- オイラックスソフト ③ 19
- 太田胃散チュアブルNEO ③ 5
- 太田胃散<内服液> ② 6
- 太田胃散<内服液>S (部外品) 32
- 乙字湯エキス顆粒〔「クラシエ」漢方〕
② 26
- オムニード0.5%ID ② 16

【か】

- カイベールアロエプラス ② 9

- カコナル2葛根湯顆粒〔満量処方〕
② 27
- カコナル葛根湯顆粒〔満量処方〕 ② 27
- ガスター10内服液 ① 6
- 葛根湯液DX〔龍角散〕 ② 27
- 活参28ROYAL ③ 26
- 顆粒わかもと (部外品) 33
- ガロール錠〔新〕 ③ 6
- 眼涼潤 ③ 12

【き】

- キャベ2コーワ〔新〕 ② 7
- キャベ2コーワソフト (部外品) 32
- キャベジンコーワS〔新〕 ② 7
- キンカン クールソフト ③ 20

【く】

- 「クラシエ」漢方乙字湯エキス顆粒 ② 26

【け】

- ケアレケア ③ 20
- 虔脩本方六神丸S ② 4

【こ】

- 幸健生彩 (部外品) 34
- こどもセンバアS液 ② 14
- コルゲンコーワIB「1日2回」Tカプセル
② 1
- コルゲンコーワ液体かぜ薬 ② 28
- コンビネートA錠 ② 1
- コンビネートB錠 ② 13
- コンビネートC錠 ② 3

【さ】

- サリドNWi ② 1
- サロンパスEX ② 16
- サロンパスローション ③ 18
- サンテ40i ③ 10

【し】

- シガノンCQ1 ① 29
- シガノンCQ2 ① 29
- シスミンC (部外品) 34
- シトリーヌα ③ 23
- ジーフォーL ② 15
- ジーフォーL軟膏 ② 16
- 若甦インペリアルソフトカプセルα ② 25
- 小児用ヒストミンかぜシロップS ② 1
- 新ガロール錠 ③ 6
- 新キャベ2コーワ ② 7
- 新キャベジンコーワS ② 7
- シンプトップ ③ 4

【す】

- スマイルコンタクトドライテクト ③ 12
- スルーラックデトファイバー ② 9

【せ】

- セイドーストッピー ② 8
- セロトピークリーム ② 19
- セロトピー軟膏 ② 20
- センバア液 ② 14

【そ】

- ソイアテロンP ③ 4

【た】

- タイガーバームスティックN ③ 18

【ち】

- チクナイン ② 28
- チョコラBBドリンクビット ③ 23
- チョコラBBルーセントC ③ 23
- チョコラBBローヤル2 (部外品) 35

【と】

- トクホンハップ(温)ID ② 17
- トクホンハップ(冷)ID ② 17
- トラフル錠 ③ 14
- トラベルミンチュロップぶどう味 ② 14
- ドルチツール ③ 4

【な】

- ナボリン フェルビナク70 ② 17
- なみだロートドライアイ・コンタクト
③ 12

【に】

- ニコチネル パッチ10 ① 29
- ニコチネル パッチ20 ① 29
- ニコチネル ミント ② 30
- ニコレット パッチ1 ① 30
- ニコレット パッチ2 ① 30
- ニコレット パッチ3 ① 30

【は】

- ハイウルソグリーンS ② 7
- (変称) ハイチオールECドリンク (部外品) 33
- バイロンハイ ② 1
- バスタイムFX-L温感 ② 17
- パブロン50 ② 2
- (変称) パブロンうがい365 (部外品) 32
- パブロンうがいSP (部外品) 32
- 貼るアクテージL ② 17
- 貼るアクテージミニ ② 17
- パンシロンAZ ② 5

2 ハンシ

バンシロンキュア ②	5
バンテリンコーワ1.0%クリーミーゲルLT ②	18
バンテリンコーワ1.0%クリームLT ②	19
バンテリンコーワ1.0%ゲルLT ②	19

【ひ】

ヒストミンかぜシロップS [小児用] ②	1
ビトンハイリッチ ③	24
ビーマTP健胃薬 ②	6

【ふ】

フェイタスL温感 ②	17
フェイタスゲル ②	19
フェイタスシップ ②	18
フェイタスチックEX ②	19
フェカルミンゴールド錠 ③	8
フェルゼアレチノバイタルクリーム ③	21
フチウナコーワ ②	20

【へ】

ペアA錠 ③	24
ペリコンS ②	3
扁鵲 ②	29

【ほ】

保元黄 ②	25
ホットミン ③	22
ホルユニーキングドリンク ②	25

【ま】

マイティアアイテクトアルビタット ②	11
マキロンsかゆみどめジェル ②	20
マキロンsキズ軟膏 ③	16

【め】

メディトリート ①	22
メンソレータムエクシブクリームd ②	21
メンソレータムエクシブスプレーd ②	21
メンソレータムフレディCC磨錠 ①	22
メンソレータムやわらか素肌クリームU ③	21

【や】

薬用エスタックのど飴EX ②	31
----------------	----

【ゆ】

ユースキン メディリップ ③	15
ユリナール J ②	28
ユンケル滋養液ゴールド ②	35
ユンケルローヤル顆粒 ②	35

【り】

リゲイン24エグゼクティブ ②	36
リゲインX3 ②	36
リポビタンノンカフェ ②	35
龍角散葛根湯液DX ②	27
龍角散ダイレクトスティックピーチ ②	3
龍角散ダイレクトスティックミント ②	3

【る】

ルルのど飴HK ②	31
ルルのど飴はちみつキンカン味 ②	31

【れ】

レオピンファイブネオ ②	25
レグツールE300 ③	22
レディガードコーワ ①	22

【ろ】

ロートV11 ②	10
ロートCキューブダブルチャージ ③	13
ロートCキューブダブルチャージ ③	12
ロートアルガードs ②	10
ロートアルガードST点眼薬 ②	11
ロートアルガードST鼻炎スプレー ②	13
ロートアルガードクリアブロック ②	11
ロートクール40 α ③	11
ロート小青竜湯錠 ②	27
ロートドライエイドEX ③	12
ロートドライエイドコンタクト ③	12

会社名別索引

①：第1類医薬品, ②：指定第2類医薬品, ③：第2類医薬品, ④：第3類医薬品を表します

浅田飴

- アサダアメガードロップAP(口腔咽喉薬) (部外品)31
- アサダアメガードロップGF(口腔咽喉薬) (部外品)31
- 浅田飴子供せきどめドロップY(鎮咳去たん薬) ②2
- 浅田飴せきどめGA(鎮咳去たん薬) ②2
- 浅田飴せきどめLE(鎮咳去たん薬) ②2
- 浅田飴せきどめOG(鎮咳去たん薬) ②2
- 浅田飴せきどめSD(鎮咳去たん薬) ②3
- ルルのど飴HK(のど清涼剤) (部外品)31
- 薬効 ルルのど飴はちみつキンカン味(のど清涼剤) (部外品)31

アラクス

- カイベールアロエプラス(便秘薬) ②9
- セイドーストッピー(止しゃ薬(下痢止め)) ②8

アルフレッサ ファーマ

- シンプトップ(高コレステロール低下薬) ③4

池田模範堂

- ケアレケア(かゆみ・虫さされ用薬) ③20

イチジク製薬

- イチジク浣腸薬おし(浣腸薬) ②8

エーザイ

- チョコラBBドリンクビット(ビタミンB₂主薬製剤) ③23
- チョコラBBルーセントC(ビタミンC主薬製剤) ③23
- チョコラBBローヤル2(ビタミン含有保健剤) (部外品)35
- トラベルミン チュロップぶどう味(乗物酔い薬) ②14
- ナボリン フェルピナク70(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ②17
- ホットミン(ビタミンE主薬製剤) ③22

エスエス製薬

- 薬効 エスエス滋養錠(ビタミン含有保健剤) (部外品)34
- エスエスのど飴EX(のど清涼剤) (部外品)31
- 薬効 エスカップ3000(ビタミンを含有する保健薬) (部外品)36
- エスカップEX3000(ビタミンを含有する保健薬) (部外品)36
- エスタックイブファイン顆粒(かぜ薬) ①1
- 薬効 エスタッククールトローチ(口腔

- 咽喉薬) (部外品)32
- 薬効 エスタックサーモ滋養液c(ビタミン含有保健剤) (部外品)34
- エスタック滋養液S-II(ビタミン含有保健剤) (部外品)34
- エスタック滋養液W-II(ビタミン含有保健剤) (部外品)34
- 薬効 エスタック滋養液Wプラス(ビタミン含有保健剤) (部外品)34
- エスタックトローチC(口腔咽喉薬) (部外品)32
- エスプラスEC(ビタミンEC剤) (部外品)33
- シスミンC(ビタミン含有保健剤) (部外品)34
- スルーラックデトファイバー(便秘薬) ②9
- 薬効 ハイチオールECドリンク(ビタミンEC剤) (部外品)33
- 薬効 薬用エスタックのど飴EX(のど清涼剤) (部外品)31

太田胃散

- 太田胃散チュアブルNEO(制酸薬) ③5
- 太田胃散<内服液>(健胃薬) ②6
- 太田胃散<内服液>S(健胃清涼剤) (部外品)32

金冠堂

- キンカン クールソフト(かゆみ・虫さされ用薬) ③20

グラクソ・スミスクライン

- シガノンCQ1(禁煙補助薬) ①29
- シガノンCQ2(禁煙補助薬) ①29

クラシエ薬品

- 「クラシエ」漢方乙字湯エキス顆粒(乙字湯) ②26
- 虔脩本方六神丸S(強心薬) ②4

廣貫堂

- 虔脩本方六神丸S(強心薬) ②4

興和

- キャベ2コーワソフト(健胃清涼剤) (部外品)32
- コルゲンコーワIB「1日2回」Tカプセル(かぜ薬) ②1
- コルゲンコーワ液体かぜ薬(麻黄湯) ②28
- 新キャベ2コーワ(複合胃腸薬) ②7
- 新キャベジンコーワS(複合胃腸薬) ②7
- バンテリンコーワ1.0%クリーミーゲルLT(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ②18
- バンテリンコーワ1.0%クリームLT

- (外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ②19
- バンテリンコーワ1.0%ゲルLT(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ②19
- ブチウナコーワ(かゆみ・虫さされ用薬) ②20
- レディガードコーワ(その他の女性用薬) ①22

小林製薬

- チクナイン(辛夷清肺湯) ②28
- ドルチトール(高コレステロール低下薬) ③4
- ユリナル J(清心蓮子飲) ②28

小林薬品工業

- ウエストンサラ(便秘薬) ②9
- 小児用ヒストミンかぜシロップS(かぜ薬) ②1
- ホルユニーキングドリンク(液剤) ②25
- レグトールE300(ビタミンE主薬製剤) ③22

佐藤製薬

- アセスE(歯槽膿漏薬) ②15
- アセスメディクリーン(歯槽膿漏薬) ②15
- ジーフォーL(痔疾用坐薬) ②15
- ジーフォーL軟膏(痔疾用軟膏) ②16
- セロトビークリーム(外用湿疹・皮膚炎用薬) ②19
- セロトビー軟膏(外用湿疹・皮膚炎用薬) ②20
- ハイウルソグリーンS(複合胃腸薬) ②7
- ユンケル滋養液ゴールド(ビタミン含有保健剤) (部外品)35
- ユンケルローヤル顆粒(ビタミン含有保健剤) (部外品)35

参天製薬

- サンテ40i(一般点眼薬) ③10

三宝製薬

- ソイアテロンP(高コレステロール低下薬) ③4
- ビーマTP健胃薬(健胃薬) ②6

塩野義製薬

- パイロンハイ(かぜ薬) ②1

資生堂

- インナーハーブ(便秘薬) ②9
- インナーバランス(整腸薬) ③8
- フェルゼアレチノバイタルクリーム(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) ③21

4 ジョンソン・エンド・ジョンソン

ジョンソン・エンド・ジョンソン
ニコレットパッチ1(禁煙補助薬) ① 30
ニコレットパッチ2(禁煙補助薬) ① 30
ニコレットパッチ3(禁煙補助薬) ① 30

スノーデン
活参28ROYAL(生薬主薬保健薬) ③ 26

第一三共ヘルスケア
オイラックスソフト(外用湿疹・皮膚炎用薬) ③ 19
カコナル2葛根湯顆粒〔満量処方〕(葛根湯) ② 27
カコナル葛根湯顆粒〔満量処方〕(葛根湯) ② 27
ガスター10内服液(H2ブロッカー) ① 6
サリドンWi(解熱鎮痛薬) ② 1
トラフル錠(口内炎用薬) ③ 14
ビトン-ハイリッチ(ビタミンEC主薬製剤) ③ 24
マキロンさゆみどめジェル(外用湿疹・皮膚炎用薬) ② 20
マキロンスキズ軟膏(外用殺菌消毒薬) ③ 16
(変形) リゲイン24エグゼクティブ(ビタミンを含有する保健薬) (部外品) 36
リゲインX3(ビタミンを含有する保健薬) (部外品) 36
ルルのど飴HK(のど清涼剤) (部外品) 31
(変形) ルルのど飴はちみつキンカン味(のど清涼剤) (部外品) 31

大正製薬
アルフェネオ(ビタミン含有保健剤) (部外品) 33
こどもセンバアS液(乗物酔い薬) ② 14
シガノンCQ1(禁煙補助薬) ① 29
シガノンCQ2(禁煙補助薬) ① 29
センバア液(乗物酔い薬) ② 14
パブロン50(かぜ薬) ② 2
(変形) パブロンうがい365(口腔咽喉薬) (部外品) 32
パブロンうがいSP(口腔咽喉薬) (部外品) 32
メディトリート(腔カンジダ用薬) ① 22
リポビタミンノンカフェ(ビタミン含有保健剤) (部外品) 35

大鵬薬品工業
ウレパールプラスクリーム(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) ② 21
ウレパールプラスローション10(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) ② 21
扁鵲(生薬製剤) ② 29

武田薬品工業
アリナミンR(ビタミン含有保健剤) (部外品) 33
ニコレットパッチ1(禁煙補助薬) ① 30
ニコレットパッチ2(禁煙補助薬) ① 30
ニコレットパッチ3(禁煙補助薬) ① 30
貼るアクテージL(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17

貼るアクテージミニ(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17
マイティアアイテクトアルビタット(アレルギー用点眼薬) ② 11

テイカ製薬
アイビットウルーノ(一般点眼薬) ③ 10

テイクコファルマケア
オムニーD0.5%ID(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 16

トクホン
トクホンハップ(温)ID(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17
トクホンハップ(冷)ID(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17

日新薬品工業
(変形) エスタッククールトローチ(口腔咽喉薬) (部外品) 32
エスタックトローチC(口腔咽喉薬) (部外品) 32
太田胃散<内服液>(健胃薬) ② 6
太田胃散<内服液>S(健胃清涼剤) (部外品) 32

日水製薬
新ガロール錠(健胃薬) ③ 6
保元黄(固形剤) ② 25

日東薬品工業
インナーバランス(整腸薬) ③ 8
若甦インペリアルソフトカプセルα(固形剤) ② 25
チョコラBBルーセントC(ビタミンC主薬製剤) ③ 23
フェカルミンゴールド錠(整腸薬) ③ 8

日邦薬品工業
若甦インペリアルソフトカプセルα(固形剤) ② 25

ノバルティス ファーマ
ニコチネルパッチ10(禁煙補助薬) ① 29
ニコチネルパッチ20(禁煙補助薬) ① 29
ニコチネルミント(禁煙補助薬) ② 30

久光製薬
エアーサロンバスDX(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ② 18
眼涼潤(人工涙液) ③ 12
サロンバスEX(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 16
サロンバスローション(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ③ 18
フェイタスL温感(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17
フェイタスジェル(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ② 19
フェイタスシップ(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 18

付薬)) ② 18
フェイタスチックEX(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ② 19

明治製菓
イソジンうがい薬P(うがい薬) ③ 4
活参28ROYAL(生薬主薬保健薬) ③ 26

祐徳薬品工業
バスタイムFX-L温感(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17
フェイタスL温感(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ② 17

ユースキン製薬
ユースキンメディリップ(口唇用薬) ③ 15

養命酒製造
幸健生彩(ビタミン含有保健剤) (部外品) 34

ライオン
スマイルコンタクトドライテクト(人工涙液) ③ 12
ベアA錠(ビタミンB2B6主薬製剤) ③ 24

龍角散
コンビネートA錠(解熱鎮痛薬) ② 1
コンビネートB錠(鼻炎用内服薬) ② 13
コンビネートC錠(鎮咳去たん薬) ② 3
タイガーバームスティックN(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ③ 18
ベリコンS(鎮咳去たん薬) ② 3
龍角散葛根湯液DX(葛根湯) ② 27
龍角散ダイレクトスティックピーチ(鎮咳去たん薬) ② 3
龍角散ダイレクトスティックミント(鎮咳去たん薬) ② 3

ロート製薬
アルガード抗アレルギーカプセル(内服アレルギー用薬) ① 10
アルガード鼻炎クールアップ(鼻炎用内服薬) ② 13
なみだロートドライアイ・コンタクト(人工涙液) ③ 12
パンシロンAZ(制酸薬) ② 5
パンシロンキュア(制酸薬) ② 5
メンソレータムエクシブクリームd(水虫・たむし用薬) ② 21
メンソレータムエクシブスプレーd(水虫・たむし用薬) ② 21
メンソレータムフレディCC腔錠(腔カンジダ用薬) ① 22
メンソレータムやわらか素肌クリームU(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) ③ 21
ロートV11(一般点眼薬) ② 10
ロートCキューブダブルチャージ(コンタクトレンズ装着液) ③ 13
ロートCキューブダブルチャージ(人工涙液) ③ 12

ロートアルガードs(一般点眼薬) ② …… 10
 ロートアルガードST点眼薬(アレルギー用点眼薬) ② …… 11
 ロートアルガードST鼻炎スプレー(鼻炎用点鼻薬) ② …… 13
 ロートアルガードクリアブロック(アレルギー用点眼薬) ② …… 11
 ロートクール40α(一般点眼薬) ③ …… 11
 ロート小青竜湯錠(小青竜湯) ② …… 27
 ロートドライエイドEX(人工涙液) ③ …… 12
 ロートドライエイドコンタクト(人工涙液) ③ …… 12

わかもと製薬

顆粒わかもと(健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの) (部外品) …… 33

湧永製薬

シトリーヌα(ビタミンC主薬製剤) ③ …… 23
 レオビンファイブネオ(液剤) ② …… 25