

「治療薬ハンドブック 2009—薬剤選択と処方のポイント」 お詫びと訂正

ご購入いただきました「治療薬ハンドブック 2009—薬剤選択と処方のポイント」（2009年1月発行）に下記の誤りがございました。お詫び致しますとともに、訂正くださいますようお願い申し上げます。

訂正場所	誤	正
マキサカルシトール 適応, 用法・用量欄 (223頁)	尋常性乾癬, 魚鱗癬群, 掌 蹠角化症	尋常性乾癬, 魚鱗癬群, 掌 蹠角化症, <u>掌蹠膿疱症</u>
ペプリジル塩酸塩水 和物 適応, 用法・用量欄 (279頁)	①持続性心房細動・頻脈性 不整脈(心室性)で他の抗不 整脈薬が使用できないか無 効の場合 (略) ②狭心症 →1日200mgを2回に分服, 適宜減量	①持続性心房細動で他の抗 不整脈薬が使用できないか <u>無効の場合</u> (略) ②頻脈性不整脈(心室性)で 他の抗不整脈薬が使用でき ないか無効の場合, <u>狭心症</u> →1日200mgを2回に分服
ラクトミン 臨床情報欄(小児) (442頁)	ウイルス性腸炎1日0.1mg/ kg分3.	ウイルス性腸炎 <u>1日0.1g/kg</u> <u>分3.</u>
アデホビルピボキシ ル 適応, 用法・用量欄 (515頁)	ラミブジン投与中にB型肝炎 ウイルスの持続的な再増 殖を伴う肝機能の異常が確 認された, B型慢性肝炎・ B型肝炎硬変におけるラミブ ジンとの併用によるウイル スマーカー及び肝機能の改 善 →1回10mgを1日1回, ラミ ブジン1回100mgを1日1回 併用	B型肝炎ウイルスの増殖を <u>伴い肝機能の異常が確認さ れたB型慢性肝疾患におけ るB型肝炎ウイルスの増殖 抑制</u> → <u>1回10mgを1日1回</u>

<p>ラミブジン 適応, 用法・用量欄 (516頁)</p>	<p>本剤単独：B型肝炎ウイルスの増殖を伴う肝機能の異常が確認されたB型慢性肝炎におけるウイルスマーカー・肝機能・肝組織像の改善, B型肝炎ウイルスの増殖を伴う肝機能の異常が確認されたB型肝炎硬変におけるウイルスマーカーの改善 →1日1回100mg アデホビルピボキシルとの併用：本剤投与中にB型肝炎ウイルスの持続的な再増殖を伴う肝機能の異常が確認された, B型慢性肝炎・B型肝炎硬変におけるウイルスマーカー・肝機能の改善 →1日1回100mg, アデホビルピボキシル1日1回10mg</p>	<p><u>B型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能の異常が確認されたB型慢性肝炎におけるB型肝炎ウイルスの増殖抑制</u> →1回100mgを1日1回</p>
<p>エストラジオール・レボノルゲストレル 適応, 用法・用量欄 (640頁)</p>	<p>閉経後骨粗鬆症</p>	<p>閉経後骨粗鬆症 →1日1錠</p>
<p>抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン 警告, 禁忌, 副作用等欄(835頁)</p>	<p>(半減期) 8.1時間(…)</p>	<p>(半減期) 8.1日(…)</p>
<p>ゲムシタピン塩酸塩 適応, 用法・用量欄 (883頁)</p>	<p>非小細胞肺癌, 膀胱癌, 胆道癌</p>	<p>非小細胞肺癌, 膀胱癌, 胆道癌, <u>尿路上皮癌</u></p>
<p>クロルフェニラミンマレイン酸塩 臨床情報欄(小児) (1049頁)</p>	<p>[d]2～5歳：1mg, 4～6時間毎, 6～11歳：2mg, 4～6時間毎, ≥12歳：4mg, 4～6時間毎</p>	<p>[d]2～5歳：<u>1回0.5mg, 4～6時間毎, 3mg/日まで, 6～11歳：1回1mg, 4～6時間毎, 6mg/日まで, ≥12歳：1回2mg, 4～6時間毎, 12mg/日まで</u></p>

<p>メトトレキサート 適応, 用法・用量欄 (1071頁)</p>	<p>慢性関節リウマチ(NSAIDs 及び他の抗リウマチ剤で十 分な効果の得られない場合 のみ)</p>	<p>(適応の追加)関節症状を伴 う若年性特発性関節炎 ➡<u>1週間単位投与量4～ 10mg/m², 1回又は2～3回 に分服. 分服時は初日から2 日目にかけて12時間間隔で 投与. 1回又は2回分服では 残りの6日間, 3回分服では 残りの5日間は休薬. これを 1週間毎に繰り返す</u></p>
<p>セフテラムピボキシ ル 適応, 用法・用量欄 (1112頁)</p>	<p>④レンサ球菌属, 肺炎球 菌, 大腸菌, クレブシエラ 属, プロテウス属, モルガ ネラ・モルガニー, プロビ デンシア属, インフルエン ザ菌, (錠のみ)淋菌, シト ロバクター属, エンテロバ クター属, セラチア属, ペ プトストレプトコッカス属 ④細[小児用]咽頭・喉頭 炎, 扁桃炎(扁桃周囲炎, 扁桃周囲膿瘍を含む), 急 性気管支炎, 肺炎, 膀胱 炎, 腎盂腎炎, 中耳炎, 副 鼻腔炎, 猩紅熱 ➡小児: 1日9～18mg/kgを 3回に分服</p>	<p>④レンサ球菌属, 肺炎球 菌, 大腸菌, クレブシエラ 属, プロテウス属, モルガ ネラ・モルガニー, プロビ デンシア属, インフルエン ザ菌, (細(成人のみ)錠)淋 菌, シトロバクター属, エ ンテロバクター属, セラチ ア属, ペプトストレプトコ ッカス属④細咽頭・喉頭 炎, 扁桃炎(扁桃周囲炎, 扁桃周囲膿瘍を含む), 急 性気管支炎, 肺炎, 膀胱 炎, 腎盂腎炎, 中耳炎, 副 鼻腔炎, (成人のみ)慢性呼 吸器病変の二次感染, 尿道 炎, バルトリン腺炎, 子宮 内感染, 子宮付属器炎, 歯 周組織炎, 歯冠周囲炎, 顎 炎, (小児のみ)猩紅熱 ➡小児: 1日9～18mg/kgを 3回に分服 成人(嚥下困難等により錠剤 の使用が困難な場合): 錠 参照</p>

<p>クラリスロマイシン 適応, 用法・用量欄 (1149～1150頁)</p>	<p>①菌…②マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)…(略) ③症…②AIDSに伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症…</p>	<p>①菌…②マイコバクテリウム属…(略) ③症…②マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)症を含む非結核性抗酸菌症…</p>
<p>肺炎球菌ワクチン 臨床情報欄(調剤・薬学管理のPoint)(1257頁)</p>	<p>脾臓摘出を受けた者は保険適応外</p>	<p>保険適応は「2歳以上の脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発症予防」のみ</p>

2009.7.1 株式会社じほう