

50音順索引

(1: 第1類医薬品, 2: 指定第2類医薬品, 2: 第2類医薬品, 3: 第3類医薬品を表します)

【あ】

アサダアメガードドロップMG (部外品) ……31
Asahi当帰芍薬散錠 2 ……28
アットノン 2 ……19
アネトンせき止めZ液 分包 2 ……4
アルガード鼻炎内服薬Z 2 ……11
アンメルツ ゴールドEX 2 ……14

【い】

イキピタンV3000 2 ……22
イチジク浣腸40 2 ……8
イノセアバランス 1 ……5

【う】

ヴァイクス メディケイテッド ドロップ GF (部外品) ……31
〔愛称〕 ヴァイクスメディケイテッドドロップ シュガーレス グレープフルーツ (部外品) ……31
ウナコーワジェル 2 ……15

【え】

エアースロンパスジェットα 3 ……14
液キャベコーワA (部外品) ……31
液キャベコーワV (部外品) ……31
エスタック漢方「葛根湯」エキス顆粒 2 ……24
エスタック漢方「響声破笛丸料」エキス顆粒 2 ……25
エスタック漢方「駆風解毒湯」エキス顆粒 2 ……26
エスタック漢方「小柴胡湯」エキス顆粒 2 ……26
エスタック漢方「小青竜湯」エキス顆粒 2 ……27
エピロンエー 2 ……13
延寿内服液 2 ……22

【お】

オキナゾールL100 1 ……19
オスバンラビングA 3 ……13

【か】

カコナル2 V顆粒 2 ……1
カタセマグ 2 ……24
加味逍遙散エキス錠N「コタロー」 2 ……25
かゆケア 2 ……15
かゆケアN 2 ……15
ガラクール 3 ……12
漢方せき止めトローチS「麦門冬湯」 2 ……29
漢方ニキビ薬N「コタロー」 2 ……27

【き】

キャベ2コーワドリンク (部外品) ……32
キュービーコーワアミノV (部外品) ……33
キュービーコーワヒーリング (部外品) ……33

【け】

ケラチナミンコーワWクリーム 3 ……18
ケラチナミンコーワW乳状液 3 ……18

【こ】

こども解熱鎮痛顆粒 [ムヒの] 2 ……1
コムレケア 2 ……26
コルゲンコーワ顆粒かぜ薬 2 ……29
コルゲンコーワ手とゆびの消毒ジェル (部外品) ……32
コルゲンコーワ鼻炎フィルム 2 ……11
コルゲンコーワフレッシュトローチ (部外品) ……31
コンタック600プラス小児用 2 ……11
コンタック葛根湯ドリンク 2 ……1
コンタック鼻炎スプレー<季節性アレルギー専用> 1 ……11
コンドロハイ900ゼリー 3 ……20

【し】

シオノギPVクリーム 2 ……15
シオノギPV軟膏 2 ……16
ジキニン顆粒IP 2 ……2
ジキニン総合感冒薬 2 ……2
新ゼリアスV10 2 ……22
新ピオミットS 2 ……8
新ミヤリサンアイジ整腸薬 3 ……7

【す】

スカイナーAL錠 2 ……9
ストナプラスジェル2 2 ……2
ストナメルティ小児用 2 ……2
ストナリニフィルム 2 ……11
す・びん凍内服錠 3 ……24
スマイル40EXゴールド 2 ……9
スルーラックデトファイバーM 2 ……8

【せ】

セデスVFR 2 ……13
セデス・ファースト 2 ……1
ゼナF0-I α (部外品) ……33
ゼリアスV10 [新] 2 ……22

【た】

第一三共胃腸薬グリーン錠 2 ……5
第一三共胃腸薬グリーン微粒 2 ……5
第一三共胃腸薬 [細粒] 2 ……5
第一三共胃腸薬 [錠剤] 2 ……5

第一三共胃腸薬プラス細粒 2 ……6
第一三共胃腸薬プラス錠剤 2 ……6
ダマリングランデパウダースプレー 2 ……17

【ち】

チオビタドリンクアイビタス 3 ……22
チクナイン錠 2 ……27
チョコラBBピュア 3 ……20

【て】

DS滋養内服液X1 (部外品) ……33
デリトリーナ 2 ……17

【と】

トクホンダッシュエアロ 3 ……14
トクホンフェルビナプラスター 2 ……13
トクホンフェルビナローション 2 ……14
トメダインコーワ錠 2 ……7
トメダインコーワフィルム 2 ……7
トラフルクイックショット 3 ……12
トラベルミン1 2 ……12
トレンタムクリーム 2 ……16

【な】

ナザールAR<季節性アレルギー専用> 1 ……11
ナチュラルトコーワ 3 ……8

【は】

ハイアミノ 3 ……22
ハイカゼα錠 2 ……2
ハイカゼEV錠 2 ……3
ハイカゼカプセルα 2 ……3
ハイチオールCプラス 3 ……23
バイロンMX 2 ……3
バイロン溶かしてのむかぜ薬 2 ……3
バスタイムFX7 2 ……14
バファリンかぜEX細粒 2 ……3
バファリンかぜEX錠 2 ……3
パンシロン01プラス 2 ……6
パンテリンコーワ液W 2 ……15
ハンドジェル K (部外品) ……32

【ひ】

ピオミットS [新] 2 ……8
ピシヤット 2 ……7
ヒストミンプラス液S 3 ……23
ヒフルEX液 2 ……17
ビーマ胃腸内服液 2 ……4
ビュークリアビタコンタクト 3 ……9

【ふ】

ファーストマイティアCL-B 3 ……10
フェミニーナ腔カンジダ錠 1 ……19

2 フチウ

ブチウナコーワα②	16
ブテナロックVエアース爽快パウダー②	17
ブレコール持続性鼻炎カプセルLX②	12
プロビキユーレAC錠③	20
プロビキユーレSP錠③	21

【へ】

ペロット下痢止め②	7
-----------	---

【ほ】

ポポンビュメリ錠VA②	19
ポポンビュメリ錠VB③	20
ポポンビュメリ目薬M③	9
ポポンビュメリ目薬R③	9

【ま】

麻黄湯エキス顆粒KM(分包)②	29
〔変称〕 ママはぐうがい薬p<スイートフルーツ味>〔部外品〕	30
〔変称〕 ママはぐうがい薬p<フルーツ味>〔部外品〕	30

【み】

水ではじめるバルサンCPM②	29
ミヤリサンアイジ整腸薬〔新〕③	7
〔変称〕 ミューズ消毒ハンドジェル〔部外品〕	32

【む】

ムヒのこども解熱鎮痛顆粒②	1
ムヒホワイトィ②	17

【め】

メグリナ②	25
メンソレータムADこどもソフト③	16
メンソレータムエクシブクリームe②	18
メンソレータムエクシブスプレーe②	18
メンソレータムメディクイッククリー ムR②	16
メンソレータムメディクイック軟膏R ②	16
メンソレータムレチノエース③	18

【も】

モアストレッチ錠③	20
-----------	----

【ら】

ラクーニSK錠②	28
----------	----

【り】

リバンウェットバン〔部外品〕	32
リポビタンFB〔部外品〕	34
リポビタンゴールドエース②	23
リラッセ③	21

【る】

〔変称〕 ルル滋養内服液ローヤル〔部外品〕	33
ルルのど飴DXG〔部外品〕	30
〔変称〕 ルルのど飴DXグレープ〔部外品〕	30
ルルのど飴HL〔部外品〕	30
〔変称〕 ルルのど飴はちみつレモン〔部外品〕	30

【れ】

レスタミンコーワパウダークリーム③	16
-------------------	----

【ろ】

ロキソニンS①	1
ロートCキューブクリアフラッシュAL ③	10
ロートうがい薬F〔部外品〕	30
ロートうがい薬S〔部外品〕	30
ロートジーb②	10
ロートジープロb②	10
ロート小青竜湯錠II②	27
ロート独活葛根湯錠②	28

会社名別索引

(1)：第1類医薬品, (2)：指定第2類医薬品, (2)：第2類医薬品, (3)：第3類医薬品を表します)

浅田館

- アサダアメガードドロップMG(口腔咽喉薬) (部外品) 31
- ルルのど飴DXG(のど清涼剤) (部外品) 30
- (薬務) ルルのど飴DXグレープ(のど清涼剤) (部外品) 30
- ルルのど飴HL(のど清涼剤) (部外品) 30
- (薬務) ルルのど飴はちみつレモン(のど清涼剤) (部外品) 30

アサヒフードアンドヘルスケア

- Asahi当帰芍薬散錠(当帰芍薬散) (2) 28
- ラクーニSK錠(疎経活血湯) (2) 28

池田模範堂

- ムヒのこども解熱鎮痛顆粒(解熱鎮痛薬) (2) 1
- ムヒホワイトィ(かゆみ・虫さされ用薬) (2) 17

イチジク製薬

- イチジク浣腸40(浣腸薬) (2) 8

エーザイ

- スカイナナーAL錠(内服アレルギー用薬) (2) 9
- チョコラBBビューア(ビタミンB₂主薬製剤) (3) 20
- トラベルミン1(乗物酔い薬) (2) 12

エスエス製薬

- エスタック漢方「葛根湯」エキス顆粒(葛根湯) (2) 24
- エスタック漢方「響声破笛丸」エキス顆粒(響声破笛丸) (2) 25
- エスタック漢方「駆風解毒湯」エキス顆粒(駆風解毒散(湯)) (2) 26
- エスタック漢方「小柴胡湯」エキス顆粒(小柴胡湯) (2) 26
- エスタック漢方「小青竜湯」エキス顆粒(小青竜湯) (2) 27
- ガラクール(口腔内殺菌消毒薬) (3) 12
- スルーラックデトファイバーM(便秘薬) (2) 8
- ハイチオールCプラス(ビタミン含有保健薬(固形剤)) (3) 23
- 麻黄湯エキス顆粒KM(分包)(麻黄湯) (2) 29
- リラッセ(ビタミンB₁₂主薬製剤) (3) 21

グラクソ・スミスクライン

- コンタック600プラス小児用(鼻炎用内服薬) (2) 11
- コンタック葛根湯ドリンク(かぜ薬) (2) 1

- コンタック鼻炎スプレー<季節性アレルギー専用>(鼻炎用点鼻薬) (1) 11

廣貫堂

- イキビタンV3000(ビタミン含有保健薬(液剤)) (2) 22
- 延寿内服液(ビタミン含有保健薬(液剤)) (2) 22
- コンタック葛根湯ドリンク(かぜ薬) (2) 1
- ハイカゼα錠(かぜ薬) (2) 2
- ハイカゼEV錠(かぜ薬) (2) 3
- ハイカゼカプセルα(かぜ薬) (2) 3

興和

- ウナコワジェル(外用湿疹・皮膚炎用薬) (2) 15
- 液キャベコーワA(健胃清涼剤) (部外品) 31
- 液キャベコーワV(健胃清涼剤) (部外品) 31
- キャベ2コーワドリンク(健胃清涼剤) (部外品) 32
- キューピーコーワアミノV(ビタミン含有保健薬) (部外品) 33
- キューピーコーワヒーリング(ビタミン含有保健薬) (部外品) 33
- ケラチナミンコーワWクリーム(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) (3) 18
- ケラチナミンコーワW乳状液(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) (3) 18
- コルゲンコーワ顆粒かぜ薬(麻黄湯) (2) 29
- コルゲンコーワ手とゆびの消毒ジェル(外皮消毒剤) (部外品) 32
- コルゲンコーワ鼻炎フィルム(鼻炎用内服薬) (2) 11
- コルゲンコーワフレッシュトローチ(口腔咽喉薬) (部外品) 31
- トメダインコーワ錠(止しゃ薬(下痢止め)) (2) 7
- トメダインコーワフィルム(止しゃ薬(下痢止め)) (2) 7
- ナチュラルトコーワ(便秘薬) (3) 8
- バンテリンコーワ液W(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) (2) 15
- ブチウナコーワα(外用湿疹・皮膚炎用薬) (2) 16
- レスタミンコーワパウダークリーム(外用湿疹・皮膚炎用薬) (3) 16

小太郎漢方製薬

- 加味逍遙散エキス錠N「コタロー」(加味逍遙散) (2) 25
- 漢方せき止めトローチS「麦門冬湯」(麦門冬湯) (2) 29
- 漢方ニキビ薬N「コタロー」(清上防風湯) (2) 27

小林製薬

- アットノン(その他の外皮用薬) (2) 19
- アンメルツ ゴールドEX(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) (2) 14
- コムレケア(芍薬甘草湯) (2) 26
- チクナイン錠(辛夷清肺湯) (2) 27
- フェミニーナ腔カンジダ錠(腔カンジダ用薬) (1) 19
- メグリナ(加味逍遙散合四物湯) (2) 25

小林薬品工業

- ヒストミンプラス液S(ビタミン含有保健薬(液剤)) (3) 23
- ヒフルEX液(かゆみ・虫さされ用薬) (2) 17

佐藤製薬

- イノセアバランス(複合胃腸薬) (1) 5
- コンタック鼻炎スプレー<季節性アレルギー専用>(鼻炎用点鼻薬) (1) 11
- ストナプラスジェル2(かぜ薬) (2) 2
- ストナメルティ小児用(かぜ薬) (2) 2
- ストナリニフィルム(鼻炎用内服薬) (2) 11
- トレントムクリーム(外用湿疹・皮膚炎用薬) (2) 16
- ナザールAR<季節性アレルギー専用>(鼻炎用点鼻薬) (1) 11

三宝製薬

- 新バイオミットS(便秘薬) (2) 8
- ビーマ胃腸内服液(健胃薬) (2) 4

塩野義製薬

- シオノギPVクリーム(外用湿疹・皮膚炎用薬) (2) 15
- シオノギPV軟膏(外用湿疹・皮膚炎用薬) (2) 16
- セデスVFR(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) (2) 13
- セデス・ファースト(解熱鎮痛薬) (2) 1
- パイロンMX(かぜ薬) (2) 3
- パイロン溶かしてのむかぜ薬(かぜ薬) (2) 3
- プロビキューレAC錠(ビタミンB₂主薬製剤) (3) 20
- プロビキューレSP錠(ビタミンC主薬製剤) (3) 21
- ポボンビュメリ錠VA(ビタミンA主薬製剤) (2) 19
- ポボンビュメリ錠VB(ビタミンB₁主薬製剤) (3) 20
- ポボンビュメリ目薬M(一般点眼薬) (3) 9
- ポボンビュメリ目薬R(一般点眼薬) (3) 9

ジョンソン・エンド・ジョンソン
 アネトンせき止めZ液 分包(鎮咳去たん薬) ②……………4

ゼリア新薬工業
 コンドロハイ900ゼリー(ビタミンB₁主薬製剤) ③……………20
 新ゼリアスV10(ビタミン含有保健薬(液剤)) ②……………22
 ビュークリアビタコンタクト(一般点眼薬) ③……………9
 ペロット下痢止め(止しゃ薬(下痢止め)) ②……………7

全薬工業
 カタセマグ(カルシウム主薬製剤) ②……………24
 ジキニン顆粒IP(かぜ薬) ②……………2
 ジキニン総合感冒薬(かぜ薬) ②……………2

第一三共ヘルスケア
 カコナル2 V顆粒(かぜ薬) ②……………1
 第一三共胃腸薬グリーン錠(複合胃腸薬) ②……………5
 第一三共胃腸薬グリーン微粒(複合胃腸薬) ②……………5
 第一三共胃腸薬〔細粒〕(複合胃腸薬) ②……………5
 第一三共胃腸薬〔錠剤〕(複合胃腸薬) ②……………5
 第一三共胃腸薬プラス細粒(複合胃腸薬) ②……………6
 第一三共胃腸薬プラス錠剤(複合胃腸薬) ②……………6
 DS滋養内服液X1(ビタミン含有保健薬)(**部外品**)……………33
 トラフルクイックショット(口腔内殺菌消毒薬) ③……………12
 プレコール持続性鼻炎カプセルLX(鼻炎内服薬) ②……………12
 (薬類) ルル滋養内服液ロイヤル(ビタミン含有保健薬)(**部外品**)……………33
 ルルのど飴DXG(のど清涼剤)(**部外品**)……………30
 (薬類) ルルのど飴DXグレープ(のど清涼剤)(**部外品**)……………30
 ルルのど飴HL(のど清涼剤)(**部外品**)……………30
 (薬類) ルルのど飴はちみつレモン(のど清涼剤)(**部外品**)……………30
 ロキソニンS(解熱鎮痛薬) ①……………1

大幸薬品
 ビシヤット(止しゃ薬(下痢止め)) ②……………7

大正製薬
 ヴィックス メディケイテッド ドロップ GF(口腔咽喉薬)(**部外品**)……………31
 (薬類) ヴィックスメディケイテッド ドロップ シュガーレス グレープフルーツ(口腔咽喉薬)(**部外品**)……………31
 ゼナF0-I α(ビタミン含有保健薬)(**部外品**)……………33
 ダマリングランデパウダースプレー

(水虫・たむし用薬) ②……………17
 デリトリナーナ(かゆみ・虫さされ用薬) ②……………17
 リポビタンFB(ビタミンを含有する保健薬)(**部外品**)……………34
 リポビタンゴールドエース(ビタミン含有保健薬(液剤)) ②……………23

大鵬薬品工業
 チオビタドリンクアイピタス(ビタミン含有保健薬(液剤)) ③……………22

武田薬品工業
 オスバンラビングA(外用殺菌消毒薬) ③……………13
 ファーストマイティアCL-B(人工涙液) ③……………10

田辺三菱製薬
 オキナゾールL100(腔カンジダ用薬) ①……………19
 フェミニーナ腔カンジダ錠(腔カンジダ用薬) ①……………19

玉川衛材
 ガラクール(口腔内殺菌消毒薬) ③……………12
 リバンウェットバン(きず消毒保護剤)(**部外品**)……………32

テイカ製薬
 ポボンビュメリ目薬M(一般点眼薬) ③……………9
 ポボンビュメリ目薬R(一般点眼薬) ③……………9

東亜薬品
 第一三共胃腸薬グリーン錠(複合胃腸薬) ②……………5
 第一三共胃腸薬グリーン微粒(複合胃腸薬) ②……………5

トクホン
 トクホンダッシュエアロ(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ③……………14
 トクホンフェルビナプラスター(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ②……………13
 トクホンフェルビナローション(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ②……………14

日水製薬
 ハイアミノ(ビタミン含有保健薬(液剤)) ③……………22

日東薬品工業
 バイロン溶かしてのむかぜ薬(かぜ薬) ②……………3

久光製薬
 エアーサロンパスジェット α(外用鎮痛・消炎薬(塗布薬)) ③……………14
 ブテナロックVエアース爽快パウダー(水虫・たむし用薬) ②……………17

ミヤリサン製薬
 新ミヤリサンアイジ整腸薬(整腸薬) ③……………7

明治製菓
 かゆけア(外用湿疹・皮膚炎用薬) ②……………15
 かゆけアN(外用湿疹・皮膚炎用薬) ②……………15

祐徳薬品工業
 バスタイムFX7(外用鎮痛・消炎薬(貼付薬)) ②……………14

ライオン
 スマイル40EXゴールド(一般点眼薬) ②……………9
 バファリンかぜEX細粒(かぜ薬) ②……………3
 バファリンかぜEX錠(かぜ薬) ②……………3
 水ではじめるバルサンCPM(殺虫薬) ②……………29

レキットベンキーザー・ジャパン
 ハンドジェル K(外皮消毒剤)(**部外品**)……………32
 (薬類) ミューズ消毒ハンドジェル(外皮消毒剤)(**部外品**)……………32

ロート製薬
 アルガード鼻炎内服薬Z(鼻炎内服薬) ②……………11
 す・びん凜内服錠(生薬主薬保健薬) ③……………24
 パンシロン01プラス(複合胃腸薬) ②……………6
 (薬類) ママはぐうがい薬p<スイートフルーツ味>(含嗽薬)(**部外品**)……………30
 (薬類) ママはぐうがい薬p<フルーツ味>(含嗽薬)(**部外品**)……………30
 メンソレータムADこどもソフト(外用湿疹・皮膚炎用薬) ③……………16
 メンソレータムエクシブクリームe(水虫・たむし用薬) ②……………18
 メンソレータムエクシブプレーe(水虫・たむし用薬) ②……………18
 メンソレータムメディクイッククリームR(外用湿疹・皮膚炎用薬) ②……………16
 メンソレータムメディクイック軟膏R(外用湿疹・皮膚炎用薬) ②……………16
 メンソレータムレチノエース(皮膚軟化薬(乾燥性皮膚用薬)) ③……………18
 モアストレッチ錠(ビタミンB₁主薬製剤) ③……………20
 ロートCキューブクリアフラッシュAL(一般点眼薬) ③……………10
 ロートうがい薬F(含嗽薬)(**部外品**)……………30
 ロートうがい薬S(含嗽薬)(**部外品**)……………30
 ロートジーb(一般点眼薬) ②……………10
 ロートジープロb(一般点眼薬) ②……………10
 ロート小青竜湯錠II(小青竜湯) ②……………27
 ロート独活葛根湯錠(独活葛根湯) ②……………28

湧永製薬
 エピロンエー(外用化膿性疾患用薬) ②……………13

解熱鎮痛薬

セデス・ファースト
(塩野義製薬)

胃にやさしくて速く効く。眠くなる成分無配合

区分 指定第2類医薬品

成分 錠1錠中：

エテンザミド……………200mg
アセトアミノフェン……………80mg
無水カフェイン……………40mg
酸化マグネシウム……………50mg
添加物 乳糖水和物、カルメロースカルシウム、ヒドロキシプロピルセルロース、酸化チタン、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウム、ヒプロメロース、クエン酸トリエチル

効能 頭痛・歯痛・月経痛(生理痛)・神経痛・腰痛・外傷痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛の鎮痛。悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、小児(7~14才)1回1錠。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 20錠 750円・40錠 1,300円

ムヒのこども解熱鎮痛顆粒
(池田模範堂)

急な発熱・痛みに

区分 第2類医薬品

成分 顆3包(3.6g)中：

アセトアミノフェン……………450mg
アスコルビン酸(ビタミンC)……………150mg
グリシン……………450mg

添加物 キシリトール、D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ポビドン、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステビア抽出精製物、軽質無水ケイ酸、三酸化鉄、香料

効能 悪寒・発熱時の解熱。頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛

用法・用量 7~10才1回1包、3~6才1回1/2包、1~2才1/4包。1日3回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用。服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 明るい淡紅色~淡紅色の顆粒

包装・価格 8包 1,000円

その他 製造販売 ダイト

ロキソニンS

(第一三共ヘルスケア)

痛みに速く効く

区分 第1類医薬品

成分 錠1錠中：

ロキソプロフェンナトリウム水和物・68.1mg(無水物として60mg)

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、乳糖水和物、三酸化鉄

効能 頭痛・月経痛(生理痛)・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠、1日服用回数2回まで。ただし、再度症状があらわれた場合には3回目を服用(服用間隔は4時間以上おく)

製品特有の注意 錠剤により添加物による赤い斑点がみられることがある

製剤 ごくうすい紅色の素錠

包装・価格 12錠 680円☆

かぜ薬

カコナール2 V顆粒
(第一三共ヘルスケア)

1日2回服用、葛根湯とビタミン(C・B₁・B₂)を同時配合

区分 第2類医薬品

成分 顆2包中：

葛根湯エキス(乾燥)……………4.4g
下記の生薬の水製抽出エキス
(カクコン8g・マオウ4g・タイソウ4g・ケイヒ3g・シャクヤク3g・カンゾウ2g・ショウキョウ1g)
ビスベンチアミン

(ビタミンB₁誘導体)……………25mg

リボフラビン酪酸エステル

(ビタミンB₂酪酸エステル)……………12mg

L-アスコルビン酸ナトリウム

(ビタミンCナトリウム)……………500mg

添加物 アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、D-マンニトール

効能 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量 成人(15才以上)1回1包1日2回朝夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用、またはお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服

製品特有の注意 (1)服用により、尿が黄色くなることもある (2)服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがある。医師の検査を受ける場合、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを知らせること

製剤 淡褐色~褐色の顆粒

包装・価格 6包 1,103円☆・10包 1,575円☆

その他 製造販売 新生薬品工業

コンタック葛根湯ドリンク
(グラクソ・スミスクライン)

かぜのひき始めに、飲みやすい1日2回の漢方かぜ内服液

区分 第2類医薬品

成分 内液 90mL(45mL×2本)中：

葛根湯エキス……………8,300mg
(カクコン8g・マオウ4g・タイソウ4g・ケイヒ3g・シャクヤク3g・カンゾウ2g・ショウキョウ1gより製したエキス)

添加物 白糖、D-ソルビトール、果糖ブドウ糖液糖、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、エタノール、グリセリン、L-メントール、プロピレングリコール、バニリン、ベンジルアルコール、香料

【効能】 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

【用法・用量】 成人(15才以上)1回1本、1日2回朝夕、食前又は食間に服用

【製品特有の注意】 微量の沈殿が生じる場合があるので、よく振ってから服用

【製剤】 茶褐色の澄明な液体

【包装・価格】 45mL×2本 980円

【その他】 製造販売 廣貴堂

ジキニン顆粒IP

(全薬工業)

イブプロフェンや3種の生薬を配合したかぜ薬

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 顆 1包1.5g中：

- イブプロフェン……………150mg
- ジヒドロコデインリン酸塩……………8mg
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20mg
- d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……………1.17mg
- 無水カフェイン……………25mg
- グアヤコールスルホン酸カリウム……………83.3mg
- カンゾウ(甘草)エキス……………150mg(原生薬換算量：750mg)
- カミツレエキス……………111.1mg(原生薬換算量：333mg)
- ニンジンエキス……………14.3mg(原生薬換算量：200mg)

【添加物】 タルク、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg

【効能】 かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】 成人(15才以上)1回1包。1日3回。食後なるべく30分以内に服用

【製剤】 淡褐色の顆粒剤

【包装・価格】 6包 980円・12包 1,800円

ジキニン総合感冒薬

(全薬工業)

ビタミンB₁、カンゾウ(甘草)エキス配合かぜ薬

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 顆 1包1.5g中：

- アセトアミノフェン……………300mg
- ジヒドロコデインリン酸塩……………8mg
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………20mg
- クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.5mg
- 無水カフェイン……………25mg

カンゾウ(甘草)エキス……………150mg(原生薬換算量：750mg)

ビスベンチアミン(ビタミンB₁誘導体)……………8mg

【添加物】 タルク、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖

【効能】 かぜの諸症状(発熱、せき、頭痛、のどの痛み、たん、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、悪寒、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】 成人(15才以上)1回1包、11～14才1回 $\frac{1}{2}$ 包、7～10才1回 $\frac{1}{4}$ 包、3～6才1回 $\frac{1}{8}$ 包、1～2才1回 $\frac{1}{16}$ 包。1日3回。食後なるべく30分以内に服用

【製剤】 淡褐色の顆粒剤

【包装・価格】 9包 950円・16包 1,480円

ストナプラスジェル2

(佐藤製薬)

L-カルボシステイン配合 つかいせき・たんからくるカゼに

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 力 6カプセル中：

- L-カルボシステイン……………750mg
 - ブロムヘキシリン塩酸塩……………12mg
 - アセトアミノフェン……………900mg
 - ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
 - dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
 - ジフェニルピラリン塩酸塩……………4mg
 - 無水カフェイン……………75mg
- 【添加物】** グリセリン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ポリソルベート80、ゼラチン、グリセリン、パラベン、酸化チタン、黄色5号

【効能】 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】 成人(15才以上)1回2カプセル、8～14才1回1カプセルを、1日3回食後なるべく30分以内に服用

【製剤】 肌色のカプセル

【包装・価格】 12カプセル 1,219円・24カプセル 2,000円

ストナメルティ小児用

(佐藤製薬)

水なしで服用できるこども用 総合かぜ薬

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 錠 12錠中：

- アセトアミノフェン……………600mg
- d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……………2.3mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………40mg

ノスカピン……………32mg

【添加物】 アセスルファミンK、タルク、エリスリトール、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、三酸化鉄、香料(デンプン部分加水分解物、プロピレングリコール、グリセリン、エタノール、バニリン、エチルバニリン、l-メントールを含む)、その他2成分

【効能】 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】 11～14才1回4錠、7～10才1回3錠、5～6才1回2錠を1日3回食後なるべく30分以内に含むか口中で溶かして服用

【包装・価格】 12錠 700円・24錠 1,286円

ハイカゼα錠

(廣貴堂)

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 錠 9錠中：

- 〔芯錠〕
- ヘスベリジン……………60mg
- チアミン硝化物……………24mg
- リボフラビン……………4.8mg
- ゴオウ……………3mg
- アスコルビン酸カルシウム……………200mg

〔外層〕

- グアヤコールスルホン酸カリウム……………240mg
- リボフラビン……………7.2mg
- マレイン酸カルビノキサミン……………7.5mg
- ジヒドロコデインリン酸塩……………24mg
- 無水カフェイン……………75mg
- dl-メチルエフェドリン塩酸塩……………60mg
- アセトアミノフェン……………900mg
- ノスカピン……………48mg
- リゾチーム塩酸塩……………60mg(力価)

【添加物】 乳糖水和物、部分アルファ-化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、CMC、タルク、ステアリン酸Mg、マクロゴール、ヒプロメロース、酸化チタン

【効能】 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【用法・用量】 成人(15才以上)1回3錠、11～14才1回2錠、5～10才1回1錠。1日3回、食後なるべく30分以内に服用

【製剤】 淡黄色のコーティングを施した有核錠剤

【包装・価格】 9錠 500円

ハイカゼEV錠 (廣貴堂)

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠中：

〔芯錠〕

アスコルビン酸……………300mg
チアミン硝酸物……………24mg

〔外層〕

イブプロフェン……………450mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg
ジヒドロコデインリン酸塩…………24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………60mg
無水カフェイン……………75mg

添加物 乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、カルメロースCa、タルク、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン

効能 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠。1日3回、食後なるべく30分以内に服用

製剤 白色の錠剤

包装・価格 9錠 500円・18錠 900円

ハイカゼカプセルα (廣貴堂)

区分 指定第2類医薬品

成分 包 6カプセル中：

アセトアミノフェン……………900mg
マレイン酸カルビノキサミン…………7.5mg
ジヒドロコデインリン酸塩…………18mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム…240mg
無水カフェイン……………75mg
チアミン硝酸物(ビタミンB₁)…………24mg
リポフラビン(ビタミンB₂)…………12mg
アスコルビン酸カルシウム
(ビタミンC)……………200mg
ヘスペリジン……………60mg
ゴオウ末……………3mg
リゾチーム塩酸塩……………60mg(力価)

添加物 部分アルファー化デンプン、乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

効能 かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル、7～14才1回1カプセル。1日3回、食後なるべく30分以内に服用

製剤 微黄白色の硬カプセル

包装・価格 12錠 1,200円

パイロンMX (塩野義製薬)

発熱、悪寒、ふしぶしの痛みなどに。麻黄湯エキス配合

区分 指定第2類医薬品

成分 包 6カプセル中：

アセトアミノフェン……………650mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg
ジヒドロコデインリン酸塩…………18mg
グアヤコールスルホン酸カリウム…250mg
無水カフェイン……………150mg
麻黄湯エキス……………360mg
(原生薬換算量：3,600mg)

(マオウ1,107.7mg・キョウニン1,107.7mg・ケイヒ830.8mg・カンゾウ553.8mg)

添加物 D-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、ラウリル硫酸ナトリウム

効能 かぜの諸症状(発熱、悪寒、関節の痛み、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、頭痛、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル、小児(7～14才)1回1カプセル。1日3回。食後なるべく30分以内に服用

製剤 白色のカプセル剤

包装・価格 24カプセル 1,696円

その他 製造販売 ダイト

パイロン 溶かしてのむかぜ薬 (塩野義製薬)

ビタミンC配合総合かぜ薬。
のみやすいレモン味

区分 指定第2類医薬品

成分 包 3包(12g)中：

アセトアミノフェン……………900mg
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩…3.5mg
ジヒドロコデインリン酸塩…………24mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………60mg
無水カフェイン……………75mg
アスコルビン酸(ビタミンC)…………500mg
ガンゾウ乾燥エキス……………70mg
(原生薬換算量：500mg)

添加物 アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、ポビドン、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、香料

効能 かぜの諸症状(悪寒、発熱、のどの痛み、せき、たん、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回1包。1日3回。約100mLのお湯又は水にとかして、食後なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 お湯を加えて服用する場合は、やけどをしないように注意する。冷水の場合は溶けにくいので、よくかきまぜ分散させて、すぐのむ

製剤 褐色の散剤

包装・価格 6包 1,219円・12包 2,076円

その他 製造販売 日東薬品工業

バファリンかぜEX細粒 (ライオン)

つらい熱・のどの痛みをととも
なうかぜによく効く

区分 指定第2類医薬品

成分 細 3包中：

イブプロフェン……………450mg
クレマスチンフマル酸塩……………1.34mg
ブロムヘキシリン塩酸塩……………12mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………60mg
ジヒドロコデインリン酸塩…………24mg
無水カフェイン……………75mg
アスコルビン酸カルシウム
(ビタミンC)……………500mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、乳糖、二酸化ケイ素、ヒプロメロース、D-マンニトール、スクラロース、酒石酸、香料、アラビアゴム

効能 かぜの諸症状(発熱、悪寒、のどの痛み、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回1包を1日3回、食後なるべく30分以内に服用

製剤 白色～微黄白色の顆粒剤

包装・価格 10包 1,680円・20包 2,480円

バファリンかぜEX錠 (ライオン)

つらい熱・のどの痛みをととも
なうかぜによく効く

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 9錠中：

イブプロフェン……………450mg
クレマスチンフマル酸塩……………1.34mg
ブロムヘキシリン塩酸塩……………12mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………60mg
ジヒドロコデインリン酸塩…………24mg
無水カフェイン……………75mg
アスコルビン酸カルシウム
(ビタミンC)……………500mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、乳糖、二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、ヒプロメロース、ステアリン酸Mg、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、マクロゴール、酸化チタン、タルク、酒石酸、黄色三酸化鉄

効能 かぜの諸症状(発熱、悪寒、のど

4 かぜ薬／鎮咳去たん薬／健胃薬

の痛み、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠を1日3回、食後なるべく30分以内に服用

製剤 黄色～黄褐色のコート錠

包装・価格 18錠 1,280円・30錠 1,680円・45錠 1,980円

鎮咳去たん薬

アネトンせき止めZ液 分包装

(ジョンソン・エンド・ジョンソン)

リン酸コデインを配合したレモンティー風味のせき止め薬

区分 指定第2類医薬品

成分 内液 1日量(6包)中：

コデインリン酸塩水和物…………… 50mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩…………… 75mg

リゾチーム塩酸塩…………… 60mg(力価)

クロロフェニラミンマレイン酸塩…………… 12mg

無水カフェイン…………… 60mg

セネガ流エキス…………… 1,500mg

添加物 クエン酸Na, クエン酸, 安息香酸Na, メチルパラベン, プロピレングリコール, グリセリン, D-ソルビトール, カラメル, 香料, エタノール, pH調整剤

効能 せき, たん

用法・用量 成人(15才以上)1回1包(10mL), 1日3回。症状により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができる

製品特有の注意 糖尿病の検査値に影響を及ぼす場合がある

製剤 淡褐色の液剤(レモンティー風味)

包装・価格 3包 500円

その他 製造販売 共栄製薬工業

健胃薬

ピーマ胃腸内服液

(三宝製薬)

ウコンなど8種類の生薬を配合したミント味の液状胃腸薬

区分 第2類医薬品

成分 内液 1瓶(30mL)中：

ウコン(鬱金)流エキス…………… 0.6mL

ソウジュツ(蒼朮)流エキス…………… 0.8mL

コウボク(厚朴)エキス…………… 100mg

チンピ(陳皮)エキス…………… 100mg

カンゾウ(甘草)エキス…………… 100mg

ショウキョウ(生姜)チンキ…………… 0.5mL

ニンジン(人参)エキス…………… 20mg

ケイヒ(桂皮)チンキ…………… 0.5mL

添加物 D-ソルビトール, 白糖, 安息香酸, アルコール, プロピレングリコール, 香料

効能 飲み過ぎ, 食べ過ぎ, はきけ(むかつき, 二日酔・悪酔のむかつき), 胸やけ, もたれ, 嘔吐, 胃部・腹部膨満感, 食欲不振, 消化不良, 胃弱, 胸つかえ

用法・用量 15才以上1回1瓶(30mL), 1日3回を限度とし, なるべく食前によく振ってから服用。服用間隔は4時間以上おく

製品特有の注意 生薬成分を含むため, まれに沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する

製剤 褐色の内服液

包装・価格 30mL×2瓶 800円

複合胃腸薬

イノセアバランス
(佐藤製薬)

トロキシビドを配合したスイ
ッチOTC医薬品

区分 第1類医薬品

成分 細 3包中:

トロキシビド……………300mg
アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物……………6mg
ロートエキス3倍散C……………90mg
炭酸水素ナトリウム……………960mg
ケイ酸マグネシウム……………720mg
沈降炭酸カルシウム……………684mg
[添加物] D-マンニトール、ヒドロキシプロピル
セルロース、トウモロコシデンプン、無水
ケイ酸、ウイキョウ末、ケイヒ油、ショウ
ジョ油、L-メントール、香料(トコフェロール
を含む)

[効能] 胃痛、胃部不快感、胃部膨満感、
胃もたれ、胃重、胸つかえ、胸やけ、
げっぷ、はきけ(胃のむかつき、二日
酔・悪酔のむかつき、嘔気)、嘔吐、
飲み過ぎ、胃酸過多

[用法・用量] 成人(15才以上)1回1包を1日3
回食前又は食間(空腹時)に服用

[製剤] 白色の細粒

[包装・価格] 12包 1,000円・24包 1,790円

第一三共胃腸薬グリーン錠
(第一三共ヘルスケア)

飲みすぎ・胃酸過多による荒
れた胃に効く

区分 第2類医薬品

成分 錠 9錠中:

メタケイ酸アルミン酸マグネシウム…360mg
合成ヒドロタルサイト……………480mg
炭酸水素ナトリウム……………480mg
ロートエキス3倍散……………90mg
ウイキョウ末……………30mg
ケイヒ末……………180mg
ショウジョ末……………30mg
ゲンチアナ末……………90mg
センブリ末……………5mg
ビオデアスターゼ2000……………60mg
リパーゼAP6……………60mg
銅クロロフィリンナトリウム……………48mg
カンゾウ末……………150mg

[添加物] バレイシヨデンプン、乳糖、CMC、ヒ
ドロキシプロピルセルロース、ステアリン
酸Mg

[効能] 飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつ
き、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむ
かつき、嘔気、悪心)、嘔吐。胃酸過

多、胃痛、胸やけ、胃重、胃部不快感、
げっぷ(おくび)。胸つかえ、もたれ
(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胃
部・腹部膨満感、胃弱。食べ過ぎ(過
食)、消化不良、消化促進、消化不良
による胃部・腹部膨満感

[用法・用量] 成人(15才以上)1回3錠、11~
14才1回2錠。1日3回食後に服用

[製品特有の注意] 透析療法を受けている人
は服用しない

[製剤] 濃緑色~帯黄緑色の素錠

[包装・価格] 50錠 924円☆・90錠 1,554円☆

[その他] 製造販売 東亜薬品

第一三共胃腸薬グリーン
微粒

(第一三共ヘルスケア)

飲みすぎ・胃酸過多による荒
れた胃に効く

区分 第2類医薬品

成分 散 3包中:

メタケイ酸アルミン酸
マグネシウム……………450mg
合成ヒドロタルサイト……………600mg
炭酸水素ナトリウム……………600mg
ロートエキス3倍散……………90mg
ウイキョウ末……………30mg
ケイヒ末……………180mg
ショウジョ末……………30mg
ゲンチアナ末……………90mg
センブリ末……………5mg
ビオデアスターゼ2000……………60mg
リパーゼAP6……………60mg
銅クロロフィリンナトリウム……………48mg
カンゾウ末……………150mg

[添加物] CMC、アラビアゴム、ヒドロキシプロ
ピルセルロース、バレイシヨデンプン、乳
糖、ステアリン酸ポリオキシド、L-メント
ール

[効能] 飲み過ぎ(過飲)、はきけ(むかつ
き、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむ
かつき、嘔気、悪心)、嘔吐。胃酸過
多、胃痛、胸やけ、胃重、胃部不快感、
げっぷ(おくび)。胸つかえ、もたれ
(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胃
部・腹部膨満感、胃弱。食べ過ぎ(過
食)、消化不良、消化促進、消化不良
による胃部・腹部膨満感

[用法・用量] 成人(15才以上)1回1包、11~
14才1回1/2包、8~10才1回1/2包、5~7
才1回1/2包。1日3回食後に服用

[製品特有の注意] 透析療法を受けている人
は服用しない

[製剤] 緑色・褐色散剤

[包装・価格] 10包 924円☆・20包 1,554円☆

[その他] 製造販売 東亜薬品

第一三共胃腸薬〔細粒〕
(第一三共ヘルスケア)

胃のもたれ・不快感にスーッ
ととけて効く

区分 第2類医薬品

成分 細 3包中:

タカジアスターゼN1……………150mg
リパーゼAP12……………60mg
有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)…45mg
アカメガシワエキス……………63mg
(アカメガシワとして504mg)
カンゾウ末……………150mg
ケイ酸アルミン酸
マグネシウム……………1,200mg
合成ヒドロタルサイト……………450mg
水酸化マグネシウム……………600mg
オウバク末……………105mg
ケイヒ末……………225mg
ウイキョウ末……………60mg
ショウジョ末……………30mg
ショウキョウ末……………75mg
L-メントール……………9mg
[添加物] セルロース、乳糖、ポリソルベート80、
ヒドロキシプロピルセルロース、サンショ
ウ

[効能] もたれ、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胸
つかえ、食欲不振。胸やけ、胃痛、胃
酸過多、胃重、胃部不快感、げっぷ。
消化不良、消化促進、胃弱、胃部・腹
部膨満感。はきけ(むかつき、二日
酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐。
整腸(便通を整える)、軟便、便秘

[用法・用量] 15才以上1回1包、11~14才1回
1/2包、8~10才1回1/2包、5~7才1回1/2
包、3~4才1回1/4包。1日3回食後に服
用

[製品特有の注意] 透析療法を受けている人
は服用しない

[製剤] 白色と淡褐色の混合顆粒

[包装・価格] 12包 735円☆・32包 1,523円
☆・56包 2,310円☆

第一三共胃腸薬〔錠剤〕
(第一三共ヘルスケア)

胃のもたれ・不快感にのんで
爽やか

区分 第2類医薬品

成分 錠 9錠中:

タカジアスターゼN1……………150mg
リパーゼAP12……………60mg
アカメガシワエキス……………63mg
(アカメガシワとして504mg)
カンゾウ末……………150mg
ケイ酸アルミン酸マグネシウム…720mg
合成ヒドロタルサイト……………300mg
水酸化マグネシウム……………600mg

6 複合胃腸薬

ロートエキス…………… 30mg
 オウバク末…………… 105mg
 ケイヒ末…………… 225mg
 ウイキョウ末…………… 60mg
 チョウジ末…………… 30mg
 ショウキョウ末…………… 75mg
 L-メントール…………… 9mg

添加物 サンショウ, パレイショデンブシ, CMC, ステアリン酸Mg

効能 もたれ, 食べ過ぎ, 飲み過ぎ, 胸つかえ, 食欲不振. 胸やけ, 胃痛, 胃酸過多, 胃重, 胃部不快感, げっぷ. 消化不良, 消化促進, 胃弱, 胃部・腹部膨満感. はきけ(むかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 悪心), 嘔吐

用法・用量 15才以上1回3錠, 11~14才1回2錠. 1日3回食後に服用

製品特有の注意 透析療法を受けている人は服用しない

製剤 白色と淡褐色の混合顆粒

包装・価格 50錠 735円☆・190錠 1,523円☆・310錠 2,310円☆

第一三共胃腸薬プラス細粒
 (第一三共ヘルスケア)

弱った胃に効き, 腸の状態を正常に近づける

区分 第2類医薬品

成分 細 3包中:

タカデアスターゼN1…………… 150mg
 リパーゼAP12…………… 60mg
 有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)… 60mg
 ケイ酸アルミン酸マグネシウム… 900mg
 合成ヒドロタルサイト…………… 600mg
 沈降炭酸カルシウム…………… 600mg
 オウバク末…………… 105mg
 ケイヒ末…………… 225mg
 ショウキョウ末…………… 75mg
 チョウジ末…………… 30mg
 ウイキョウ末…………… 60mg
 L-メントール…………… 9mg
 アルジオキサ…………… 60mg
 カンゾウ末…………… 150mg

添加物 セルロース, 乳糖, ポリソルベート80, ヒドロキシプロピルセルロース, サンショウ

効能 もたれ, 食べ過ぎ, 飲み過ぎ, 胸つかえ, 食欲不振. 胸やけ, 胃痛, 胃酸過多, 胃重, 胃部不快感, げっぷ. 消化不良, 消化促進, 胃弱, 胃部・腹部膨満感. はきけ(むかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 悪心), 嘔吐. 整腸(便通を整える), 軟便, 便秘

用法・用量 15才以上1回1包, 11~14才1回 $\frac{2}{3}$ 包, 8~10才1回 $\frac{1}{2}$ 包, 5~7才1回 $\frac{1}{4}$ 包, 3~4才1回 $\frac{1}{4}$ 包. 1日3回. 食後に服用

製品特有の注意 透析療法を受けている人は服用しない

製剤 白色~わずかに黄褐色を帯びた白色細粒・淡褐色~褐色細粒

包装・価格 12包 945円☆・30包 1,890円☆・52包 2,835円☆

第一三共胃腸薬プラス錠剤
 (第一三共ヘルスケア)

弱った胃に効き, 腸の状態を正常に近づける

区分 第2類医薬品

成分 錠 9錠中:

タカデアスターゼN1…………… 150mg
 リパーゼAP12…………… 60mg
 有胞子性乳酸菌(ラクボン原末)… 60mg
 ケイ酸アルミン酸マグネシウム… 735mg
 合成ヒドロタルサイト…………… 600mg
 沈降炭酸カルシウム…………… 420mg
 オウバク末…………… 105mg
 ケイヒ末…………… 225mg
 ショウキョウ末…………… 75mg
 チョウジ末…………… 30mg
 ウイキョウ末…………… 60mg
 L-メントール…………… 9mg
 アルジオキサ…………… 60mg
 カンゾウ末…………… 150mg

添加物 CMC, サンショウ, ステアリン酸Mg

効能 もたれ, 食べ過ぎ, 飲み過ぎ, 胸つかえ, 食欲不振. 胸やけ, 胃痛, 胃酸過多, 胃重, 胃部不快感, げっぷ. 消化不良, 消化促進, 胃弱, 胃部・腹部膨満感. はきけ(むかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 悪心), 嘔吐. 整腸(便通を整える), 軟便, 便秘

用法・用量 15才以上1回3錠, 11~14才1回2錠. 1日3回食後に服用

製品特有の注意 透析療法を受けている人は服用しない

製剤 淡灰褐色~淡褐色の素錠

包装・価格 50錠 945円☆・180錠 1,890円☆・300錠 2,835円☆

パンシロン01プラス
 (ロート製薬)

飲みすぎ・食べすぎ・胸やけに

区分 第2類医薬品

成分 散 3包(4.5g)中:

炭酸水素ナトリウム…………… 1,200mg
 炭酸マグネシウム…………… 690mg
 沈降炭酸カルシウム…………… 360mg
 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム… 240mg
 ケイヒ末…………… 435mg
 カンゾウ末…………… 225mg
 ニンジン末…………… 225mg
 L-グルタミン…………… 405mg

アルジオキサ…………… 150mg
 ビオチン…………… 90mg
 プロザイム6…………… 15mg
 リパーゼAP6…………… 60mg
 ロートエキス…………… 30mg

添加物 ポビドン, アルギン酸ナトリウム, L-メントール, ハッカ油, D-マンニトール, ヒドロキシプロピルセルロース

効能 飲みすぎ, はきけ(むかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 悪心), 嘔吐, 胃部不快感, 食べすぎ, 消化不良, 消化促進, 食欲不振(食欲減退), 胃弱, 胸やけ, 胃痛, 胃酸過多, げっぷ(おくび), 胃もたれ, 胃重, 胸つかえ, 胃部・腹部膨満感

用法・用量 成人(15才以上)1回1包, 11~14才1回 $\frac{2}{3}$ 包, 8~10才1回 $\frac{1}{2}$ 包, 5~7才1回 $\frac{1}{4}$ 包. 1日3回. 食後又は食間・就寝前に服用

製剤 褐色の散剤

包装・価格 14包 700円・28包 1,200円・48包 1,700円

整腸薬

新ミヤリサンアイジ整腸薬
(ミヤリサン製薬)

生後3カ月から成人まで服用可能な整腸薬

区分 第3類医薬品

成分 顆 5.4g中：

宮入菌末……………162mg
 リポフラビン……………7.2mg
 ピリドキシン塩酸塩……………28.8mg

添加物 パレイショデンプン、乳糖水和物、白糖、ラクチトール、クエン酸水和物

効能 整腸(便通を整える)、軟便、便秘、腹部膨満感

用法・用量 成人(15才以上)1回1.8g、8～14才1回1.5g、5～7才1回0.9g、1～4才1回0.6g、3カ月～1才未満1回0.3g。1日3回、食後に服用

製剤 黄色の顆粒

包装・価格 40g 1,449円☆・70g 2,079円☆

止しゃ薬(下痢止め)

トメダインコーワ錠
(興和)

ロベラミド塩酸塩配合下痢止め薬。腹痛を伴う下痢にも

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 6錠中：

ロベラミド塩酸塩……………1.0mg
 ベルベリン塩化物水和物……………80.0mg
 アクリノール水和物……………80.0mg
 シャクヤク末……………200.0mg
 ゲンノショウコ末……………300.0mg

添加物 乳糖、セルロース、クロスカルメロースNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ケイ酸Ca、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、トリアセチン、タルク、酸化チタン、黄色五号、カルナウバロウ

効能 下痢、食べ過ぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢、腹痛を伴う下痢、食あたり、水あたり、軟便

用法・用量 成人(15才以上)1回3錠、1日2回服用。ただし、下痢が止まれば服用しないこと。また、服用間隔は4時間以上おくこと

製剤 薄いだいたい色のフィルムコーティング錠

包装・価格 18錠 1,500円

その他 販売 興和新薬

トメダインコーワフィルム
(興和)

水なし服用可能、携帯に便利なフィルム状の下痢止め薬

区分 指定第2類医薬品

成分 フィルム 2枚中：

ロベラミド塩酸塩……………1.0mg

添加物 ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、還元麦芽糖水アメ、マクロゴール、酸化チタン、サッカリンNa、L-メントール、黄色五号、香料、エタノール

効能 食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢

用法・用量 成人(15才以上)1回1枚、1日2回、口中で溶かして服用。ただし、服用間隔は4時間以上おくこと。下痢が止まれば服用しないこと

製剤 淡黄赤色のフィルム剤

包装・価格 6枚 1,000円

その他 販売 興和新薬

ピシャット
(大幸薬品)

口の中でさっと溶け飲みやすい顆粒

区分 第2類医薬品

成分 顆 1日量(3包)中：

タンニン酸ベルベリン……………300mg
 ロートエキス散20%……………300mg
 (ロートエキスとして60mg)

添加物 乳糖水和物、トウモロコシデンプン、キシリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、タルク、エタノール、プロピレングリコール、グリセリン、香料

効能 腹痛を伴う下痢、下痢、消化不良による下痢、食あたり、水あたり、はき下し、くだり腹、軟便

用法・用量 15才以上1包、11～14才1回1/2包、8～10才1回1/2包、5～7才1回1/2包、3～4才1回1/4包服用。1日3回を限度として、服用間隔は4時間以上おくこと

製品特有の注意 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

製剤 黄褐色の顆粒

包装・価格 10包 1,050円☆

その他 製造販売 共栄製薬工業

ペロット下痢止め
(ゼリア新薬工業)

突然の下痢に。口の中で溶ける薄いフィルム剤

区分 指定第2類医薬品

成分 フィルム 2枚中：

ロベラミド塩酸塩……………1mg

添加物 ポビドン、グリセリン、水酸化Na、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、カルボキシビニルポリマー、塩化Ca、アセスルファムK、その他2成分

効能 食べすぎ・飲みすぎによる下痢、寝冷えによる下痢

用法・用量 成人(15才以上)1回1枚、1日2回。口中で溶かして服用。下痢が止まれば服用しない。服用間隔は4時間以上おく

製品特有の注意 口の中が乾いている状態のときなどは水又はお湯とともに服用

製剤 淡黄色のフィルム剤

包装・価格 4枚 780円☆

浣腸薬

イチジク浣腸40
(イチジク製薬)

イチジク型容器の40g。もつと効いて欲しい便秘に40g

- 区分** 第2類医薬品
- 成分** 外液 1個(40g)中：
グリセリン……………20.00g
- 添加物** ベンザルコニウム塩化物
- 効能** 便秘
- 用法・用量** 12才以上1回1個(40g)を直腸内に注入する。効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入する
- 製剤** 肌色のポリエチレン容器、液は無色澄明の浣腸剤
- 包装・価格** 2個 300円・10個 1,200円

便秘薬

新ビオミットS
(三宝製薬)

乳酸菌やビサコジルなど5種の有効成分を配合した便秘薬

- 区分** 指定第2類医薬品
- 成分** 錠 1錠中：
ビサコジル……………4mg
センノシド……………16mg
ジオクチルソジウム
スルホサクシネート……………20mg
有孢子性乳酸菌……………10mg
デヒドロコール酸……………50mg
- 添加物** 低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、タルク、酸化チタン、黄色5号、カルナウバロウ
- 効能** 便秘。便秘に伴う次の諸症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
- 用法・用量** 15才以上1回1～3錠、11～14才1回1～2錠、1日1回。就寝前又は空腹時に服用。ただし、初回は最小量を服用し、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量すること
- 製品特有の注意** 本品の服用により、尿が黄褐色又は赤褐色になることがあるが、これは主成分のセンノシドによるものである
- 製剤** 橙色のフィルムコート錠
- 包装・価格** 40錠 1,300円・80錠 2,200円

スルーラック
デトファイバーM
(エスエス製薬)

腸内に溜まった老廃物(滞留便)をスムーズに排出

- 区分** 指定第2類医薬品
- 成分** 顆 4包中：
プラントゴ・オバタ種皮末……………4,400mg
アロエエキス……………375mg
(アロエ750mgに相当)
センノサイドカルシウム……………40mg
(センノシドA・Bとして14.4mg)
ジュウヤク末……………500mg
- 添加物** 無水ケイ酸、D-ソルビトール、ヒドロキシプロピルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、アルコール、プロピレングリコール、クエン酸Na、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、カンゾウ、グリチルリチン酸2K、香料

- 効能** 便秘。便秘にともなう次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔
- 用法・用量** 成人(15才以上)1回1～2包。1日1～2回。なるべく空腹時に服用。服用間隔は4時間以上おくこと。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量または減量
- 製品特有の注意** 服用により尿が橙色又は赤色をおびることがある
- 製剤** 茶褐色の顆粒剤
- 包装・価格** 15包 1,365円☆
- その他** 製造販売 共栄製薬工業

ナチュラルトコワ
(興和)

便秘と、便秘による吹き出物・肌あれを改善する

- 区分** 第3類医薬品
- 成分** 錠 3錠中：
アロエエキス……………190mg
(アロエとして380mg)
酪酸菌末……………90mg
納豆菌末……………10mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B6)……………50mg
パントテン酸カルシウム……………30mg
- 添加物** 乳酸Ca、乳糖、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン、黄色五号、青色一号、カルナウバロウ、バレイシヨテンブ
- 効能** 便秘に伴う次の症状の緩和：吹出物、肌あれ、腹部膨満、腸内異常発酵、食欲不振、痔、頭重、のぼせ。便秘
- 用法・用量** 成人(15才以上)1回1～3錠、1日1回就寝前(又は空腹時)に服用。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量
- 製剤** 淡緑色のフィルムコート錠
- 包装・価格** 45錠 1,800円・90錠 3,200円
- その他** 販売 興和新薬

内服アレルギー用薬

スカイナーAL錠
(エーザイ)

花粉症などによる鼻づまり、
鼻みずの症状の出始めに

区分 第2類医薬品

成分 錠 4錠中：

アゼラスチン塩酸塩……………2mg

添加物 タルク、炭酸Ca、トウモロコシデンプン、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、カルナウバロウ、酸化チタン、三酸化鉄、ステアリン酸、ステアリン酸Mg、セラック、セルロース、二酸化ケイ素、白糖、プルラン、ポビドン、マクロゴール

効能 花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和：鼻づまり、鼻みず、くしゃみ。じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和：皮ふのはれ、かゆみ

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠。1日2回服用。朝食後及び就寝前に服用

製品特有の注意 鼻炎の症状に用いる場合は1週間、皮ふの症状に用いる場合は3日間服用しても症状の改善がみられない場合には服用を中止し、医師又は薬剤師に相談する

製剤 帯黄白色の糖衣錠

包装・価格 24錠 1,103円・48錠 2,048円

一般点眼薬

スマイル40EXゴールド[®]
(ライオン)

目を酷使用する人のつらい目の
疲れ・かすみに

区分 第2類医薬品

成分 外液 100mL中：

レチノールパルミチン酸エステル
(ビタミンA)……………33,000単位
酢酸d-α-トコフェロール
(天然型ビタミンE)……………0.05g

ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………0.03g

L-アスパラギン酸カリウム……………1.0g

タウリン……………0.1g

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.03g

塩酸テトラヒドロゾリン……………0.01g

ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.005g

添加物 ホウ酸、トロメタモール、エデト酸Na、BHT、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリソルベート80、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、d-ボルネオール、等張化剤、pH調整剤

効能 目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1日3～6回、1回1～3滴を点眼

製剤 無色透明の液体

包装・価格 13mL 900円

ビュークリア
ビタコンタクト
(ゼリア新薬工業)

コンタクトをつけたまま点眼
できる、疲れ目成分配合目薬

区分 第3類医薬品

成分 外液：

シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)……………0.02%

タウリン……………0.1%

コンドロイチン硫酸エステル

ナトリウム……………0.1%

添加物 塩化カリウム、塩化ナトリウム、ソルビン酸K、エデト酸Na、ヒアルロン酸Na、pH調節剤2成分

効能 目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1回1～2滴、1日3～6回点眼

製品特有の注意 カラーコンタクトレンズ
装着時は使用しない

製剤 赤色の澄明な液

包装・価格 10mL 780円☆

ポポンピュメリ目薬M
(塩野義製薬)

パソコン作業などで起きる目
のかわきに「さして、ケア」

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中：

塩化ナトリウム……………450mg

塩化カリウム……………160mg

塩化カルシウム水和物……………15mg

添加物 ホウ酸、クエン酸水和物、乾燥炭酸ナトリウム、ポビドン、ヒマシ油、ポリオキシエチレンヒマシ油、クロルヘキシジングルコン酸塩液

効能 涙液の補助(目のかわき)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼

製剤 乳白色半透明の液

包装・価格 10mL 800円

その他 製造販売 テイカ製薬

ポポンピュメリ目薬R
(塩野義製薬)

パソコン作業などで起きる目
の疲れに「さして、ケア」

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中：

シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)……………5mg

ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……………50mg

コンドロイチン硫酸ナトリウム……………100mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………10mg

タウリン……………100mg

添加物 ホウ酸、ホウ砂、濃ベンザルコニウム塩化物液50、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、l-メントール、d-ボルネオール、ハッカ油、ウイキョウ油

効能 目の疲れ、結膜充血、目のかすみ(目やにの多いときなど)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ

用法・用量 1回2～3滴、1日5～6回点眼

製剤 赤色透明の液

包装・価格 15mL 800円

その他 製造販売 テイカ製薬

ロートCキューブクリア フラッシュAL

(ロート製薬)

レンズ装用中の不快感・目の
かゆみに

区分 第3類医薬品

成分 外液：

クロルフェニラミン
マレイン酸塩……………0.03%
コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム……………0.5%
ビタミンB₆
(ピリドキシン塩酸塩)……………0.01%

添加物 塩化Na, ホウ酸, ホウ砂, ポリオキシ
エチレン硬化ヒマシ油, ポリオキシエチレ
ンポリオキシプロピレングリコール, エデ
ト酸Na, pH調節剤

効能 目のかゆみ, ソフトコンタクトレ
ンズ又はハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感, 目の疲れ,
眼病予防(水泳のあと, ほこりや汗が
目に入ったときなど), 紫外線その他
の光線による眼炎(雪目など), 目のか
すみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1回1～2滴, 1日5～6回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 13mL 700円

ロートジーb

(ロート製薬)

冴え渡る超清涼感目薬

区分 第2類医薬品

成分 外液：

塩酸テトラヒドロゾリン……………0.05%
ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.003%
硫酸亜鉛水和物……………0.05%
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.03%
ビタミンB₆……………0.1%
L-アスパラギン酸カリウム……………1%

添加物 ホウ酸, ホウ砂, l-メントール, d-カ
ンフル, ハッカ油, エデト酸Na, ポリオキ
シエチレン硬化ヒマシ油, ヒプロメロース,
クロロブタノール, pH調節剤

効能 目の疲れ, 眼病予防(水泳のあと,
ほこりや汗が目に入ったときなど),
紫外線その他の光線による眼炎(雪目
など), ハードコンタクトレンズを装
着しているときの不快感, 結膜充血,
目のかゆみ, 眼瞼炎(まぶたのただれ),
目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量 1回2～3滴, 1日5～6回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 12mL 550円

ロートジープロb

(ロート製薬)

目の疲れを爽快リフレッシュ

区分 第2類医薬品

成分 外液：

塩酸テトラヒドロゾリン……………0.05%
ネオスチグミンメチル硫酸塩……………0.005%
アラントイン……………0.2%
クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.03%
ビタミンB₆……………0.1%
L-アスパラギン酸カリウム……………1%

添加物 ホウ酸, ホウ砂, l-メントール, d-カ
ンフル, ペパーミントオイル, ハッカ油,
プロピレングリコール, エデト酸Na, ポリ
オキシエチレン硬化ヒマシ油, ヒプロメロ
ース, ブドウ糖, クロロブタノール, pH調
節剤

効能 目の疲れ, 目のかすみ(目やにの
多いときなど), 紫外線その他の光線
による眼炎(雪目など), ハードコンタ
クトレンズを装着しているときの不快感,
結膜充血, 目のかゆみ, 眼病予防
(水泳のあと, ほこりや汗が目に入
ったときなど), 眼瞼炎(まぶたのただ
れ)

用法・用量 1回2～3滴, 1日5～6回点眼

製剤 無色透明の液

包装・価格 12mL 780円

人工涙液

ファーストマイティア CL-B

(武田薬品工業)

水冷感が持続するコンタクト
レンズ用目薬

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中：

L-アスパラギン酸カリウム……………1mg
塩化ナトリウム……………1mg
塩化カリウム……………1mg

添加物 ホウ酸, クエン酸ナトリウム水和物,
エデト酸ナトリウム水和物, ポリソルベ
ート80, l-メントール, クロロブタノール,
ホウ砂, ヒプロメロース, pH調節剤

効能 ソフトコンタクトレンズまたはハ
ードコンタクトレンズを装着してい
る時の不快感, 涙液の補助(目のかわ
き), 目の疲れ, 目のかすみ(目やにの
多いときなど)

用法・用量 1回2～3滴を1日5～6回点眼

製剤 無色透明な目薬

包装・価格 9mL 600円

その他 製造販売 千寿製薬

鼻炎用点鼻薬

コンタック鼻炎スプレー
＜季節性アレルギー専用＞
(グラクソ・スミスクライン)

ステロイド単剤の点鼻薬。通常1日2回で効果が持続

【区分】 第1類医薬品

【成分】 噴 100g中：

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル……0.05g

【添加物】 セルロース、CMC-Na、プロピレングリコール、グリセリン、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、クエン酸、香料（*l*-メントールを含む）

【効能】 花粉など季節性アレルギーによる次のような症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ

【用法・用量】 成人（18才以上）通常1日2回朝夕、1回1度ずつ両鼻腔内に噴霧。症状により1日1～4回に増減。使用間隔は3時間以上おくこと。1年間に1カ月間を超えて使用しないこと

【製品特有の注意】 18才未満の人は使用不可。ステロイド点鼻薬を過去1年のうち1カ月間以上使用した人は使用不可

【製剤】 白色の懸濁液

【包装・価格】 10mL 1,970円

【その他】 製造販売 佐藤製薬

ナザールAR
＜季節性アレルギー専用＞
(佐藤製薬)

季節性アレルギーのつらい鼻症状に

【区分】 第1類医薬品

【成分】 外液 100g中：

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル……0.05g

【添加物】 セルロース、CMC-Na、プロピレングリコール、グリセリン、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物、クエン酸、香料（*l*-メントールを含む）

【効能】 花粉など季節性アレルギーによる次のような症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ

【用法・用量】 成人（18才以上）通常、左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつを1日2回（朝・夕）噴霧。1日最大4回（8噴霧）まで使用できるが、使用間隔は3時間以上おくこと。症状が改善すれば使用回数を減らす。症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもよい。1年間に1カ月間を超えて使用しないこと

【製品特有の注意】 使う前に容器を軽く振ってからキャップをはずす

【包装・価格】 10mL 1,880円

鼻炎用内服薬

アルガード鼻炎内服薬Z
(ロート製薬)

メキタジン、塩酸ブソイドエフェドリン 配合鼻炎用内服薬

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 力 3カプセル中：

メキタジン……4mg

塩酸ブソイドエフェドリン……75mg

ベラドンナ総アルカロイド……0.4mg

グリチルリチン酸二カリウム……60mg

無水カフェイン……150mg

【添加物】 ポリソルベート80、グリセリン脂肪酸エステル、サラシミツロウ、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ゼラチン、濃グリセリン、酸化チタン

【効能】 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】 成人（15～64才）1回1カプセルを、1日3回食後に服用

【製剤】 淡黄白色のだ円球形の軟カプセル

【包装・価格】 10カプセル 1,280円・20カプセル 1,980円

コルゲンコーワ
鼻炎フィルム
(興和)

水なし服用可能、携帯に便利なフィルム状の鼻炎用内服薬

【区分】 第2類医薬品

【成分】 フィルム 1枚中：

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……2.0mg

ベラドンナ総アルカロイド……0.2mg

フェニレフリン塩酸塩……5.0mg

【添加物】 ヒプロメロース、還元麦芽糖水アメ、酸化チタン、*l*-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、サッカリンNa、エリスリトール、亜硫酸水素Na、香料、青色一号アルミニウムレーキ

【効能】 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】 成人（15才以上）1回1枚、1日3回、口中で溶かして服用。ただし、服用間隔は4時間以上おくこと

【製剤】 淡青白色～淡い青緑白色のフィルム剤

【包装・価格】 9枚 1,000円・18枚 1,600円

【その他】 販売 興和新薬

コンタック600プラス
小児用

(グラクソ・スミスクライン)

1日2回で鼻の症状にダブルツインアクション。子ども用

【区分】 指定第2類医薬品

【成分】 力 2カプセル中：

ブソイドエフェドリン塩酸塩……60mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩……4mg

ベラドンナ総アルカロイド……0.2mg

無水カフェイン……50mg

リゾチーム塩酸塩……30mg(力価)

【添加物】 トウモロコシデンプン、乳糖水和物、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、部分アルファー化デンプン、ゼラチン、青色1号、ラウリル硫酸Na

【効能】 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

【用法・用量】 7～14才1回1カプセル、1日2回（朝・夕）服用

【製剤】 淡青色と白色の硬カプセル

【包装・価格】 10カプセル 1,000円

【その他】 製造販売 佐藤薬品工業

ストナリニフィルム
(佐藤製薬)

薄いフィルムタイプの鼻炎薬

【区分】 第2類医薬品

【成分】 力 3枚中：

d-クロルフェニラミンマレイン酸塩……6mg

ベラドンナ総アルカロイド……0.6mg

【添加物】 ヒプロメロース、グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、アセスルファムK、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、*l*-メントール、セルロース、CMC-Na、香料、銅クロロフィリンNa

【効能】 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【用法・用量】 成人（15才以上）1回1枚を、1日3回口中で溶かして服用。ただし、服用間隔は4時間以上おくこと

【製剤】 淡緑色のフィルム剤

【包装・価格】 6枚 780円

プレコール
持続性鼻炎カプセルLX
(第一三共ヘルスケア)

プソイドエフェドリンとフェニレフリン配合持続性鼻炎薬

区分 指定第2類医薬品

成分 効 4カプセル中：

プソイドエフェドリン塩酸塩……120mg
フェニレフリン塩酸塩……10mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……8mg
ベラドンナ総アルカロイド……0.4mg
グリチルリチン酸……45mg
無水カフェイン……100mg

添加物 トウモロコシデンプン、乳糖、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、青色1号、ゼラチン、ラウリル硫酸Na

効能 急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水、くしゃみ、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量 成人(15才以上)1回2カプセル、7～14才1回1カプセル。1日2回(朝夕)服用

製剤 淡緑色と白色のカプセル

包装・価格 20カプセル 1,450円☆・40カプセル 2,500円☆

その他 製造販売 佐藤薬品工業

乗物酔い薬

トラベルミン1
(エーザイ)

1日1回1錠で効く乗物酔い薬

区分 第2類医薬品

成分 錠1錠中：

塩酸メクリジン……50mg
スコポラミン臭化水素酸塩
水和物……0.25mg

添加物 カラギーナン、トウモロコシデンプン、D-マンニトール、L-メントール、香料、三酸化鉄、ジメチルポリシロキサン、ステビア抽出精製物、セルロース、ポビドン、無水ケイ酸

効能 乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠。1日1回かむか、口中で溶かして服用。ただし、乗物酔いの予防には乗物に乗る30分前に服用

製剤 淡黄色のチュアブル錠

包装・価格 3錠 881円

口腔内殺菌消毒薬

ガラクール
(エスエス製薬)

のどの殺菌・消毒、口臭除去に

区分 第3類医薬品

成分 外液 1mL中：

ポビドンヨード……70mg
(有効ヨウ素として7mg)

添加物 キシリトール、マクロゴール、アルコール、グリセリン、ヨウ化K、サッカリンNa、L-メントール、ユーカリ油、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 1回、本剤2～4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいする

製剤 赤褐色の外用液剤

包装・価格 300mL 1,800円☆

その他 製造販売 玉川衛材

トラフルクイックショット
(第一三共ヘルスケア)

口内炎・のどの痛み

区分 第3類医薬品

成分 外液 100g中：

アズレンスルホン酸ナトリウム

水和物(水溶性アズレン)……20mg

添加物 L-メントール、ベンゼトニウム塩化物、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、エデト酸Na、ステビア抽出物、塩化Na、pH調節剤

効能 口内炎、のどの炎症によるのどの痛み・のどのあれ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量 1日数回、適量を患部に噴射塗布

製剤 紫色半透明の粘稠な液

包装・価格 20mL 1,050円☆

その他 製造販売 東興薬品工業

外用殺菌消毒薬

オスバンラビングA

（武田薬品工業）

ベンザルコニウム塩化物0.2%
%を含有したエタノール溶液

区分 第3類医薬品

成分 外液 100mL中：

ベンザルコニウム塩化物……………0.2g

添加物 トリイソオクタン酸グリセリン，DL-
ピロリドンカルボン酸ナトリウム液，エタ
ノール，香料，グリセリン

効能 手指の殺菌・消毒

用法・用量 適量をそのまま手指に塗布し，
乾燥するまで摩擦すること

製品特有の注意 床や家具，皮革製品など
に付着しないようにすること（変質ま
たは変色するおそれがある）

製剤 無色澄明な液

包装・価格 400mL・1,280円

その他 製造販売 日本製薬

外用化膿性疾患用薬

エピロンエー

（湧永製薬）

化膿性皮膚疾患用薬

区分 第2類医薬品

成分 軟 100g中：

ビタミンA油……………0.2g

（1g中に100万ビタミンA単位含有）

ホモスルファミン……………2g

尿素……………5g

酸化亜鉛……………30g

アラントイン……………0.5g

トコフェロール酢酸エステル……………0.1g

添加物 ジブチルヒドロキシトルエン（BHT），
没食子酸プロピル，タルク，香料，プロピ
レングリコール，ミリスチン酸イソプロピ
ル，ラノリン，流動パラフィン，サラシミ
ツロウ，グリセリン脂肪酸エステル，ワセ
リン

効能 化膿性皮膚疾患，とびひ，面ちょう

用法・用量 1日数回，適量を患部に塗布す
るか，ガーゼなどにのばして貼付

製品特有の注意 寒冷時に軟膏が硬くなる
ことがある。その場合は，暖かい所に
しばらく置いて軟らかくなってから使
用する

製剤 白色～微黄色の軟膏剤

包装・価格 18g 950円

外用鎮痛・消炎薬（貼付薬）

セデスVFR

（塩野義製薬）

消炎鎮痛プラスター〔微香
性〕フェルビナク35mg配合

区分 第2類医薬品

成分 硬 膏体100g中：

フェルビナク……………3.5g

添加物 脂環族飽和炭化水素樹脂，流動パラフ
イン，L-メントール，ジイソプロパノール
アミン，その他3成分

効能 肩こりに伴う肩の痛み，腰痛，関
節痛，筋肉痛，腱鞘炎（手・手首・足
首の痛みとはれ），肘の痛み（テニス肘
など），打撲，捻挫

用法・用量 表面のライナーをはがし，成
人（15才以上）1日2回を限度として患部
に貼付

製剤 微香性，ナチュラルベージュの貼
付剤

包装・価格 16枚 1,800円・32枚 2,900円

その他 製造販売 大石膏盛堂

トクホン
フェルビナプラスター
（トクホン）

片手でも簡単に貼れ，微香性
で目立たないプラスター

区分 第2類医薬品

成分 硬 膏体100g(0.7m²)中：

フェルビナク……………3.5g

L-メントール……………3.0g

添加物 クロタミトン，酸化亜鉛，ジブチルヒ
ドロキシトルエン，ポリイソブチレン，エ
ステルガム，生ゴム，その他2成分

効能 肩こりに伴う肩の痛み，腰痛，関
節痛，筋肉痛，打撲，捻挫，腱鞘炎
（手・手首・足首の痛みと腫れ），肘の
痛み（テニス肘など）

用法・用量 成人（15才以上）薬剤面をおお
ったライナーをはがし，1日2回を限度
として患部に貼付

製剤 ファンデーションカラーの支持体
に白色～淡黄白色の膏体

包装・価格 中判10枚入 920円・20枚入
1,040円・40枚入 1,700円

パスタイムFX7
(祐徳薬品工業)

腰や関節の痛みによく効く
フェルピナク配合プラスター

区分 第2類医薬品
成分 硬 1枚中：
 フェルピナク…………… 35mg
添加物 L-メントール、流動パラフィン、ステレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、その他4成分
効能 関節痛、筋肉痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み
用法・用量 表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する
製剤 淡褐色のプラスター
包装・価格 7枚 980円・14枚 1,750円・21枚 2,280円・35枚 3,300円

外用鎮痛・消炎薬（塗布薬）

アンメルツ ゴールドEX
(小林製薬)

“血行促進成分”を配合した塗
る肩こり薬

区分 第2類医薬品
成分 外液 100mL中：
 フェルピナク…………… 3g
 ノナン酸バニリルアミド…………… 12mg
 L-メントール…………… 6g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩… 100mg
添加物 グリチルレチン酸、プロピレングリコール、pH調整剤、BHT、エタノール
効能 肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、関節痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫
用法・用量 1日2～4回、適量を患部に塗布する
製剤 無色～微黄色澄明の液体
包装・価格 46mL 1,000円・80mL 1,500円

**エアースロンパス
ジェットα**
(久光製薬)

サリチル酸グリコール配合
ジェット噴射エアゾール

区分 第3類医薬品
成分 噴 100mL中：
 L-メントール…………… 10.0g
 サリチル酸グリコール…………… 2.0g
 グリチルレチン酸…………… 0.2g
添加物 ヒドロキシプロピルセルロース、1,3-ブチレングリコール、無水エタノール、DME
効能 筋肉疲労、筋肉痛、肩こり、腰痛、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ
用法・用量 1日数回、適量を患部に噴霧
製品特有の注意 よく振って噴霧する。吸入しない。患部まで10cmの距離で噴霧する。同じ箇所連続して1秒以上噴霧しない
製剤 外用エアゾール剤
包装・価格 100mL 940円・150mL 1,310円・300mL 2,350円

トクホンダッシュエアロ
(トクホン)

ほてった患部を瞬時にクール
ダウン、使いごち爽快

区分 第3類医薬品
成分 噴 100mL中：
 L-メントール…………… 2.1g
 サリチル酸グリコール…………… 1.5g
 ビタミンE酢酸エステル…………… 0.3g
 クロルフェニラミンマレイン酸塩… 30mg
 グリチルレチン酸…………… 60mg
 ニコチン酸ベンジルエステル…………… 6mg
添加物 アルコール、タルク、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチルエーテル、香料
効能 筋肉疲労、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、腰痛、肩こり、しもやけ
用法・用量 1日数回、患部に適量を噴霧
製品特有の注意 パウダー入りのため、よく振ってから使用する
製剤 外用エアゾール剤
包装・価格 100mL 1,040円・200mL 1,600円

**トクホン
フェルピナローション**
(トクホン)

手軽な携帯用の30mLボトル
と塗りやすい100mLボトル

区分 第2類医薬品
成分 外液 100g中：
 フェルピナク…………… 3.0g
 L-メントール…………… 6.0g
 ビタミンE酢酸エステル…………… 0.5g
添加物 アジピン酸ジイソプロピル、ベンジルアルコール、プロピレングリコール、ジイソプロパノールアミン、アルコール、水
効能 肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）
用法・用量 1日2～4回、適量を患部に塗布
製剤 無色～黄色澄明な外用液剤
包装・価格 30mL 880円・100mL 1,500円

バンテリンコーワ液W
(興和)

様々な部位に使いやすいワイドスポンジの傾斜容器採用

区分 第2類医薬品

成分 **外液** 1g中:

インドメタシン……………10mg
L-メントール……………30mg

添加物 ヒプロメロース, エデト酸Na, 亜硫酸水素Na, 香料, ジイソプロパノールアミン, マクロゴール, ベンジルアルコール, アジピン酸ジイソプロピル, イソプロパノール, グリセリン

効能 筋肉痛, 肩こりに伴う肩の痛み, 腰痛, 関節痛, 腱鞘炎(手・手首の痛み), 肘の痛み(テニス肘など), 打撲, 捻挫

用法・用量 1日4回を限度として適量を患部に塗布

製剤 黄色澄明の液

包装・価格 90g 2,500円

その他 **販売** 興和新薬

外用湿疹・皮膚炎用薬

ウナコーワジェル
(興和)

虫さされなどのしつこく残るかゆみと赤みに

区分 指定第2類医薬品

成分 **軟** 1g中:

デキサメタゾン酢酸エステル……0.25mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩……20.0mg
リドカイン……………5.0mg
L-メントール……………35.0mg
dl-カンフル……………30.0mg

添加物 ヒプロメロース, カルボキシビニルポリマー, プロピレングリコール, エデト酸Na, ジイソプロパノールアミン, エタノール

効能 虫さされ, かゆみ, 湿疹, かぶれ, 皮膚炎, あせも, ただれ, しもやけ, じんましん

用法・用量 1日数回適量を患部に塗布

製剤 白色半透明のゲル状軟膏剤

包装・価格 15g 800円

その他 **販売** 興和新薬

かゆケア
(明治製菓)

かゆい湿疹, 虫さされに

区分 指定第2類医薬品

成分 **軟** 1g中:

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………1.5mg
クロタミトン……………50.0mg
トコフェロール酢酸エステル……5.0mg
イソプロピルメチルフェノール……1.0mg

添加物 ミリスチン酸イソプロピル, ポリオキシエチレンセチルエーテル, グリセリン, パラベン, カルボキシビニルポリマー, 水酸化Na, 塩酸

効能 湿疹, 皮膚炎, あせも, かぶれ, かゆみ, 虫さされ, じんましん

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗擦

製剤 白色のクリーム剤

包装・価格 15g オープン価格

その他 **製造販売** 新生薬品

かゆケアN
(明治製菓)

かゆい湿疹, 虫さされに

区分 指定第2類医薬品

成分 **軟** 1g中:

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………1.5mg
クロタミトン……………50.0mg
トコフェロール酢酸エステル……5.0mg
イソプロピルメチルフェノール……1.0mg

添加物 トリエタノールアミン, クエン酸, ステアリン酸グリセリン, ワセリン

効能 湿疹, 皮膚炎, ただれ, あせも, かぶれ, かゆみ, 虫さされ, じんましん

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗擦

製剤 半透明白色の軟膏剤

包装・価格 15g オープン価格

その他 **製造販売** 新生薬品

シオノギPVクリーム
(塩野義製薬)

アンテドラッグステロイド配合 しっしん, 皮ふ炎治療薬

区分 指定第2類医薬品

成分 **軟** 1g中:

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………1.5mg
クロタミトン……………50.0mg
トコフェロール酢酸エステル……5.0mg
イソプロピルメチルフェノール……1.0mg

添加物 ミリスチン酸イソプロピル, ポリオキシエチレンセチルエーテル, 濃グリセリン, パラオキシン安息香酸メチル, カルボキシビニルポリマー, 水酸化ナトリウム, 塩酸, 精製水

効能 しっしん, かゆみ, 虫さされ, 皮ふ炎, あせも, かぶれ, じんましん

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗擦

製剤 白色のクリーム

包装・価格 10g 1,477円

その他 **製造販売** 新生薬品

シオノキPV軟膏

(塩野義製薬)

アンテドラグステロイド配合 しっしん、皮ふ炎治療薬

区分 指定第2類医薬品

成分 軟 1g中:

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………1.5mg
クロタミトン…………… 50.0mg
トコフェロール酢酸エステル……………5.0mg
イソプロピルメチルフェノール……………1.0mg

添加物 トリエタノールアミン, クエン酸, モノステアリン酸グリセリン, 白色ワセリン

効能 しっしん, かゆみ, 虫さされ, 皮ふ炎, ただれ, あせも, かぶれ, じんましん

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗擦

製剤 白色半透明の軟膏

包装・価格 10g 1,477円

その他 製造販売 新生薬品

トレンタムクリーム

(佐藤製薬)

ノンステロイド性の鎮痒消炎剤

区分 第2類医薬品

成分 ㊦ 1g中:

ウフェナマート…………… 50mg
リドカイン…………… 10mg
マレイン酸クロルフェニラミン…………… 10mg
酢酸トコフェロール
(ビタミンE酢酸エステル)……………5mg

添加物 ワセリン, 流動パラフィン, グリセリン, ステアリンアルコール, ステアリン酸グリセリン, ステアリン酸マクロゴール, パラベン

効能 皮膚炎, かゆみ, 湿疹, かぶれ, おむつかぶれ, ただれ, あせも

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 白色のクリーム剤

包装・価格 15g 1,886円

プチウナコーワα

(興和)

赤みが残る虫さされ, ガンコなかゆみに。携帯用プチ容器

区分 指定第2類医薬品

成分 外液 1mL中:

デキサメタゾン酢酸エステル………… 0.25mg
ジフェンヒドラミン塩酸塩………… 20.0mg
リドカイン……………5.0mg
L-メントール……………30.0mg

dl-カンフル……………20.0mg

添加物 エデト酸Na, クエン酸, グラニオール, エタノール

効能 かゆみ, 虫さされ

用法・用量 1日数回適量を患部に塗布

製剤 無色透明な液剤

包装・価格 12mL 580円

その他 販売 興和新薬

メンソレータムAD こどもソフト

(ロート製薬)

かさつく肌のかゆみ治療薬

区分 第3類医薬品

成分 外液 1g中:

ジフェンヒドラミン…………… 10mg
トコフェロール酢酸エステル…………… 10mg
パンテノール…………… 10mg
グリチルリチン酸二カリウム……………5mg

添加物 ワセリン, グリセリン, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油, パルミチン酸イソプロピル, ジメチルポリシロキサン, フィトステロール, キサンタンガム, クエン酸, N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N'-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド, エデト酸ナトリウム, クエン酸ナトリウム, パラベン

効能 かゆみ, 皮膚炎, かぶれ, しっしん, じんましん, あせも, しもやけ, 虫さされ, ただれ

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 白色～微黄白色の液

包装・価格 120mL 980円

メンソレータム メディクイッククリームR

(ロート製薬)

湿疹・かぶれの治療薬

区分 指定第2類医薬品

成分 ㊦ 1g中:

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………1.5mg
クロタミトン…………… 50mg
リドカイン…………… 10mg
アラントイン……………2mg
イソプロピルメチルフェノール……………1mg

添加物 パルミチン酸イソプロピル, ワセリン, ベヘニルアルコール, ステアリンアルコール, セタノール, ステアリン酸グリセリン, セトマクロゴール, 乳酸, ジメチルポリシロキサン, パラベン, BHT

効能 湿疹, かぶれ, かゆみ, 皮膚炎, じんましん, あせも, 虫さされ

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 白色～淡黄色のクリーム

包装・価格 8g 1,600円

メンソレータム メディクイック軟膏R

(ロート製薬)

湿疹・かぶれの治療薬

区分 指定第2類医薬品

成分 軟 1g中:

プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………1.5mg
クロタミトン…………… 50mg
リドカイン…………… 10mg
アラントイン……………2mg
イソプロピルメチルフェノール……………1mg

添加物 ワセリン, ゲル化炭化水素, パラフィン, ステアリン酸グリセリン, 流動パラフィン, パラベン

効能 湿疹, かぶれ, ただれ, かゆみ, 皮膚炎, じんましん, あせも, 虫さされ

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 白色～淡黄色の軟膏

包装・価格 8g 1,600円

レスタミンコーワ パウダークリーム

(興和)

やわらかい製剤で、おむつかぶれ等に優しく塗れます

区分 第3類医薬品

成分 ㊦ 1g中:

ジフェンヒドラミン塩酸塩…………… 20mg
酸化亜鉛…………… 100mg
グリチルレチン酸…………… 1mg

添加物 無水ケイ酸, ヒドロキシエチルセルロース, セタノール, ステアリン酸, ミリスチン酸オクチルドデシル, 流動パラフィン, ジメチルポリシロキサン, ステアリン酸ポリオキシル, ポリソルベート20, オレイン酸ソルビタン, パラベン, クエン酸, 香料, エタノール

効能 あせも, かぶれ, 湿疹, かゆみ, ただれ, 皮膚炎, しもやけ, 虫さされ, じんましん

用法・用量 1日数回適量を患部に塗布

製剤 白色の乳剤性軟膏剤

包装・価格 40g 880円

その他 販売 興和新薬

かゆみ・虫さされ用薬

デリトリーナ

(大正製薬)

デリケート部位のかゆみ・かぶれに

区分 第2類医薬品

成分 ⑦ 100g中：

ジフェンヒドラミン……………1.0g
 リドカイン……………2.0g
 グリチルレチン酸……………1.0g
 トコフェロール酢酸エステル
 (ビタミンE)……………0.5g
 イソプロピルメチルフェノール……………0.1g
 l-メントール……………0.5g
 (添加物) ポリソルベート60, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60, ミリスチン酸オクチルデシル, イソステアリン酸, ステアリアルコール, 中鎖脂肪酸トリグリセリド, 1,3-ブチレングリコール, カルボキシビニルポリマー, エデト酸Na, パラベン

効能 かゆみ, かぶれ, 湿疹, 皮膚炎, じんましん, あせも, ただれ, 虫さされ, しもやけ

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 白色～類白色のクリーム

包装・価格 12g 780円

ヒフルEX液

(小林薬品工業)

虫さされ・かゆみに。アンテドラッグステロイド配合

区分 指定第2類医薬品

成分 ⑧ 外液 100mL中：

ブレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル……………0.15g
 ジフェンヒドラミン塩酸塩……………1.0g
 l-メントール……………3.5g
 dl-カンフル……………1.0g
 イソプロピルメチルフェノール……………0.1g
 (添加物) ジブチルヒドロキシルエン, 1,3-ブチレングリコール, エタノール

効能 虫さされ, かゆみ, しっしん, 皮膚炎, かぶれ, じんましん, あせも

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製剤 無色透明の液体

包装・価格 40mL 1,280円

その他 製造販売 万協製薬

ムヒホワイティ

(池田模範堂)

黒く残りやすい, 赤くはれやすい方の虫さされ・かゆみに

区分 指定第2類医薬品

成分 ⑧ 外液 100g中：

ヒドロコルチゾン……………0.5g
 ジフェンヒドラミン塩酸塩……………1.0g
 l-メントール……………2.5g
 dl-カンフル……………0.5g
 アラントイン……………0.2g

(添加物) 疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース, パルミチン酸アスコルビン酸, ポリオキシエチレンオレイルエーテル, 乳酸, エタノール

効能 虫さされ, かゆみ, 皮膚炎, かぶれ, しっしん, じんましん, あせも

用法・用量 1日数回, 適量を患部に塗布

製品特有の注意 使用前によく振って使う

製剤 微黄色澄明な粘性のある液

包装・価格 20g 1,000円

水虫・たむし用薬

ダマリングランデ
パウダースプレー

(大正製薬)

1日1回 かゆい水虫・たむしにサラサラのパウダー

区分 指定第2類医薬品

成分 ⑨ 90g中：

テルビナフィン塩酸塩……………135mg
 リドカイン……………270mg
 グリチルレチン酸……………67.5mg
 l-メントール……………135mg

(添加物) ソルビタンセスキオレイン酸エステル, ミリスチン酸オクチルデシル, エタノール, 炭酸マグネシウム, 酸化チタン, メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, トウモロコシデンプン, LPG, イソペンタン

効能 水虫, いんきんたむし, ぜにたむし

用法・用量 1日1回, 適量を患部に噴射塗布

製品特有の注意 同じ箇所に連続して1秒をこえて噴射しないこと。患部まで約10cmの距離で噴射すること

製剤 エアゾール。噴射時に霧状となり粉末とともに噴出する

包装・価格 90g 2,600円

ブテナロックVエア
爽快パウダー

(久光製薬)

優れた殺菌力+かゆみ止め成分パウダー配合でサラサラ感持続

区分 指定第2類医薬品

成分 ⑨ 噴 1mL中：

塩酸ブテナフィン……………10mg
 塩酸ジブカイン……………2mg
 マレイン酸クロルフェニラミン……………5mg
 グリチルレチン酸……………2mg
 l-メントール……………20mg

(添加物) イソプロパノール, エタノール, ジエタノールアミン, タルク, トウモロコシデンプン, 二酸化ケイ素, ポリオキシエチレンオレイルエーテル, ミリスチン酸イソプロピル, DME

効能 みずむし, いんきんたむし, ぜにたむし

用法・用量 1日1回, 適量を患部に噴射塗布

製品特有の注意 患部より約10cmの距離で噴射する。同じ箇所に連続して3秒以上噴射しない。「正立」または「倒立」で使用する

製剤 パウダー配合の外用エアゾール剤

包装・価格 70mL 2,200円

**メンソレータム
エクシブクリームe**
(ロート製薬)

みずむし・たむし用薬

区分 指定第2類医薬品

成分 100g中：

テルピナフィン塩酸塩……………1.0g
リドカイン……………2.0g
ジフェンヒドラミン……………1.0g
グリチルレチン酸……………0.1g

添加物 エタノール，ワセリン，流動パラフィン，パルミチン酸イソプロピル，セトマクロゴール，カルボキシビニルポリマー，セタノール，大豆レシチン，ステアリン酸ソルビタン，ヒドロキシエチルセルロース，エデト酸Na，トリエタノールアミン，BHT，ヒアルロン酸Na，香料

効能 水虫，いんきんたむし，ぜにたむし

用法・用量 1日1回，適量を患部に塗布

製剤 白色～淡黄色のクリーム

包装・価格 15g 1,600円

**メンソレータム
エクシブスプレーe**
(ロート製薬)

みずむし・たむし用薬

区分 指定第2類医薬品

成分 100g中：

テルピナフィン塩酸塩……………1.0g
リドカイン……………2.0g
ジフェンヒドラミン……………1.0g
グリチルレチン酸……………0.1g

添加物 エタノール，ベンジルアルコール，クエン酸，BHT，香料

効能 水虫，いんきんたむし，ぜにたむし

用法・用量 1日1回，噴霧口を下に向けて適量を患部に噴霧

製品特有の注意 目に向けて噴霧したり，吸入しないこと

製剤 エアゾール剤。無色～淡黄色の液

包装・価格 70g 2,000円

**皮膚軟化薬
(乾燥性皮膚用薬)**

**ケラチナミンコーワW
クリーム**

(興和)

20%尿素＋ガンマ-オリザノールW配合 手指のあれ等に

区分 第3類医薬品

成分 100g中：

尿素……………20.0g
グリチルレチン酸……………0.3g
ガンマ-オリザノール……………1.0g

添加物 ワセリン，ステアリアルアルコール，セタノール，流動パラフィン，ポリソルベート60，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ステアリン酸グリセリン，エデト酸Na，グリシン，リン酸二水素K，水酸化Na

効能 手指のあれ，ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症，老人の乾皮症，さめ肌

用法・用量 1日数回適量を患部に塗擦

製品特有の注意 衣類に付着すると，まれに黄ばみを生じることがあるので，注意する

製剤 白色～淡黄白色の乳剤性軟膏

包装・価格 40g 1,100円・75g 1,700円

その他 販売 興和新薬

**ケラチナミンコーワW
乳状液**

(興和)

20%尿素＋ガンマ-オリザノールW配合 かゆい乾燥肌に

区分 第3類医薬品

成分 100g中：

尿素……………20.0g
ジフェンヒドラミン塩酸塩……………1.0g
グリチルレチン酸……………0.3g
ガンマ-オリザノール……………1.0g

添加物 ワセリン，ステアリアルアルコール，オリブ油，グリセリン，カルボキシビニルポリマー，キサントタンガム，スクワラン，ミリスチン酸オクチルドデシル，ポリソルベート60，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ステアリン酸ソルビタン，亜硫酸水素Na，エデト酸Na，DL-アラニン，グリシン，クエン酸，水酸化Na，香料，エタノール，フェニルエチルアルコール，プロピレングリコール

効能 かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症)

用法・用量 1日数回適量を患部に塗擦

製品特有の注意 衣類に付着すると，まれに黄ばみを生じることがあるので，注意する

製剤 白色～淡黄白色の乳剤性ローション

包装・価格 100g 1,800円・200g 2,500円

その他 販売 興和新薬

**メンソレータム
レチノエース**

(ロート製薬)

荒れた手肌の治療薬

区分 第3類医薬品

成分 1g中：

尿素……………200mg
トコフェロール酢酸エステル……………20mg
グリチルリチン酸-アンモニウム……………5mg
ビタミンA油……………5mg

添加物 ワセリン，流動パラフィン，ステアリアルアルコール，セタノール，ポリソルベート60，ジメチルポリシロキサン，グリシン，ステアリン酸ソルビタン，ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油，ポビドン，トリエタノールアミン，エデト酸Na，BHT，香料，黄色4号(タートラジン)

効能 手指のあれ，ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症，老人の乾皮症，さめ肌

用法・用量 1日数回，適量を患部にすりこむ

製剤 淡黄色の軟膏

包装・価格 55g 1,080円・90g 1,380円

その他の外用薬

アットノン

(小林製薬)

目立って気になる傷あと・やけどのあとを改善していく

区分 第2類医薬品

成分 軟 100g中：

へパリン類似物質……………0.3g

添加物 カルボキシビニルポリマー、トリイソプロパノールアミン、プロピレングリコール、イソプロパノール、香料

効能 きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手指の荒れ、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、打身・ねんぎ後のはれ・筋肉痛・関節痛

用法・用量 1日1～数回、適量を患部にすりこむか、またはガーゼなどにのばして貼る

製剤 透明ジェル

包装・価格 15g 1,300円

その他 **製造販売** 大正薬品工業

腔カンジダ用薬

オキナゾールL100

(田辺三菱製薬)

腔カンジダの再発治療薬

区分 第1類医薬品

成分 錠 1錠中：

オキシコナゾール硝酸塩……………100mg

添加物 乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、ステアリン酸マグネシウム

効能 腔カンジダの再発(以前に医師から、腔カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る)

用法・用量 成人(15才以上60才未満)1日1回1錠を腔深部に挿入する(就寝前が望ましい)。6日間連続して使用すること。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診察を受けること

製品特有の注意 初めて腔カンジダの症状を経験した人は本剤を使用せず、医師の診察を受けること

製剤 白色の錠錠

包装・価格 6錠 2,800円

フェミニーナ腔カンジダ錠

(小林製薬)

悩んでいた腔カンジダの再発を自分で治すお薬です

区分 第1類医薬品

成分 錠 1錠中：

オキシコナゾール硝酸塩……………100mg

添加物 乳糖水和物、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クエン酸水和物、ステアリン酸マグネシウム

効能 腔カンジダの再発(以前に医師から、腔カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る)

用法・用量 成人(15才以上60才未満)1日1回1錠を腔深部に挿入する(就寝前が望ましい)。6日間連続して使用すること。ただし、3日間使用しても症状の改善がみられないか、6日間使用しても症状が消失しない場合には医師の診察を受けること

製品特有の注意 15才未満または60才以上：使用しないこと

製剤 白色の錠錠

包装・価格 6錠 2,800円

その他 **製造販売** 田辺三菱製薬

ビタミンA主薬製剤

ポポンピュメリ錠VA

(塩野義製薬)

パソコン作業などで感じる目の乾燥感に「のんで、ケア」

区分 指定第2類医薬品

成分 錠 2錠中：

レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)……………4,000ビタミンA単位
ジセチアミン塩酸塩水和物(ビタミンB₁誘導体)……………30mg

添加物 トウモロコシ油、天然ビタミンE、モノラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、乳糖水和物、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、ポリビニルアルコール・アクリル酸・メタクリル酸メチル共重合体、酸化チタン

効能 次の症状の緩和：目の乾燥感。夜盲症(とり目)。次の場合のビタミンAの補給：妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、発育期

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、小児(7～14才)1回1錠。1日1回服用

製剤 白色のフィルムコーティング錠

包装・価格 24錠 934円

その他 **製造販売** ダイト

ビタミンB₁主薬製剤

コンドロハイ900ゼリー
(ゼリア新薬工業)

飲みやすいゼリータイプのビタミンB₁製剤

区分 第3類医薬品

成分 ① 1包11g中:

コンドロイチン硫酸エステル
ナトリウム……………900mg
チアミン硝化物
(ビタミンB₁硝酸塩)……………10mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム
(ビタミンB₂リン酸エステル)……15mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……45mg
ニコチン酸アミド……………60mg

添加物 クエン酸、還元麦芽糖水アメ、デキストリン、プロピレングリコール、プルラン、カンテン、安息香酸Na、カロビーニングム、ブチルパラベン、スクラロース、エタノール、香料、バニリン、pH調節剤、その他1成分

効能 次の諸症状の緩和: 神経痛, 筋肉痛・関節痛(腰痛, 肩こり, 五十肩など), 手足のしびれ, 便秘, 眼精疲労。脚気。

「ただし, これらの症状について, 1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は, 医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁の補給: 肉体疲労時, 妊娠・授乳期, 病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1包服用
製品特有の注意 1回1包のみきり, 分割服用しない

製剤 黄色のゼリー状

包装・価格 10包 2,980円☆・20包 4,980円☆

ポポンピュメリ錠VB
(塩野義製薬)

パソコン作業などで起きる眼精疲労に「のんで, ケア」

区分 第3類医薬品

成分 錠 2錠中:

ジセチアミン塩酸塩水和物
(ビタミンB₁誘導体)……………120mg
リボフラビン(ビタミンB₂)……………10mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……50mg
シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)……60μg
コハク酸d-α-トコフェロール
(天然型ビタミンE)……………100mg

添加物 乳糖水和物, ヒドロキシプロピルセルロース, カルメロースカルシウム, 結晶セルロース, ステアリン酸マグネシウム, 含水二酸化ケイ素, ヒプロメロース, 白糖,

酸化チタン, 黄色三酸化鉄, 三酸化鉄, タルク, カルナウバロウ

効能 次の諸症状の緩和: 眼精疲労, 筋肉痛・関節痛(肩こり, 五十肩, 腰痛など), 神経痛, 手足のしびれ, 便秘。脚気。

「ただし, これらの症状について, 1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は, 医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₁の補給: 肉体疲労時, 妊娠・授乳期, 病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上)1回1~2錠, 小児(7~14才)1回1錠。1日1回。朝食後又は夕食後, なるべく30分以内に服用

製品特有の注意 服用により, 尿が黄色くなることがある

製剤 うすいだいだい色の楕円形フィルムコーティング錠

包装・価格 14錠 934円

モアストレッチ錠
(ロート製薬)

ビタミンB₁主薬製剤

区分 第3類医薬品

成分 錠 2錠中:

ベンフォチアミン……………138.3mg
(チアミン塩酸塩(ビタミンB₁)として100mg)

イノシトールヘキサニコチン酸
エステル……………200mg
リボフラビン(ビタミンB₂)……………6mg

ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)……10mg
シアノコバラミン(ビタミンB₁₂)……60μg
オキソアミダジン末……………20mg

添加物 ラウリン酸ソルビタン, ゼラチン, 白糖, グリセリン脂肪酸エステル, セルロース, シリカ, ヒドロキシプロピルセルロース, クロスCMC-Na, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, マクロゴール, 酸化チタン, タルク, カルナウバロウ

効能 1. 次の諸症状の緩和: 眼精疲労, 筋肉痛・関節痛(肩こり, 五十肩, 腰痛など), 神経痛, 手足のしびれ, 便秘。
2. 脚気。

「ただし, これら1・2の症状について1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は, 医師又は薬剤師に相談すること。」

3. 次の場合のビタミンB₁の補給: 肉体疲労時, 病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠を1日1回服用

製品特有の注意 尿が黄色くなることもある

製剤 白色~帯黄白色のフィルムコーティング剤

包装・価格 14錠 880円・50錠 1,980円

ビタミンB₂主薬製剤

チョコラBBピュア
(エーザイ)

肌あれ,にきびに,肌と脂質の代謝を助ける活性型ビタミンB₂+C

区分 第3類医薬品

成分 錠 2錠中:

リボフラビンリン酸エステル
ナトリウム……………38mg
アスコルビン酸カルシウム……………125mg
チアミン硝化物……………20mg
ピリドキシン塩酸塩……………24mg
ニコチン酸アミド……………40mg

添加物 タルク, 炭酸Ca, トウモロコシデンプン, ヒドロキシプロピルセルロース, 部分アルファー化デンプン, アラビアゴム, カルナウバロウ, 酸化チタン, 三酸化鉄, ステアリン酸, ステアリン酸Mg, セラック, セルロース, 二酸化ケイ素, 白糖, ヒプロメロース, プルラン, ポビドン, マクロゴール, リン酸水素Ca

効能 次の諸症状の緩和: 肌あれ, にきび, 皮膚炎, かぶれ, ただれ, 湿疹, 口内炎, 口角炎, 口唇炎, 舌炎, 目の充血, 目のかゆみ, 赤鼻。

「ただし, これらの症状について, 1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は, 医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給: 肉体疲労時, 妊娠・授乳期, 病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠。1日2回服用。朝夕食後に服用

製剤 淡黄白色の糖衣錠

包装・価格 40錠 981円・80錠 1,770円・130錠 2,601円・170錠 3,081円

プロビキューレAC錠
(塩野義製薬)

にきび・肌あれに ヨクイニン配合ビタミンB₂主薬製剤

区分 第3類医薬品

成分 錠 6錠中:

リボフラビン酪酸エステル
(ビタミンB₂誘導体)……………20mg
ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆)……………50mg
ビオチン……………21μg
ヨクイニン末……………600mg

添加物 結晶セルロース, ヒドロキシプロピルセルロース, クロスカルメロースナトリウム, 軽質無水ケイ酸, ステアリン酸マグネシウム, ヒプロメロース, タルク, アラビアゴム末, ポビドン, 白糖, 酸化チタン,

カルナウパロウ

効能 次の諸症状の緩和：にきび、肌あれ、口内炎、口角炎、口唇炎、舌炎、皮ふ炎、しっしん、かぶれ、ただれ、赤鼻、目の充血、目のかゆみ。

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量 成人(15才以上)1回2～3錠、11～14才1回1～2錠、7～10才1回1錠。1日2回。食後に服用

製品特有の注意 服用により、尿が黄色くなることもある

製剤 白色の糖衣錠

包装・価格 90錠 1,505円・180錠 2,457円

その他 **製造販売** 至誠堂製薬

ビタミンB₁₂主薬製剤

リラッセ

(エスエス製薬)

活性型ビタミンB₁₂製剤

区分 第3類医薬品

成分 錠3錠(1日量)中：

メコバラミン
(活性型ビタミンB₁₂)……………1,500μg
ヘプロニカート……………100mg
トコフェロールコハク酸エステル
カルシウム……………103.6mg
ビスベンチアミン
(ビタミンB₁誘導体)……………25mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…50mg

添加物 クロスCMC-Na, 無水ケイ酸, セルロース, 乳糖, 白糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒプロメロース, 炭酸Ca, カルナウパロウ, ステアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, パレイシヨデンブン, プルラン, ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール, ビタミンB₂

効能 次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、腰痛、手足のしびれ(しびれ感)、神経痛。

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

用法・用量 成人(15才以上)1回1錠を1日3回、食後に服用

製剤 黄色の糖衣錠

包装・価格 45錠 2,780円☆・90錠 4,780円☆

ビタミンC主薬製剤

プロビキューレSP錠

(塩野義製薬)

しみなどに L-システイン
配合ビタミンC主薬製剤

区分 第3類医薬品

成分 錠6錠中：

アスコルビン酸カルシウム…847.28mg
(ビタミンCとして700mg)
L-システイン……………160mg
リポフラビン(ビタミンB₂)……………12mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB₆)…30mg
d-α-トコフェロール
(天然ビタミンE)……………20mg

添加物 軽質無水ケイ酸, ヒドロキシプロピルセルロース, ステアリン酸マグネシウム, 結晶セルロース, ヒプロメロース, ポリオキシエチレン(105)ポリオキシプロピレン(5)グリコール, 精製白糖, タルク, アラビアゴム末, 酸化チタン, カルナウパロウ

効能 次の諸症状の緩和：しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着。次の場合の出血予防：歯ぐきからの出血、鼻出血。

「ただし、これらの症状について、1カ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師、薬剤師又は歯科医師に相談すること。」

次の場合のビタミンCの補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠、小児(7～14才)1回1錠。1日3回。食前又は食後に服用

製品特有の注意 服用により、尿が黄色くなることもある。服用により、尿および大便の検査値に影響をおよぼすことがある

製剤 白色の糖衣錠

包装・価格 60錠 1,505円・150錠 2,457円

ビタミン含有保健薬（液剤）

イキビタンV3000

（廣貴堂）

【区分】第2類医薬品

【成分】内液 1瓶(100mL)中：

インヨウカク流エキス……………0.15mL
 (原生薬換算量：インヨウカク150mg)
 ゴオウ浸出液……………5mg
 (原生薬換算量：ゴオウ0.5mg)
 ローヤルゼリーチンキ…………… 50mg
 (原生薬換算量：ローヤルゼリー50mg)
 チアミン硝化物…………… 10mg
 リポフラビンリン酸エステル
 ナトリウム……………5mg
 ビリドキシン塩酸塩……………5mg
 ニコチン酸アミド…………… 30mg
 無水カフェイン…………… 50mg
 タウリン……………3,000mg
 アスパラギン酸カリウム・
 マグネシウム等量混合物……………200mg
 コンドロイチン硫酸エステル
 ナトリウム……………120mg

【添加物】白糖，果糖ブドウ糖液糖，クエン酸水
 和物，クエン酸Na水和物，DL-リンゴ酸，
 安息香酸Na，カラメル，ポリリン酸Na，パ
 ラベン，エタノール，pH調整剤，グリセリ
 ン，プロピレングリコール，バニリン，香
 料

【効能】滋養強壯，虚弱体質，肉体疲労・
 病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
 性消耗性疾患・産前産後などの場合の
 栄養補給

【用法・用量】成人（15才以上）1日1回1瓶
 (100mL)服用

【製剤】褐色の内用液剤

【包装・価格】1瓶 300円

延寿内服液

（廣貴堂）

【区分】第2類医薬品

【成分】内液 1本(30mL)中：

クコシ流エキス…………… 0.2mL
 (原生薬換算量：クコシ200mg)
 ゴオウ浸出液…………… 10mg
 (原生薬換算量：ゴオウ1mg)
 ショウキョウエキス…………… 97mg
 (原生薬換算量：ショウキョウ1,000mg)
 ローヤルゼリーチンキ…………… 50mg
 (原生薬換算量：ローヤルゼリー50mg)
 ロクジョウチンキ……………0.08mL
 (原生薬換算量：鹿茸22.2mg)
 チアミン硝化物…………… 10mg
 リポフラビンリン酸エステル
 ナトリウム……………4mg
 ニコチン酸アミド…………… 20mg
 無水カフェイン…………… 50mg
 タウリン……………500mg
 カルニチン塩化物……………100mg

ジクロロ酢酸ジイソプロピルアミン… 10mg
 (アルコール…………… 0.2mL以下)

【添加物】白糖，水アメ，クエン酸水和物，ク
 エン酸Na水和物，DL-リンゴ酸，カラメル，
 安息香酸Na，パラベン，ピロリン酸Na，ポ
 リリン酸Na，メタリン酸Na，エタノール，
 pH調整剤，香料

【効能】滋養強壯，虚弱体質，肉体疲労・
 病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
 性消耗性疾患・産前産後などの場合の
 栄養補給

【用法・用量】成人（15才以上）1日1回1本
 (30mL)服用

【製品特有の注意】まれに沈殿を生じること
 があるので，よく振ってから服用する

【製剤】褐色の内用液剤

【包装・価格】5本 2,250円

新ゼリアスV10

（ゼリア新薬工業）

13種類の薬効成分配合の滋養
 強壯ドリンク剤

【区分】第2類医薬品

【成分】内液 1瓶(50mL)中：

コンドロイチン硫酸エステル
 ナトリウム……………300mg
 オウセイ流エキス……………2,000μL
 (原生薬換算：2,000mg)
 ガラナ軟エキス……………12.5mg
 (原生薬換算：100mg)
 イカリ草エキス……………20mg
 (原生薬換算：200mg)
 刺五加乾燥エキス……………24mg
 (原生薬換算：600mg)
 セイヨウサンザシエキス……………40mg
 (原生薬換算：160mg)
 トシシエキス……………55mg
 (原生薬換算：500mg)
 ハゲキテン流エキス……………200μL
 (原生薬換算：200mg)
 タウリン……………1,000mg
 ビタミンB₂リン酸エステル……………10mg
 ビタミンB₆……………10mg
 ニコチン酸アミド……………20mg
 カルニチン塩化物……………50mg
 (アルコール……………0.5mL以下)
 【添加物】白糖，還元麦芽糖水アメ，カラメル，
 安息香酸Na，ブチルパラベン，クエン酸Na，
 香料，バニリン，エタノール，pH調節剤2
 成分
 【効能】滋養強壯，肉体疲労・病後の体力
 低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消
 耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄
 養補給，虚弱体質
 【用法・用量】成人（15才以上）1日1回1瓶
 (50mL)を服用
 【製品特有の注意】服用により尿が黄色くな
 ることがある
 【製剤】褐色の液
 【包装・価格】50mL 1,150円☆

チオビタドリンク
 アイピタス

（大鵬薬品工業）

女性にも飲みやすいブルーベ
 リー風味

【区分】第3類医薬品

【成分】内液 1本(100mL)中：

タウリン……………1,000mg
 イノシトール……………50mg
 ニコチン酸アミド……………20mg
 ビタミンB₁硝酸塩……………10mg
 ビタミンB₂リン酸エステル……………15mg
 ビタミンB₆……………50mg
 カルニチン塩化物……………120mg
 無水カフェイン……………50mg

【添加物】白糖，果糖，ブドウ糖，DL-リンゴ酸，
 没食子酸プロピル，安息香酸Na，pH調整剤，
 バニリン，エチルバニリン，香料

【効能】滋養強壯，虚弱体質，肉体疲労・
 病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
 性消耗性疾患・産前産後などの場合の
 栄養補給

【用法・用量】成人（15才以上）1日1回1本
 (100mL)服用

【製品特有の注意】尿が黄色になることがある

【製剤】黄色のドリンク

【包装・価格】1本(100mL) 180円・3本 540
 円・10本 1,800円

ハイアミノ

（日水製薬）

肝臓加水分解物600mg配合
 ドリンク

【区分】第3類医薬品

【成分】内液 30mL中：

肝臓加水分解物……………600mg
 チアミン硝化物……………10mg
 リポフラビン……………6mg
 ビリドキシン塩酸塩……………6mg
 L-バリン……………94mg
 L-ロイシン……………106mg
 L-イソロイシン……………94mg

【添加物】エリスリトール，アセスルファムカリ
 ウム，スクラロース，タウマチン，pH調節
 剤，パラベン，プロピレングリコール，カ
 ラメル，香料

【効能】滋養強壯，虚弱体質，肉体疲労・
 病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱
 性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合
 の栄養補給

【用法・用量】成人（15才以上）1日1回1本
 (30mL)を服用

【製剤】褐色の液剤

【包装・価格】30mL×10本 3,600円

ヒストミンプラス液S

(小林薬品工業)

カンゾウ・ショウキョウ・麦
門冬配合

区分 第3類医薬品

成分 内液 30mL中：

カンゾウエキス……………300mg
ショウキョウ流エキス……………0.33mL
麦門冬流エキス……………0.1mL
ピリドキシン塩酸塩……………10mg
ニコチン酸アミド……………10mg
パンテノール……………10mg
タウリン……………300mg
(アルコール……………0.3mL以下)

添加物 エタノール, 白糖, クエン酸Na水和物,
クエン酸水和物, 安息香酸Na, パラベン,
香料, プロピレングリコール, バニリン,
ミツロウ, l-メントール

効能 病中病後・発熱性消耗性疾患・肉
体疲労・胃腸障害・栄養障害などの場
合の栄養補給。滋養強壯。虚弱体質

用法・用量 成人(15才以上)1回1瓶(30mL)
を1日3回服用

製品特有の注意 まれに沈殿を生じること
がある。よく振ってから服用する

製剤 褐色の液体

包装・価格 30mL×3本 980円

リポビタンゴールドエース

(大正製薬)

つらい疲れに

区分 第2類医薬品

成分 内液 1本(50mL)中：

タウリン……………1,500mg
ローヤルゼリー……………200mg
ニンジン軟エキス-B……………90mg
(人参630mgに相当)
オウギ流エキス-C……………0.2mL
(黄耆200mgに相当)
ハゲキテン流エキス……………0.2mL
(巴戟天200mgに相当)
チアミン硝化物(ビタミンB₁)……………5mg
リポフラビンリン酸エステル
ナトリウム(ビタミンB₂)……………5mg
ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆)……………5mg
トコフェロール酢酸エステル
(ビタミンE)……………30mg
ニコチン酸アミド……………20mg
イノシトール……………100mg
無水カフェイン……………50mg
(アルコール……………0.2mL以下)

添加物 白糖, D-ソルビトール, スクラロース,
アセスルファムK, ポビドン, グリセリン
脂肪酸エステル, ポリオキシエチレン硬化
ヒマシ油, グリセリン, 安息香酸Na, クエ

ン酸, クエン酸Na, 香料, アルコール, バ
ニリン

効能 滋養強壯。虚弱体質。肉体疲労・
病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱
性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合
の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本
(50mL)を服用

製品特有の注意 服用により尿が黄色にな
ることがある。生薬成分を含むため,
まれに沈殿を生じることがある

製剤 黄褐色～褐色の液

包装・価格 50mL 300円・50mL×3本 900
円

ビタミン含有保健薬(固形剤)

ハイチオールCプラス

(エスエス製薬)

しみ・そばかす, 全身倦怠,
二日酔いに

区分 第3類医薬品

成分 錠(成人1日量)中：

L-システイン……………240mg
アスコルビン酸(ビタミンC)……………500mg
パントテン酸カルシウム……………24mg

添加物 無水ケイ酸, セルロース, 乳酸Ca, 白
糖, ヒドロキシプロピルセルロース, ヒブ
ロメロース, 炭酸Ca, カルナウバロウ, ス
テアリン酸Mg, タルク, 酸化チタン, トウ
モロコシデンプン, プルラン, ポリオキシ
エチレンポリオキシプロピレングリコール

効能 しみ・そばかす・日焼けなどの色
素沈着症。全身倦怠。二日酔い。にきび,
湿疹, じんましん, かぶれ, くすりま
け

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 7～14
才1回1錠。1日3回服用

製剤 白色の糖衣錠

包装・価格 60錠 1,575円☆・180錠 4,410円
☆

生薬主薬保健薬

す・ぴん凜内服錠
(ロート製薬)

体の疲れが顔に出てしまったら

区分 第3類医薬品
成分 錠 4錠中：
 ニンジン乾燥エキス……………450mg
 (原生薬換算：3,000mg)
 ショウキョウエキス……………29.2mg
 (原生薬換算：300mg)
 ヨクイニンエキス……………46.2mg
 (原生薬換算：600mg)
 ニクジュヨウエキス……………75mg
 (原生薬換算：300mg)
 ローヤルゼリー……………30mg
添加物 セルロース，ヒドロキシプロピルセルロース，トウモロコシデンプン，メタケイ酸アルミン酸Mg，ステアリン酸Mg
効能 次の場合の滋養強壯：血色不良，冷え症，虚弱体質，肉体疲労，病中病後，胃腸虚弱，食欲不振
用法・用量 成人(15才以上)，1回2錠を1日2回服用
製品特有の注意 本剤は天然物(生薬)を用いているため，錠剤の色が多少異なることがある
製剤 淡褐色～褐色の錠剤
包装・価格 40錠 1,200円

カルシウム主薬製剤

カタセマグ
(全薬工業)

マグネシウムを300mg配合したカルシウム剤

区分 第2類医薬品
成分 錠 12錠中：
 沈降炭酸カルシウム……………1,500mg
 炭酸マグネシウム……………1,184mg
 タウリン……………150mg
 フマル酸第一鉄……………30mg
 コレカルシフェロール……………400I.U.
 L-リジン塩酸塩……………120mg
 リボフラビン……………5mg
添加物 ゼラチン，タルク，デンプン部分加水分解物，バニリン，ヒドロキシプロピルセルロース，D-マンニトール，ラウリン酸ソルビタン，香料，グリセリン脂肪酸エステル，クロスカルメロースNa，硬化油，酸化チタン，ステアリン酸Mg，セルロース，中鎖脂肪酸トリグリセリド，白糖，ヒプロメロース，マクロゴール
効能 次の場合の骨歯の発育促進：虚弱体質，腺病質。妊娠授乳婦の骨歯の脆弱防止
用法・用量 成人(15才以上)1回4錠，9～14才1回2錠。1日3回。食後に服用
製剤 白色のフィルムコーティング錠
包装・価格 240錠 2,400円・540錠 4,800円

葛根湯

エスタック漢方「葛根湯」エキス顆粒
(エスエス製薬)

満量処方 かぜのひきはじめ・鼻かぜ・頭痛・肩こりに

区分 第2類医薬品
成分 顆 3包(9.0g)中：
 葛根湯水製乾燥エキス……………5g
 (カクコン8g・ケイヒ・シャクヤク各3g・マオウ・タイソウ各4g・ショウキョウ1g・カンゾウ2g)
添加物 乳糖，ステアリン酸Mg
効能 体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期(汗をかいていないもの)，鼻かぜ，鼻炎，頭痛，肩こり，筋肉痛，手や肩の痛み
用法・用量 成人(15才以上)1回1包，7～14才1回 $\frac{3}{4}$ 包，4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包，2～3才1回 $\frac{1}{4}$ 包，2才未満1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回。食前又は食間に服用
製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 9包 1,680円☆
その他 製造販売 カーヤ

かみしょうようさん
加味逍遥散

加味逍遥散エキス錠N
「コタロー」
 (小太郎漢方製薬)
 加味逍遥散をエキス化した錠
 剤

区分 第2類医薬品
成分 錠 12錠中：
 加味逍遥散エキス散(½量)……………3.00g
 (トウキ1.5g・シャクヤク1.5g・ビャク
 ジュツ1.5g・ブクリョウ1.5g・サイコ
 1.5g・ポタンビ1.0g・サンシシ1.0g・カ
 ンゾウ1.0g・ショウキョウ0.5g・ハッカ
 0.5g)
添加物 カルメロースカルシウム、含水二酸化
 ケイ素、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、
 ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシ
 デンブ、アメ粉
効能 体力中等度以下で、のぼせ感があ
 り、肩がこり、疲れやすく、精神不安
 やいらだちなどの精神神経症状、とき
 に便秘の傾向のあるものの次の諸症：
 更年期障害、月経不順、月経困難、血
 の道症、不眠症、冷え症、虚弱体質
用法・用量 成人(15才以上)1回4錠、7～14
 才1回3錠、5～6才1回2錠、1日3回。食
 前または食間に服用
製品特有の注意 生薬を原料としているの
 で、製品により多少色が異なること
 がある
製剤 黄褐色～濃黄褐色の素錠
包装・価格 168錠 4,100円

かみしょうようさんごうしもつとう
加味逍遥散合四物湯

メグリナ
 (小林製薬)
 血の巡りをよくする 体の内
 側から肌を整える漢方薬

区分 第2類医薬品
成分 錠 18錠中：
 加味逍遥散合四物湯エキス……………3.9g
 (トウキ1.5g・シャクヤク1.5g・ビャク
 ジュツ1.5g・ブクリョウ1.5g・サイコ
 1.5g・センキュウ1.5g・ジオウ1.5g・カ
 ンゾウ1.0g・ポタンビ1.0g・サンシシ
 1.0g・ショウキョウ0.5g・ハッカ0.5g)
添加物 無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ス
 テアリン酸Mg、トウモロコシデンブ
効能 体力中等度以下で、皮ふがあれ
 てかさかさし、ときに色つやが悪く、胃
 腸障害はなく、肩がこり、疲れやすく
 精神不安やいらだちなどの精神神経症
 状、ときにかゆみ、便秘の傾向のある
 ものの次の諸症：しみ、冷え症、湿
 疹・皮ふ炎、虚弱体質、月経不順、月
 経困難、更年期障害、血の道症
用法・用量 成人(15才以上)1回6錠、7～14
 才1回4錠、5～6才1回3錠、1日3回、食
 前または食間に水または白湯で服用
製剤 淡黄褐色の錠剤
包装・価格 90錠 1,980円・252錠 4,980円

きょうせいほてきがん
響声破笛丸

エスタック漢方
「響声破笛丸料」エキス顆粒
 (エスエス製薬)
 満量処方
 のどの不快感・しわがれ声に

区分 第2類医薬品
成分 顆 3包(7.5g)中：
 響声破笛丸料水製乾燥エキス……………3.5g
 (レンギョウ・キキョウ・カンゾウ各
 2.5g・ダイオウ・シュクシャ・センキュ
 ウ・カシ各1g・アセンヤク2g・ハッカ
 4g)
添加物 乳糖、白糖、ステアリン酸Mg、ケイ
 ヒ油、L-メントール
効能 しわがれ声、咽喉不快
用法・用量 成人(15才以上)1回1包、7～14
 才1回½包、4～6才1回¼包、2～3才1
 回¼包、2才未満1回¼包。1日3回。食
 前又は食間に服用
製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 9包 1,680円☆
その他 製造販売 カーヤ

くふうげどくさん (とう)
驅風解毒散(湯)

**エスタック漢方
「驅風解毒湯」エキス顆粒**
(エスエス製薬)

満量処方 のどのはれ・痛
み・扁桃炎に

区分 第2類医薬品
成分 顆粒 3包(7.5g)中：
驅風解毒湯水製乾燥エキス…………… 4.1g
(ボウフウ・ゴボウシ・キキョウ各3g・
レンギョウ5g・ケイガイ・キョウカツ・
カンゾウ各1.5g・セッコウ10g)
添加物 乳糖，白糖，ステアリン酸Mg
効能 体力にかかわらず使用でき，のど
がはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎，
扁桃周囲炎
用法・用量 通常，成人(15才以上)1回1包，
7～14才1回 $\frac{3}{4}$ 包，4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包，2～
3才1回 $\frac{1}{4}$ 包，2才未満1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回。
食前又は食間に1包につきコップ約半
量の水又はぬるま湯に溶かし，うがい
をしながら少量ずつゆっくり服用
製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 9包 1,680円☆
その他 製造販売 カーヤ

しゃくやくかんぞうとう
芍薬甘草湯

コムレケア
(小林製薬)

足がつったときの“痛み”と
“こわばり”を治す

区分 第2類医薬品
成分 錠 12錠中：
芍薬甘草湯エキス…………… 2.4g
(シヤクヤク6g・カンゾウ6g)
添加物 ステアリン酸Mg，CMC，CMC-Na，
二酸化ケイ素，トウモロコシデンプン
効能 体力に関わらず使用でき，筋肉の
急激なけいれんを伴う痛みのあるもの
の次の諸症：こむらがえり，筋肉のけ
いれん，腹痛，腰痛
用法・用量 成人(15才以上)1回4錠，7～14
才1回2錠1日3回食前または食間に水ま
たは白湯で服用
製剤 淡褐色～褐色の錠剤
包装・価格 24錠 1,000円

しょうさいこうとう
小柴胡湯

**エスタック漢方
「小柴胡湯」エキス顆粒**
(エスエス製薬)

満量処方 かぜの後期の症
状・食欲不振・はきけ・胃痛に

区分 第2類医薬品
成分 顆粒 3包(7.5g)中：
小柴胡湯水製乾燥エキス…………… 3.3g
(サイコ7g・ハング5g・ショウキョウ
1g・オウゴン・タイソウ・ニンジン各
3g・カンゾウ2g)
添加物 乳糖，ステアリン酸Mg
効能 体力中等度で，ときに脇腹(腹)か
らみぞおちあたりにかけて苦しく，食
欲不振や口の苦味があり，舌に白苔が
つくものの次の諸症：食欲不振，吐き
気，胃炎，胃痛，胃腸虚弱，疲労感，
かぜの後期の諸症状
用法・用量 成人(15才以上)1回1包，7～14
才1回 $\frac{3}{4}$ 包，4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包，2～3才1
回 $\frac{1}{4}$ 包，2才未満1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回。食
前又は食間に服用
製剤 黄褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 9包 1,680円☆
その他 製造販売 カーヤ

しょうせいりゅうとう
小青竜湯

エスタック漢方
「小青竜湯」エキス顆粒
 (エスエス製薬)

滴量処方 かぜ・花粉症・
 アレルギー性鼻炎・鼻水に

区分 第2類医薬品
成分 顆粒 3包(7.5g)中：
 小青竜湯水製乾燥エキス……………3.6g
 (マオウ・シャクヤク・ショウキョウ・
 カンゾウ・ケイヒ・サイシン・ゴミシ各
 3g・ハンゲ6g)
添加物 乳糖，ステアリン酸Mg
効能 体力中等度又はやや虚弱で，うす
 い水様のたんを伴うせきや鼻水が出る
 もの次の諸症：気管支炎，気管支ぜん
 そく，鼻炎，アレルギー性鼻炎，む
 くみ，感冒，花粉症
用法・用量 成人(15才以上)1回1包，7～14
 才1回 $\frac{2}{3}$ 包，4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包，2～3才1
 回 $\frac{1}{3}$ 包，2才未満1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回。食
 前又は食間に服用
製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 9包 1,680円☆
その他 製造販売 カーヤ

ロート小青竜湯錠Ⅱ
 (ロート製薬)

1日2回タイプ。5才から服用
 できる

区分 第2類医薬品
成分 錠 8錠中：
 小青竜湯エキス……………1,950mg
 (マオウ1.5g・シャクヤク1.5g・カンキ
 ョウ1.5g・カンゾウ1.5g・ケイヒ1.5g・
 サイシン1.5g・ゴミシ1.5g・ハンゲ3.0g)
添加物 CMC-Ca，クロスCMC-Na，無水ケイ
 酸，ラウリル硫酸Na，ステアリン酸Mg，
 セルロース
効能 体力中等度又はやや虚弱で，うす
 い水様のたんを伴うせきや鼻水が出る
 もの次の諸症：気管支炎，気管支ぜん
 そく，鼻炎，アレルギー性鼻炎，む
 くみ，感冒，花粉症
用法・用量 成人(15才以上)1回4錠，7～14
 才1回3錠，5～6才1回2錠，1日2回食前
 又は食間に服用
製品特有の注意 本剤は天然物(生薬)のエ
 キスを用いているため，錠剤の色が多
 少異なることがある
製剤 淡褐色～褐色の素錠
包装・価格 42錠 1,350円

しんいせいはいとう
辛夷清肺湯

チクナイン錠
 (小林製薬)

つらい症状を楽にしながら，
 ちくのう症を改善していく

区分 第2類医薬品
成分 錠 10錠中：
 辛夷清肺湯エキス粉末……………2.5g
 (シンイ1.5g・オウゴン1.5g・セッコウ
 3.0g・チモ1.5g・サンシシ0.75g・ショウ
 マ0.75g・ビヤクゴウ1.5g・バクモンド
 ウ3.0g・ビワヨウ0.5g)
添加物 CMC-Ca，クロスCMC-Na，ステアリ
 ン酸Mg，タルク，二酸化ケイ素
効能 体力中等度以上で，濃い鼻汁が出
 て，ときに熱感を伴うもの次の諸
 症：鼻づまり，慢性鼻炎，蓄膿症(副
 鼻腔炎)
用法・用量 次の量を朝夕，食前または食
 間に水または白湯で服用する。成人
 (15才以上)1回5錠1日2回
製剤 淡褐色～淡黄褐色の錠剤
包装・価格 70錠 2,000円

せいじょうぼうふうとう
清上防風湯

漢方ニキビ薬N
「コタロー」
 (小太郎漢方製薬)

ニキビをカラダの中から治す
 漢方薬

区分 第2類医薬品
成分 錠 12錠中：
 清上防風湯(水製エキス)……………3.00g
 (ケイガイ0.75g・オウレン0.75g・ハッ
 カ0.50g・キジツ0.50g・カンゾウ0.50g・
 サンシシ0.75g・センキュウ1.25g・オウ
 ゴン1.25g・レンギョウ1.25g・ビヤクシ
 1.25g・キキョウ1.25g・ボウフウ1.25g)
添加物 カルメロースカルシウム，含水二酸化
 ケイ素，軽質無水ケイ酸，ステアリン酸マ
 グネシウム，トウモロコシデンプン
効能 にきび
用法・用量 成人(15才以上)1回4錠，7～14
 才1回3錠，1日3回。食前または食間に
 服用
製品特有の注意 生薬を原料としているの
 で，製品により多少色が異なることが
 ある
製剤 黄色～黄褐色の素錠
包装・価格 48錠 1,300円・144錠 3,000円

そけいかっけつとう
疎経活血湯

ラクーニSK錠
 (アサヒフードアンドヘルスケア)
 疎経活血湯という漢方処方に
 基づく医薬品

区分 第2類医薬品
成分 錠 15錠(1錠0.3g)中：
 疎経活血湯エキス……………2.9g
 (シャクヤク1.25g・ジオウ・センキュウ・ソウジュツ・トウキ・トニン・ブクリョウ各1.0g・イレイセン・キョウカツ・ゴシツ・チンピ・ボウイ・ボウフウ・リュウタン各0.75g・カンゾウ・ビヤクシ各0.50g・ショウキョウ0.25g)
添加物 クロスカルメロースナトリウム、クロスボピドン、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、バレイシヨデンブ
効能 体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：腰痛、関節痛、筋肉痛、神経痛
用法・用量 成人(15才以上)1回5錠を1日3回、食前又は食間に服用
製品特有の注意 天然の生薬を原料としているため、製品により錠剤の色調が多少異なる
製剤 淡褐色の素錠
包装・価格 210錠 3,500円

とうきしゃくやくさん
当归芍薬散

Asahi当归芍薬散錠
 (アサヒフードアンドヘルスケア)
 足腰の冷え・しみを改善する
 漢方薬

区分 第2類医薬品
成分 錠 18錠中：
 当归芍薬散料エキス……………1.85g
 (シャクヤク2.0g・センキュウ1.5g・タクシャ2.0g・トウキ1.5g・ビヤクジュツ2.0g・ブクリョウ2.0g)
添加物 軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、バレイシヨデンブ
効能 体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：足腰の冷え症、しみ、腰痛、むくみ、月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、しもやけ、耳鳴り
用法・用量 成人(15才以上)1回6錠を1日3回、食前又は食間に服用
製品特有の注意 天然の生薬を原料としているため、製品により錠剤の色調が多少異なる
製剤 淡灰褐色の素錠
包装・価格 252錠 1,980円・540錠 3,980円

どっかつかっこんとう
独活葛根湯

ロート独活葛根湯錠
 (ロート製薬)
 つらいガチガチ肩こりに

区分 第2類医薬品
成分 錠 12錠中：
 独活葛根湯エキス……………1,950mg
 (カッコン2.5g・ケイヒ1.5g・シャクヤク1.5g・マオウ1.0g・ドクカツ1.0g・シヨウキョウ0.25g・ジオウ2.0g・タイソウ0.5g・カンゾウ0.5g)
添加物 セルロース、CMC-Ca、クロスCMC-Na、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg
効能 体力中等度又はやや虚弱なもの次の諸症：四十肩、五十肩、寝ちがえ、肩こり
用法・用量 成人(15才以上)1回4錠を1日3回食前または食間に服用
製品特有の注意 本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある
製剤 灰茶褐色の錠剤
包装・価格 84錠 1,600円・252錠 3,800円

ばくもんどうとう
麦門冬湯

漢方せき止めトローチS
「麦門冬湯」
 (小太郎漢方製薬)
 麦門冬湯のトローチ剤

区分 第2類医薬品
成分 18錠中：
 麦門冬湯(水製エキス)……………4.50g
 (バクモンドウ5.0g・ハンゲ2.5g・コウ
 ベイ2.5g・タイソウ1.5g・ニンジン
 1.0g・カンゾウ1.0g)
添加物 β-シクロデキストリン，ステアリン
 酸マグネシウム，粉末還元麦芽糖水アメ，
 ポピドン，メタケイ酸アルミン酸マグネシ
 ウム，香料，L-メントール
効能 体力中等度以下で，たんが切れに
 くく，ときに強くせきこみ，又は咽頭
 の乾燥感があるものの次の諸症：から
 ぜき，気管支炎，気管支ぜんそく，咽
 頭炎，しわがれ声
用法・用量 成人(15才以上)及び7才以上1
 回2錠，5～6才1回1錠，1日3回。食間
 又は空腹時に1錠ずつ口中に含み，か
 まずにゆっくり溶かす
製剤 淡黄色～淡褐色のトローチ
包装・価格 18錠 1,500円

まおうとう
麻黄湯

コルゲンコーワ顆粒かぜ薬
 (興和)
 朝と夕1日2回の服用で効く。
 満量処方麻黄湯顆粒剤

区分 第2類医薬品
成分 顆粒 2包中：
 麻黄湯エキス……………1.92g
 (マオウ5.0g・ケイヒ4.0g・キョウニン
 5.0g・カンゾウ1.5g)
添加物 ケイ酸Al，ヒドロキシプロピルセルロ
 ース，ステアリン酸Mg，乳糖
効能 体力充実して，かぜのひきはじめ
 で，さむけがして発熱，頭痛があり，
 せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が
 出ていないものの次の諸症：感冒，鼻
 かぜ，気管支炎，鼻づまり
用法・用量 成人(15才以上)1回1包，7～14
 才1回 $\frac{2}{3}$ 包，4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包，2～3才1
 回 $\frac{1}{3}$ 包，1日2回朝夕，食前又は食間に
 そのまま水かお湯にて服用。またはお
 湯に溶かしてよくかき混ぜた後，温服
製品特有の注意 本剤には生薬が配合され
 ているので，製品により色が多少異なる
 ことがある
製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 6包 1,000円・10包 1,600円
その他 販売 興和新薬

麻黄湯エキス顆粒KM
 (分包)
 (エスエス製薬)
 満量処方 さむけ・発熱・
 ふしぶしの痛みのあるかぜに

区分 第2類医薬品
成分 顆粒 3包(7.5g)中：
 麻黄湯水製乾燥エキス……………1.75g
 (マオウ・キョウニン各5g・ケイヒ4g・
 カンゾウ1.5g)
添加物 乳糖，ステアリン酸Mg
効能 体力充実して，かぜのひきはじめ
 で，さむけがして発熱，頭痛があり，
 せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が
 出ていないものの次の諸症：感冒，鼻
 かぜ，気管支炎，鼻づまり
用法・用量 成人(15才以上)1回1包，7～14
 才1回 $\frac{2}{3}$ 包，4～6才1回 $\frac{1}{2}$ 包，2～3才1
 回 $\frac{1}{3}$ 包，2才未満1回 $\frac{1}{4}$ 包。1日3回食間
 に服用
製剤 淡褐色～褐色の顆粒剤
包装・価格 9包 1,680円☆
その他 製造販売 カーヤ

殺虫薬

水ではじめるバルサン
CPM
 (ライオン)
 3つの有効成分配合

区分 第2類医薬品
成分 煙 1筒中：
 メトキサジアゾン……………10%
 フェノトリン……………3%
 d・d-Tシフェノトリン……………1%
添加物 アジカルボンアミド，酸化亜鉛，ヒ
 プロメロース，ソルビタン脂肪酸エステル，
 ジブチルヒドロキシトルエン，香料，その
 他1成分
効能 ゴキブリ，屋内塵性ダニ類，イエ
 ダニ，ノミ，トコジラミ(ナンキンム
 シ)，ハエ成虫，蚊成虫の駆除
用法・用量 [12.5g] 6～8畳に1個
 [25g] 12～16畳に1個
製剤 くん煙剤
包装・価格 12.5g 880円・25g 1,380円

指定医薬部外品

(新指定医薬部外品・新範囲医薬部外品)

のど清涼剤

変称 ルルのど飴DXグレープ
ルルのど飴DXG
(第一三共ヘルスケア)

のどのあれ・痛み・はれ、
たんに6種の生薬が効く

成分 16粒中：

カンゾウエキス…………… 62.5mg
ショウキョウエキス…………… 29.13mg
オウヒエキス…………… 12mg
キキョウエキス…………… 200mg
シャゼンソウエキス…………… 76.93mg
セネガエキス…………… 10mg

添加物 グリセリン脂肪酸エステル、アセスル
ファミンK、塩化Na、コハク酸2Na、L-メン
トール、DL-リンゴ酸、還元水アメ、香料、
エタノール

効能 のどの炎症によるのどのあれ・の
どの痛み・声がれ・のどのはれ・のど
の不快感、たん

用法・用量 成人(15才以上)1回2粒を1日3
回口中に含み、かまずにゆっくり溶か
して服用

製剤 褐色のトローチ剤

包装・価格 12粒 350円☆

その他 製造販売 浅田飴

変称 ルルのど飴
はちみつレモン
ルルのど飴HL
(第一三共ヘルスケア)

4種の生薬がのどの痛み・
あれに効く

成分 16粒中：

カンゾウエキス…………… 62.5mg
ショウキョウエキス…………… 29.13mg
オウヒエキス…………… 12mg
キキョウエキス…………… 200mg

添加物 グリセリン脂肪酸エステル、アセスル

ファミンK、塩化Na、コハク酸2Na、L-メン
トール、DL-リンゴ酸、還元水アメ、レモ
ン油、香料、中鎖脂肪酸トリグリセリド

効能 のどの炎症によるのどのあれ・の
どの痛み・声がれ・のどのはれ・のど
の不快感、たん

用法・用量 成人(15才以上)1回2粒を1日3
回口中に含み、かまずにゆっくり溶か
して服用

製剤 褐色のトローチ剤

包装・価格 12粒 280円☆

その他 製造販売 浅田飴

含嗽薬

変称 ママはぐうがい薬p
<フルーツ味>

ロートうがい薬F
(ロート製薬)

お子様にも使いやすいフルー
ツ味のうがい薬。無色透明

成分 外液 1mL中：

塩化セチルピリジニウム…………… 5mg
グリチルリチン酸二カリウム…………… 5mg

添加物 グリセリン、L-メントール、サッカリ
ンNa、エタノール、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗
浄、口臭の除去

用法・用量 1回1プッシュ(約1mL)をコッ
プ半量(約100mL)の水に入れ、よく混
ぜてからうがいをする。1日数回行う

製剤 無色～微黄色澄明の液

包装・価格 150mL 850円

変称 ママはぐうがい薬p
<スイートフルーツ味>

ロートうがい薬S
(ロート製薬)

ノンメントールタイプ。スイ
ートフルーツ味。無色透明

成分 外液 1mL中：

塩化セチルピリジニウム…………… 5mg
グリチルリチン酸二カリウム…………… 5mg

添加物 グリセリン、サッカリンNa、エタノー
ル、香料

効能 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗
浄、口臭の除去

用法・用量 1回1プッシュ(約1mL)をコッ
プ半量(約100mL)の水に入れ、よく混
ぜてからうがいをする。1日数回行う

製剤 無色～微黄色澄明の液

包装・価格 150mL 850円

口腔咽喉薬

アサダアメガードドロップ MG

(浅田飴)

のどのあれ、痛みにCPC配合
シュガーレスドロップ剤

- 成分** 12粒中：
セチルピリジニウム塩化物水和物……6mg
- 添加物** 還元水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、グリチルリチン酸2K、アセスルファムK、DL-リンゴ酸、カラメル、D-ソルビトール、香料
- 効能** のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・のどのあれ・声がれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- 用法・用量** 成人(15才以上)及び5才以上の小児1回2粒。1日3～6回。1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまわずにゆっくり溶かす。2時間以上の間隔をおいて服用
- 製品特有の注意** 開封後長期になると、つやの消失、溶解等の変化があらわれることがある
- 製剤** 淡黄色のマンゴー味のドロップ剤
- 包装・価格** 24粒 350円

変種 ヴィックス
メディケイテッド
ドロップシュガーレス
グレープフルーツ

ヴィックスメディケイテッド
ドロップ GF
(大正製薬)

のどのあれ・痛み・声がれに

- 成分** 12個中：
セチルピリジニウム塩化物水和物……6.0mg
- 添加物** 還元水アメ、D-マンニトール、香料、緑色3号、黄色5号、シリコーン樹脂乳化液、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、クエン酸、L-メントール、タルク
- 効能** のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- 用法・用量** 成人(15才以上)及び5才以上の小児1回2個を1日3～6回。1個ずつ2個までを口中に含み、かまわずにゆっくり溶かす
- 製剤** 三角形板状の淡橙色のトローチ剤
- 包装・価格** 20個 400円

コルゲンコーワ
フレッシュトローチ

(興和)

のどの痛み・はれ等に。ノン
シュガー、スーッとする製剤

- 成分** 6個中：
セチルピリジニウム塩化物水和物……6.0mg
グリチルリチン酸二カリウム……15.0mg
キキョウ乾燥エキス……106.67mg
(キキョウとして480.0mg)
- 添加物** D-ソルビトール、ヒドロキシプロピルセルロース、アセスルファムK、黄色5号アルミニウムレーキ、L-メントール、二酸化ケイ素、香料、グリセリン脂肪酸エステル、デキストリン、ステアリン酸Mg
- 効能** のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ・のどのあれ、口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- 用法・用量** 成人(15才以上)1回1個、1日6回、小児(5～14才)1回1個、1日3回、口の中でかまわずにできるだけゆっくり溶かして用いる。使用間隔は2時間以上おく
- 製剤** 淡紅色のリング状のトローチ剤
- 包装・価格** 12個 500円
- その他** 販売 興和新薬

健胃清涼剤

液キャベコーワA

(興和)

健胃生薬8種がはきけ、二日
酔のむかつきに。ホロ苦風味

- 成分** 内液 1本(45mL)中：
オキソアミヂン末……30mg
コウジン乾燥エキス……40mg
(コウジンとして400mg)
ショウキョウ流エキス……1mL
(ショウキョウとして1,000mg)
センブリエキス……3mg
(センブリとして15mg)
リョウキョウ流エキス……0.3mL
(リョウキョウとして300mg)
ケイヒ油……2mg
ハッカ油……8mg
サンショウ軟エキス……30mg
(サンショウとして99mg)
グリチルリチン酸二カリウム……5mg
- 添加物** 白糖、スクラロース、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、バラベン、ポビドン、エタノール
- 効能** 食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)
- 用法・用量** 成人(15才以上)1日1回1本、食後又は食間に服用
- 製品特有の注意** 生薬成分配合のため、沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する
- 製剤** 褐色の液
- 包装・価格** 1本 368円☆
- その他** 製造販売 滋賀県製薬

液キャベコーワV

(興和)

ウコン配合で飲みすぎのはきけ・
二日酔のムカツキに。爽やか酸味

- 成分** 内液 1本(45mL)中：
ウコン流エキス……0.5mL
(ウコンとして500mg)
オキソアミヂン末……40mg
コウジン乾燥エキス……30mg
(コウジンとして300mg)
ショウキョウ流エキス……0.3mL
(ショウキョウとして300mg)
ウイキョウ油……1mg
チョウジ油……1mg
ハッカ油……8mg
チアミン硝化物……10mg
- 添加物** 白糖、スクラロース、クエン酸、DL-リンゴ酸、クエン酸Na、安息香酸Na、バラ

ベン、ホビドン、エタノール

効能 食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本、食後又は食間に服用

製品特有の注意 生薬成分配合のため、沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する

製剤 褐色の液

包装・価格 1本 399円☆

その他 製造販売 滋賀県製薬

キャベ2コーワドリンク
(興和)

食事前服用で健胃生薬が二日酔・むかつきに。ウメ風味

成分 内液 1本(45mL)中：
 ウコン流エキス…………… 0.3mL
 (ウコンとして300mg)
 ショウキョウ流エキス…………… 0.4mL
 (ショウキョウとして400mg)
 ソヨウ流エキス…………… 0.2mL
 (ソヨウとして200mg)
 ケイヒ油……………1.2mg
 ハッカ油……………5.4mg
 カルニチン塩化物…………… 110mg
 カンゾウエキス…………… 40mg
 (カンゾウとして160mg)

添加物 白糖、スクラロース、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、アルギン酸プロピレングリコールエステル、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン、エチルバニリン、ビタミンE

効能 食べ過ぎ(過食)又は飲み過ぎ(過飲)による胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本、食前に服用

製品特有の注意 生薬成分配合のため、沈殿を生じることがある。よく振ってから服用する

製剤 褐色の液

包装・価格 1本 315円☆

その他 製造販売 滋賀県製薬

外皮消毒剤

**コルゲンコーワ
手とゆびの消毒ジェル**
(興和)

かぜ等の原因になるバイ菌対策に。3つの保湿成分配合

成分 外液 1mL中：
 ベンザルコニウム塩化物……………0.5mg

添加物 エタノール、グリセリン、ヒアルロン酸Na、アロエ、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量を手指にとり、塗布又は塗擦

製剤 無色透明～わずかに混濁した粘稠な液体

包装・価格 300mL 1,100円

その他 販売 興和新薬

**ミューズ
消毒ハンドジェル**
ハンドジェル K
(レキットベンキーザー・ジャパン)

水なしですばやく洗浄・消毒

成分 外液：
 エタノール…………… 76.9～81.4vol%

添加物 精製水、グリセリン、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、香料、ヒアルロン酸ナトリウム

効能 手指・皮膚の洗浄・消毒

用法・用量 適量をとり、手指・皮膚に塗布又は塗擦する

製剤 無色のジェル、特異なにおい

包装・価格 50mL 548円☆・200mL 898円☆

その他 販売 アース製薬

きず消毒保護剤

リバンウェットバン
(玉川衛材)

消毒薬アクリノール液含有パッド付き絆創膏

成分 絆 パッド100g中：
 アクリノール水和物…………… 625mg

添加物 濃グリセリン

効能 切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の消毒・保護(被覆)

用法・用量 アルミ袋を開封し、粘着シートのセパレーター(剥離紙)をはがし、パッドを傷口にあて貼り付ける

製品特有の注意 薬液がもれることがあるので、粘着シートはシワにならないよう注意して貼ること。薬液が服に付くと落としにくいので注意すること。1日1回貼りかえること

製剤 黄色の薬液付ウェット絆創膏

包装・価格 S5枚 450円・S10枚 750円・M5枚 750円・L3枚 750円

ビタミン含有保健剤

キューピーコーワミノV
(興和)

肉体疲労時の栄養補給, 滋養強壮に

成分 錠2錠中:
L-アルギニン塩酸塩……………50.0mg
L-バリン……………12.0mg
L-ロイシン……………24.0mg
L-イソロイシン……………12.0mg
オキソアミダゼン末……………50.0mg
チアミン硝酸化物(V.B₁)……………10.0mg
リボフラビン(V.B₂)……………4.0mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)……………5.0mg
ニコチン酸アミド……………12.0mg
L-アスコルビン酸ナトリウム…112.6mg
(L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)

トコフェロールコハク酸
エステルカルシウム……………20.7mg
(dl- α -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20.0mg)

無水カフェイン……………50.0mg

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース, セルロース, クロスボビドン, ケイ酸Ca, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, 白糖, 炭酸Ca, タルク, アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体, ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル, 黄色五号, マクロゴール, カルナウバロウ

効能 滋養強壮, 虚弱体質, 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日1回服用

製品特有の注意 本剤の服用により尿が黄色くなることもある

製剤 黄赤色の糖衣錠

包装・価格 2錠 95円

その他 販売 興和新薬

キューピーコーワ
ヒーリング
(興和)

肉体疲労時の栄養補給, 滋養強壮に

成分 錠2錠中:
エゾウコギ乾燥エキス……………8.0mg
(原生薬換算量: 200.0mg)
カルニチン塩化物……………50.0mg
ガンマ-オリザノール……………10.0mg
オキソアミダゼン末……………50.0mg
チアミン硝酸化物(V.B₁)……………10.0mg

リボフラビン(V.B₂)……………4.0mg
ピリドキシン塩酸塩(V.B₆)……………5.0mg
ニコチン酸アミド……………12.0mg
L-アスコルビン酸ナトリウム…112.6mg
(L-アスコルビン酸(V.C)として100.0mg)

トコフェロールコハク酸
エステルカルシウム……………20.7mg
(dl- α -トコフェロールコハク酸エステル(V.E)として20.0mg)

添加物 ヒドロキシプロピルセルロース, セルロース, クロスボビドン, ステアリン酸Mg, ヒプロメロース, 白糖, 炭酸Ca, タルク, アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体, ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル, 赤色三号, 赤色一〇六号, 黄色五号, マクロゴール, カルナウバロウ

効能 滋養強壮, 虚弱体質, 肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1回2錠, 1日1回服用

製品特有の注意 本剤の服用により尿が黄色くなることもある

製剤 赤色の糖衣錠

包装・価格 2錠 95円

その他 販売 興和新薬

ゼナF0-I α
(大正製薬)

つらい疲れに

成分 内液1本(50mL)中:
ムイラブアマエキス-A……………15mg
(ムイラブアマ300mgに相当)
ニンジン(人参)エキスM……………90mg
(人参600mgに相当)
ニクジュヨウ(肉蓯蓉)エキス…75.8mg
(肉蓯蓉250mgに相当)
シャクヤク(芍薬)エキス……………30mg
(芍薬120mgに相当)
カンゾウ(甘草)エキス……………50mg
(甘草200mgに相当)

ケイヒ(桂皮)流エキス……………0.15mL
(桂皮150mgに相当)
ショウキョウ(生姜)流エキス…0.3mL
(生姜300mgに相当)

タウリン……………500mg
リボフラビンリン酸エステル

ナトリウム(ビタミンB₂)……………5mg
ピリドキシン塩酸塩

(ビタミンB₆)……………5mg
トコフェロール酢酸エステル

(ビタミンE)……………50mg
ニコチン酸アミド……………20mg

無水カフェイン……………50mg
(アルコール……………0.17mL以下)

添加物 白糖, 還元麦芽糖水アム, クエン酸, クエン酸Na, ボビドン, グリセリン脂肪酸エステル, ポリオキシエチレン硬化ヒマシ

油, グリセリン, 安息香酸Na, 香料, アルコール

効能 滋養強壮, 虚弱体質, 肉体疲労・発熱性消耗性疾患・食欲不振・病中病後・栄養障害・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本(50mL)を服用

製品特有の注意 服用により尿が黄色になることがある。生薬成分を含むため, まれに沈でんを生じることがある

製剤 黄褐色の液

包装・価格 50mL 500円

変種 ルル滋養内服液
ローヤル

DS滋養内服液X1
(第一三共ヘルスケア)

8種の生薬, 4種のビタミンと
ローヤルゼリーを配合

成分 内液1本(45mL)中:
ビタミンB₁硝酸塩……………10mg
ビタミンB₂リン酸エステル……………12mg
ビタミンB₆……………10mg
ニコチン酸アミド……………20mg
ニンジンエキス……………270.3mg
(人参3,000mgに相当)

タイソウエキス……………150mg
(大棗750mgに相当)

ケイヒエキス……………6.75mg
(桂皮150mgに相当)

シャクヤクエキス……………30mg
(芍薬120mgに相当)

ショウキョウエキス……………97mg
(生姜1000mgに相当)

チンピエキス……………20mg
(陳皮100mgに相当)

トウキエキス……………60mg
(当帰200mgに相当)

ローヤルゼリー抽出液……………350mg
(ローヤルゼリー350mgに相当)

(アルコール……………0.44mL以下)

添加物 ハチミツ, 白糖, D-ソルビトール, クエン酸, DL-リンゴ酸, クエン酸Na, 安息香酸Na, カラメル, 香料, アルコール, プロピレングリコール, バニリン

効能 発熱性消耗性疾患・病中病後・食欲不振・肉体疲労・栄養障害・産前産後などの場合の栄養補給, 虚弱体質, 滋養強壮

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本(45mL)を服用

製剤 黄褐色の液体

包装・価格 45mL 999円☆

その他 製造販売 田村薬品工業

ビタミンを含有する保健薬

リポビタミンFB

(大正製薬)

疲れた時の栄養補給に
カルニチン塩化物300mg配合

成分 内液 1本(100mL)中：

タウリン……………1,000mg
カルニチン塩化物……………300mg
イノシトール……………200mg
チアミン硝化物(ビタミンB₁)……………5mg
リポフラビンリン酸エステル
ナトリウム(ビタミンB₂)……………10mg
ピリドキシン塩酸塩
(ビタミンB₆)……………5mg
ニコチン酸アミド……………30mg
無水カフェイン……………50mg

添加物 白糖, D-ソルビトール, スクラロース,
アセスルファムK, クエン酸, クエン酸Na,
安息香酸Na, 香料, グリセリン, バニリン

効能 肉体疲労・病中病後・食欲不振・
栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授
乳期などの場合の栄養補給。滋養強壯。
虚弱体質

用法・用量 成人(15才以上)1日1回1本
(100mL)を服用

製品特有の注意 服用により尿が黄色にな
ることがある

製剤 黄色の液

包装・価格 100mL 190円