

先発・代表薬でさがす ジェネリック医薬品リスト 平成 24 年 8 月版 訂正のお知らせ

2012 年 8 月 14 日

ご購入いただきました【先発・代表薬でさがす ジェネリック医薬品リスト 平成 24 年 8 月版】(2012 年 8 月初版第 1 刷)におきまして以下の誤りがございました。恐れ入りますが赤字部分を追記・訂正くださいますようお願い申し上げます。

適応・用法欄 (本文 p.153 中段上)

パキシル (1179i 精神神経用剤/その他)

【適応】パキシル CR うつ病・うつ状態。その他 ①うつ病・うつ状態。②パニック障害。③強迫性障害。④社会不安障害。⇒ (④はパキシル錠のみ)

【用法】パキシル CR 初期量 1 日 1 回 12.5mg, 夕食後。その後 1 週間以上かけて 1 日 25mg に増量。1 日 50mg まで。いずれも 1 日 1 回 夕食後。増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日 12.5mg ずつ。その他 ①1 日 1 回 20~40mg, 夕食後。1 回 10~20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。②1 日 1 回 30mg, 夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 30mg まで。③1 日 1 回 40mg, 夕食後。1 回 20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 50mg まで。④1 日 1 回 20mg, 夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。

剤形・規格単位欄

(本文 p.383 上段) アズノール ST (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) クリーム 5mg1 錠 → (正) トロチ 5mg1 錠

(本文 p.395 上段) S P (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) クリーム 0.25mg1 錠 → (正) トロチ 0.25mg1 錠

(本文 p.415 上段) スプロール (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) クリーム 2mg1 錠 → (正) トロチ 2mg1 錠

商品備考欄 (本文 p.423 中段)

トプシム (2646 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤/副腎皮質ホルモン製剤)

トプシムクリーム 0.05% (誤) O/W 型 → (正) FAPG 基剤

トプシム E クリーム 0.05% (誤) W/O 型 → (正) O/W 型乳剤性基剤

後発除外品目 本文参照ページ (付録 p.1 下から 6 行目)

ソルデム 3PG 輸液 (誤) 295 → (正) 296