

保険薬事典 Plus+ 平成 24 年 8 月版
訂正のお知らせ

2012 年 8 月 14 日

ご購入いただきました【保険薬事典 Plus+ 平成 24 年 8 月版】(2012 年 8 月初版第 1 刷)におきまして以下の誤りがございました。

恐れ入りますが赤字部分を追記・訂正くださいますようお願い申し上げます。

適応・用法欄 (本文 p.52 中段下)

パロキセチン塩酸塩水和物 (1179i 精神神経用剤/その他)

【適応】〔パキシル CR〕 うつ病・うつ状態。〔その他〕 ①うつ病・うつ状態。②パニック障害。③強迫性障害。④社会不安障害。⇒ (④はパキシル錠のみ)

【用法】〔パキシル CR〕 初期量 1 日 1 回 12.5mg, 夕食後。その後 1 週間以上かけて 1 日 25mg に増量。1 日 50mg まで。いずれも 1 日 1 回夕食後。増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日 12.5mg ずつ。〔その他〕 ①1 日 1 回 20~40mg, 夕食後。1 回 10~20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。②1 日 1 回 30mg, 夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 30mg まで。③1 日 1 回 40mg, 夕食後。1 回 20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 50mg まで。④1 日 1 回 20mg, 夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。