

2013年5月27日

ご購入いただきました【日本医薬品集 医療薬 2013年版】(2012年8月発行)におきまして以下の誤りがございました。

ここに訂正させていただくとともにお詫び申し上げます。


訂正箇所: (メロペナム水和物) p.2944 ※2012年版:p.2874

用法・用量欄 効能①: 一般感染症に関する記載

【誤】

(1)成人: 1日0.5~1g(力価)を2~3回に分け、30分以上かけて点滴静注(適宜増減)。重症・難治性感染症には、1回1g(力価)を上限として1日3g(力価)まで増量することができる

(2)小児: 1日30~60mg(力価)/kgを3回に分け、30分以上かけて点滴静注(適宜増減)。重症・難治性感染症には、1日120mg(力価)/kgまで増量することができる。ただし、成人1日最大用量3g(力価)を超えない



【正】(赤下線部を追記)

(1)成人: 1日0.5~1g(力価)を2~3回に分け、30分以上かけて点滴静注(適宜増減)。重症・難治性感染症には、〔メロペン〕1回1g(力価)を上限として1日3g(力価)まで、〔メロペンを除く〕1日2g(力価)まで増量することができる

(2)小児: 1日30~60mg(力価)/kgを3回に分け、30分以上かけて点滴静注(適宜増減)。重症・難治性感染症には、1日120mg(力価)/kgまで増量することができる。ただし、成人1日最大用量〔メロペン〕3g(力価)、〔メロペンを除く〕2g(力価)を超えない


ページ	商品名（会社名）	コード（誤）	コード（正）
付録 50	ロラタジン OD 錠 10mg「ファイザー」（ファイザー）	D 10 : PF	D 10 : LR
付録 54	ロラタジン OD 錠 10mg「ファイザー」（ファイザー）	* PF D10 	* LR D10 

(赤字が訂正部分)

訂正箇所:(プラナルカスト水和物) p.2432 下から 16 行目 **効能・効果** 欄

【誤】

効能・効果 ①気管支喘息 ②アレルギー性鼻炎



【正】(赤下線部を追記)

効能・効果 ①気管支喘息 ②アレルギー性鼻炎
 * 効能②は錠 , 力 , オノンドライシロップ 10%のみ