

一般名でさがす ジェネリック医薬品便覧 平成 24 年 8 月版 訂正のお知らせ

2012 年 8 月 14 日

ご購入いただきました【一般名でさがす ジェネリック医薬品リスト 平成 24 年 8 月版】
(2012 年 8 月初版第 1 刷)におきまして以下の誤りがございました。
恐れ入りますが赤字部分を追記・訂正くださいますようお願い申し上げます。

適応・用法欄 (本文 p.146 中段)

般パロキセチン塩酸塩水和物 (1179i 精神神経用剤/その他)

【適応】**〔パキシル CR〕** うつ病・うつ状態。**〔その他〕** ①うつ病・うつ状態。②パニック障害。③
強迫性障害。④社会不安障害。⇒ (④はパキシル錠のみ)

【用法】**〔パキシル CR〕** 初期量 1 日 1 回 12.5mg, 夕食後。その後 1 週間以上かけて 1 日 25mg に
増量。1 日 50mg まで。いずれも 1 日 1 回 夕食後。増量は 1 週間以上の間隔をあけて 1 日 12.5mg
ずつ。**〔その他〕** ①1 日 1 回 20~40mg, 夕食後。1 回 10~20mg より開始, 原則として 1 週ご
とに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。②1 日 1 回 30mg, 夕食後。1 回 10mg より開始,
原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 30mg まで。③1 日 1 回 40mg, 夕食後。1 回
20mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 50mg まで。④1 日 1 回 20mg,
夕食後。1 回 10mg より開始, 原則として 1 週ごとに 10mg/日ずつ増量。1 日 40mg まで。

剤形・規格単位欄

(本文 p.233 下段) **般**アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) **クリム** 5mg1 錠 → (正) **トロチ** 5mg1 錠

(本文 p.263 中段上) **般**セチルピリジニウム塩化物水和物 (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) **クリム** 2mg1 錠 → (正) **トロチ** 2mg1 錠

(本文 p.267 中段上) **般**デカリニウム塩化物 (2399i その他の消化器官用薬/その他)

(誤) **クリム** 0.25mg1 錠 → (正) **トロチ** 0.25mg1 錠

(本文 p.286 中段上) **般**フルルビプロフェン (2649i 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤/その他)

ヤクバンテープ 60mg に対し「**貼付剤** (2)15cm×14cm1 枚」を追加。

(誤) **貼付剤**(2)10cm×14cm1 枚
(**般**)フルルビプロフェンテープ 40mg (10×14cm 非温感) 品番: 2649732SBZZZ
21.30 **錠** ヤクバンテープ 40mg (トクホン=科研=田辺三菱)
18.60 **錠** ゼボラステープ 40mg (三笠)
13.90 **錠** ファルケンテープ 40mg (祐徳)
○ **錠** フループテープ 40 (救急=ピオメディクス)
27.60 **錠** ヤクバンテープ 60mg (トクホン=科研=田辺三菱)

(正) **貼付剤**(2)10cm×14cm1 枚
(**般**)フルルビプロフェンテープ 40mg (10×14cm 非温感) 品番: 2649732SBZZZ
21.30 **錠** ヤクバンテープ 40mg (トクホン=科研=田辺三菱)
18.60 **錠** ゼボラステープ 40mg (三笠)
13.90 **錠** ファルケンテープ 40mg (祐徳)
○ **錠** フループテープ 40 (救急=ピオメディクス)
貼付剤(2)15cm×14cm1 枚
27.60 **錠** ヤクバンテープ 60mg (トクホン=科研=田辺三菱)

商品備考欄 (本文 p.283 下段)

般フルオシノニド (2646 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤/副腎皮質ホルモン製剤)

トプシムクリーム 0.05% (誤) O/W 型 → (正) **FAPG 基剤**
トプシム E クリーム 0.05% (誤) W/O 型 → (正) **O/W 型乳剤性基剤**