

【がん化学療法ワークシート 第4版】

訂正のお知らせ

2013年1月17日

ご購入いただきました【がん化学療法ワークシート 第4版】（2012年7月15日発行）におきまして、以下の誤りがございました。

ここに訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

目次ページ 16ページ目

誤	
上から 9行目	Side memo 6 バクリタキセル化 敏捷 に対する新しい考え方とペミロラストの 予防効果.....301



正	
上から 9行目	Side memo 6 バクリタキセル 過敏症 に対する新しい考え方とペミロラストの 予防効果.....301

287ページ 図




図 低温知覚異常を引き起こすメカニズム® (→7)

付録CD
 *書籍本文
 68ページ

ファイル：「処方チェック・副作用モニタリングシート」内
 タイトル：TS-1・CDDP療法 胃がん

図6-1・6-2・6-3の3つの図が入るところ、図6-3のみ欠落のため、
 下記にPDFを用意しました。なお、図のみをダウンロードご希望の方は、
 別途「訂正情報」にデータをアップしております。

殿		TS-1・CDDP療法 () クール目														1/3
cm m ² (/)	kg 測定	前日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TS-1	p.56別表1参照															
CDDP	60mg/m ²															
G-CSF ()																
処方薬 (規格) 用法・用量																
自覚所見																
食欲不振																
★悪心・嘔吐																
口内炎																
末梢神経障害																
下痢																
脱毛																
色素沈着																
その他																
他覚所見 (検査値)																
★骨髄抑制	WBC (白血球)															
	NEUT (好中球)															
	Hb (ヘモグロビン)															
	PLT (血小板)															
感染症	CRP															
	発熱 (≥37.5℃)															
肝障害	AST															
	ALT															
	γ-GTP															
★腎障害	BUN															
	Cr															
	Cr (mL/min)															
その他																
投与前チェック		指導内容・その他														
・腎機能障害 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 →TS-1投与量調節 →CDDP投与量調節 ・肝機能障害 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 →TS-1投与量調節		<input type="checkbox"/> 併用禁忌薬がないことを確認 (/) フッ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、フッ化ピリミジン系抗真菌剤 が投与中でないこと、または中止後少なくとも7日以上経過して いること <input type="checkbox"/> 制吐薬が処方されていることを確認 (/) <input type="checkbox"/> 腎障害予防のために水分を摂取するよう説明 (/) <input type="checkbox"/> 腎障害予防のために必要量の輸液が、処方されているこ とを確認 (/)														

★：用量規制因子 □：抗がん剤投与日 □：注意 ■：特に注意

図6-1 処方チェック・副作用モニタリングシート (TS-1・CDDP療法)

殿		TS-1・CDDP療法 () クール目														2/3
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
TS-1	p.56別表1参照	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
G-CSF ()																
処方薬 (規格) 用法・用量																
自覚所見																
食欲不振																
★悪心・嘔吐																
口内炎																
末梢神経障害																
下痢																
脱毛																
色素沈着																
その他																
他覚所見 (検査値)																
★骨髄抑制	WBC (白血球)															
	NEUT (好中球)															
	Hb (ヘモグロビン)															
	PLT (血小板)															
感染症	CRP															
	発熱 (≥37.5℃)															
肝障害	AST															
	ALT															
	γ-GTP															
★腎障害	BUN															
	Cr															
	Cr (mL/min)															
その他																
投与前チェック		<input type="checkbox"/> 脱毛はほとんどの場合、半年~1年で回復することを説明 (/) <input type="checkbox"/> 感染予防のための含嗽方法を説明 (/) <input type="checkbox"/> G-CSF製剤投与時はその作用と副作用の説明 (/)														
		<input type="checkbox"/> 適切に含嗽できていることを確認 (/) <input type="checkbox"/> G-CSF製剤投与時はその作用と副作用の説明 (/)														

★：用量規制因子 □：抗がん剤投与日 □：注意 ■：特に注意

図6-2 処方チェック・副作用モニタリングシート (TS-1・CDDP療法)

殿		TS-1・CDDP療法 () クール目														3/3
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
G-CSF ()																
処方薬 (規格) 用法・用量																
自覚所見																
食欲不振																
★悪心・嘔吐																
口内炎																
末梢神経障害																
下痢																
脱毛																
色素沈着																
その他																
他覚所見 (検査値)																
★骨髄抑制	WBC (白血球)															
	NEUT (好中球)															
	Hb (ヘモグロビン)															
	PLT (血小板)															
感染症	CRP															
	発熱 (≧37.5℃)															
肝障害	AST															
	ALT															
	γ-GTP															
★腎障害	BUN															
	Cr															
	Cr _{cl} (mL/min)															
その他																
投与前チェック		指導内容・その他														
		<input type="checkbox"/> 感染のリスクが軽減したことを説明 (/)														

★：用量規制因子 □：抗がん剤投与日 □：注意
 ■：特に注意

図6-3 処方チェック・副作用モニタリングシート (TS-1・CDDP療法)