

『内服薬 経管投与ハンドブック 第3版』訂正のお知らせ

ご購入いただきました「内服薬 経管投与ハンドブック第3版」（2015年3月発行／第1刷、第2刷、第3刷、第4刷）におきまして以下の誤りがございました。

この訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

2018年12月5日

正誤表

・ファロム錠 200mg（マルホ） P469

誤							正						
適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水		粉碎 脱 _カ	適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水		粉碎 脱 _カ
		5分	10分	5分	10分				5分	10分			
不適		×	×	×	×	可	不適		×	×	×	×	不可



2018年7月24日

正誤表

（第1刷、第2刷、第3刷）

・アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」(日医工) P122・P657

誤						正					
適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水		適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分			5分	10分		
適1	8Fr.	○				適2	8Fr.	×	×	×	○



2016年3月14日

正誤表

（第1刷、第2刷）

・アルファカルシドールカプセル0.25 μg・0.5 μg・1 μg「タイヨー」(テバ製薬) P141・P817

誤						正					
適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水		適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分			5分	10分		
不適	8Fr.	×	×			不適		×	×		



・ドンペリドン錠5mg「日医工」(日医工) P411・P800


誤						正					
適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水		適否	最小通過 サイズ	水（約55℃）		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分			5分	10分		
適1	×	○				適1	8Fr.	×	○		



・ネクサバル錠200mg(バイエル) P425・P864

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適		○			




正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適		×			

・バイアスピリン錠100mg(バイエル) P429・P831

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適3 条1		×	×	○	



正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適3	8Fr.	×	×	○	

・メチコバイト錠500 μg(ダイト=扶桑) P545・P821

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適1	-	○			



正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適1	8Fr.	○			

・ランソプラゾールカプセル15mg「ケミファ」(シオノ=ケミファ) P575・P790

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適		×	×	×	○



正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適		×	×	×	×

・ランソプラゾールカプセル30mg「アメル」(共和薬品=興和ジェネリック) P577・P790

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適	14Fr.	×	×	×	-



正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適		×	×	×	-

・ロサルタンK錠25mg・50mg・100mg「タカタ」(高田) P611・P613・P733・P734・P735

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適1	8Fr.	×	○		



正


適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適2	8Fr.	×	×	×	○

(第1刷のみ)

・レボフロキサシン粒状錠 500mg「モチダ」(持田) P605・P908

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適1	8Fr.	×	○		




正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適2	8Fr.	×	×	○	

・テオロン錠50mg(エーザイ) P373・P768

誤

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
適1	8Fr.	○			



正

適否	最小通過 サイズ	水(約55°C)		破壊→水	
		5分	10分	5分	10分
不適		-			

・P93 上から3行目

誤 ○:投与困難 ⇒ 正 ×:投与困難