

## 「がん患者の精神症状はこう診る 向精神薬はこう使う」訂正のお知らせ

ご購入いただきました「がん患者の精神症状はこう診る 向精神薬はこう使う」の第1刷（2015年6月発行）、第2刷（2015年10月発行）、および第3刷（2016年6月20日）におきまして以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

2016年6月20日

### 【正誤表】

| 刷り数               | 頁   | 訂正箇所                | 誤   | 正   |
|-------------------|-----|---------------------|---|---|
| 第1刷               | 97  | 下から10行目<br>(囲み内1行目) | ▪ 解力・判断力の…  | ▪ <b>理</b> 解力・判断力の…   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 142 | 表1 成分名<br>上から5行目    | リスマザホン  | リ <b>ル</b> マザホン   |
| 第1刷               | 149 | 下から1行目              | (エスケレ <sup>®</sup> 座剤)                                      | (エスケレ <sup>®</sup> <b>坐</b> 剤)                              |
| 第1刷               | 256 | 上から4行目              | …高い患者でした。   | …高い患者 <b>さん</b> でした。  |
| 第1刷               | 257 | 上から1行目              | …であることを患者と共有  | …であることを患者 <b>さん</b> と共有                                     |
| 第1刷<br>第2刷        | 304 | 下から4行目<br>(処方例3剤目)  | トラゾドン(デジレル <sup>®</sup> , レスリン <sup>®</sup> )錠 <u>15</u> mg | トラゾドン(デジレル <sup>®</sup> , レスリン <sup>®</sup> )錠 <b>25</b> mg |
| 第1刷               | 421 | 下から20行目             | ——薬剤…128, 183,<br>221, 228, 275, <u>000</u>                 | ——薬剤…128, 183,<br>221, 228, 275, <b>297</b>                 |
| 第1刷               | 422 | 上から14行目             | 無症候てんかん…  | 無症候 <b>性</b> てんかん…  |