

『がん専門・認定薬剤師のための がん必須ポイント 第3版』  
訂正のお知らせ

ご購入いただきました『がん専門・認定薬剤師のための がん必須ポイント 第3版』(2016年1月発行 第1刷、第2刷、第3刷)におきまして、以下の誤りがございました。  
ここに訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。

2017年1月18日

【 正 誤 表 】

頁	訂正箇所	誤	正
59頁	エリブリンの項(下から2行目) (※第2刷以降は訂正済)	溶解液は生理食塩液を使用し、 <b>0.02mg/mL</b> 未満の濃度に希釈しない。	溶解液は生理食塩液を使用し、 <b>0.01mg/mL</b> 未満の濃度に希釈しない。
111頁	下から3行目 (※第3刷は訂正済)	・ <b>手術</b> 不能な局所進行がんに対して.....	・ <b>切除</b> 不能な局所進行がんに対して.....
113頁	例題 2.	2. 大腸がん、胃がんでは <b>術前</b> 補助化学療法が有効とされている。	2. 大腸がん、胃がんでは <b>術後</b> 補助化学療法が有効とされている。
261頁	例題《治療》1. (※第2刷以降は訂正済)	1. 胃がんにおけるTNM分類でT3, N1は <b>stage III</b> であり、定型手術が一般に行われる。	1. 胃がんにおけるTNM分類でT3, N1は <b>stage II B</b> であり、定型手術が一般に行われる。
389頁	例題 A 5. (※第2刷以降は訂正済)	5. TNM分類のTの評価には、腫瘍の厚さが用いられる。 <b>厚さが2mmを超えるものはすべてII期に分類される。</b>	5. TNM分類のTの評価には、腫瘍の厚さが用いられる。 <b>厚さが1mmを超え、2mm以下であればすべてI B期に分類される。</b>
390頁	解答 例題 A <解説> 5. (※第2刷以降は訂正済)	5. <b>厚さが2mm以下でも</b> 、潰瘍があればII A期となる。	5. <b>厚さが1mmを超え、2mm以下でも</b> 、潰瘍があればII A期となる。