

保険薬事典 Plus⁺ 平成 28 年 4 月版 訂正のお知らせ

2016 年 4 月 11 日

ご購入いただきました【保険薬事典 Plus⁺ 平成 28 年 4 月版】(2016 年 3 月初版第 1 刷) におきまして以下の誤りがございました。
ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

シプロフロキサシンの用法欄 (本文 p.727 上段)

(誤)

【用法】〔成人〕 1 回 300mg, 1 日 2 回, 1 時間かけ点滴静注。30 分以内の点滴静注は避ける。。

〔小児〕 ①炭疽 1 回 10mg/kg, 1 日 2 回, 1 時間かけて点滴静注。その他 1 回 6~10mg/kg, 1 日 3 回, 1 時間かけて点滴静注。②1 回 10mg/kg, 1 日 3 回, 1 時間かけて点滴静注。以上, 小児は成人の 1 回量 400mg まで。

(正)

【用法】〔成人〕 シプロキサシ注 200mg・同注 400mg, シプロフロキサシン点滴静注 200mg/100mL 「明治」・同点滴静注液 200mg 「タイヨー」「日医工」 1 回 400mg, 1 日 2 回, 1 時間かけて点滴静注。状態により 1 日 3 回に増量可。その他 1 回 300mg, 1 日 2 回, 1 時間かけ点滴静注。30 分以内の点滴静注は避ける。〔小児〕 ①炭疽 1 回 10mg/kg, 1 日 2 回, 1 時間かけて点滴静注。その他 1 回 6~10mg/kg, 1 日 3 回, 1 時間かけて点滴静注。②1 回 10mg/kg, 1 日 3 回, 1 時間かけて点滴静注。以上, 小児は成人の 1 回量 400mg まで。

※4/11 現在。各品目の用法追加・変更につきましては最新の添付文書をご確認ください。