

『モデル・コアカリキュラムに沿った わかりやすい薬局実務実習テキスト 第5版』  
訂正のお知らせ

ご購入いただきました『モデル・コアカリキュラムに沿った わかりやすい薬局実務実習テキスト 第5版』（2016年8月発行）におきまして、以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

2017年3月29日

【正誤表】

頁	内容
071 頁 CASE8	<p>No.2 と No.3 の「ここがポイント！」の内容が逆になっておりましたので、以下のように訂正いたします。</p> <p>No.2 内分泌科.....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Rp ティーエスワン配合カプセル T25 1回2カプセル（1日4カプセル） 1日2回 朝夕食後 35日分</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><del>ここがポイント！</del>…用法は正しいかどうか</p> <p>抗がん薬の中には、休薬期間を必ずとる薬が多くある。ティーエスワン配合カプセル（テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合カプセル剤）は、一般的には28日分服用後14日休薬する薬である。</p> </div> </div> <p>No.3 外科.....</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Rp エバデール S900 1回1包（1日2包） 1日2回 朝夕食後 28日分</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p><del>ここがポイント！</del>…休薬期間は正しくとられているか</p> <p>用法が適切でない場合、十分な効果が発揮できないので疑義照会の必要がある。脂質異常症治療薬のエバデールS（一般名：イコサペント酸エチル）は食事の直後、つまり食直後服用にて、成分の吸収が低下しないようにすることができる。</p> </div> </div>