

【治療薬ハンドブック 2018 ー薬剤選択と処方のポイントー】 訂正のお知らせ

ご購入いただきました【治療薬ハンドブック 2018ー薬剤選択と処方のポイントー】(2018年1月15日発行)におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに、深くお詫び申し上げます。

2018年3月19日

275 ページ 13 皮膚科用薬

尿素 (ウレパール, ケラチナミン, パスタロン) 適応症

誤	正
<p>適応, 用法・用量 魚鱗癬, 老人性乾皮症, <u>アトピー性皮膚炎</u>, 進行性指 婦湿疹の乾燥型), 足趾部皸裂性皮膚炎, 掌趾角化症</p>	<p>適応, 用法・用量 魚鱗癬, 老人性乾皮症, <u>アトピー皮膚</u>, 進行性指掌角 湿疹の乾燥型), 足趾部皸裂性皮膚炎, 掌趾角化症, 毛</p>

863 ページ 46 ビタミン剤・栄養輸液

ピリドキサルリン酸エステル水和物 (ピドキサル, アデロキザール) 適応症

誤	正
<p>適応, 用法・用量 ビタミンB₆の欠乏又は代謝障害の関与が推定される次の 角炎・口唇炎・舌炎, 口内炎, 急・慢性湿疹, 脂漏性滲 皮膚炎, <u>アトピー性皮膚炎</u>, 尋常性痤瘡, 末梢神経炎, 害(宿酔)]. ビタミンB₆の需要が増大し食事からの摂取</p>	<p>適応, 用法・用量 ビタミンB₆の欠乏又は代謝障害の関与が推定される次の 角炎・口唇炎・舌炎, 口内炎, 急・慢性湿疹, 脂漏性滲 皮膚炎, <u>アトピー皮膚炎</u>, 尋常性痤瘡, 末梢神経炎, 放 (宿酔)]. ビタミンB₆の需要が増大し食事からの摂取</p>

236 ページ 11 眼科用薬

レバミピド (ムコスタ) 副作用

誤	正
<p>副(重)大 <u>尿道閉塞</u>, 涙囊炎</p>	<p>副(重)大 <u>涙道閉塞</u>, 涙囊炎</p>

誤	正
<ul style="list-style-type: none">慢性突発性蕁麻疹にオマリズマブ投与が有効なことがある	※ 削除