

「病院感染対策ガイドライン 2018年版」訂正のお知らせ

ご購入いただきました『病院感染対策ガイドライン 2018年版』（2018年 8 月発行）におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2020年12月18日

正誤表

| 刷                 | 頁   | 誤  | 正   |
|-------------------|-----|--|---|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 11頁 | 下から6行目<br>ただし一部のウイルス(エンベロープに脂質が少ないノロウイルスなど)や<br>( <i>Clostridioides</i> [ <i>Clostridium</i> ] <i>difficile</i> などの) | ただし一部のウイルス(エンベロープに脂質を有さないノロウイルスなど)<br>や( <i>Clostridioides</i> [ <i>Clostridium</i> ] <i>difficile</i> などの) |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 14頁 | 下から2行目<br>80°Cの温水で   | 洗濯時には80°Cの温水で<br>※赤字を追加   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 22頁 | 表1<br>「マスクゴーグル」の<br>項<br>「空気予防策」欄<br>部屋に入る時にタイプN95微粒子用マスクを着用   | 部屋に入る時にN95マスク(レスピレータ)を着用  |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 25頁 | 下から9行目<br>風症   | 風症  |

正誤表

| 刷                 | 頁   | 頁  | 誤                         | 正                             |
|-------------------|-----|--|---------------------------|-------------------------------|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 26頁 | 11行目   | このこと医療現場を                 | このこと <b>が</b> 医療現場を<br>※赤字を追加 |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 30頁 | 別表<br>「ノロウイルス」の項<br>「予防策：種類」欄                    | <del>標準</del>             | 接触+標準                         |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 30頁 | 別表<br>「ノロウイルス」の項<br>「予防策：備考」欄<br>4～5行目           | …ウイルスがこれらの <b>体</b> 物質から… | …ウイルスがこれらの <b>生体</b> 物質から…    |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 31頁 | 別表<br>「ウイルス性出血熱」<br>の項<br>「予防策：備考」欄<br>下から5～4行目  | 二重手袋、脚と <b>靴</b> のカバー     | 二重手袋、脚と <b>靴</b> のカバー         |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 33頁 | 別表<br>「クラミドフィラ・<br>ニューモニエ」の項<br>「予防策：備考」欄<br>1行目 | 収容されている人々における…            | <b>施設に</b> 収容されている人々における…     |

正誤表

| 刷                 | 頁   | 頁  | 誤   | 正  |
|-------------------|-----|--|---|--|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 34頁 | 別表<br>「結核：肺または喉頭<br>疾患、疑い」の項<br>「予防策：備考」欄<br>1行目 | 感染性結核症の可能性が <b>虫</b> できるほどであり…              | 感染性結核症の可能性が <b>無視</b> できるほどであり…                      |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 34頁 | 別表<br>「結膜炎：急性ウイル<br>ス性」の項<br>「予防策：備考」欄<br>1～2行目  | <b>塩</b> テロウイルス70                           | <b>エン</b> テロウイルス70                                   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 35頁 | 別表<br>「サル痘」の項<br>「予防策：備考」欄<br>1行目                | <b>最も最新の</b> 勧告には…                          | <b>最新の</b> 勧告には…                                     |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 37頁 | 別表<br>「感染症/病原体/状<br>態」欄<br>1項目                   | 種痘疹関連多形成 <b>後半</b>                          | 種痘疹関連多形成 <b>紅斑</b>                                   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 38頁 | 「感染症/病原体/状<br>態」欄<br>7項目                         | <b>肺炎球菌性Pneumococcal</b><br>種類： <b>(空欄)</b> | <b>肺炎球菌Streptococcus pneumoniae</b><br>種類： <b>標準</b> |

正誤表

| 刷                 | 頁   | 誤                                   | 誤                      | 正                        |
|-------------------|-----|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 38頁 | 「感染症/病原体/状態」欄<br>下から8項目             | スポロトリス症                | スポロトリコーシス(スポロトリウム症)      |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 39頁 | 「带状疱疹:免疫システムが正常な患者…」の項<br>「予防策:種類」欄 | 標準                     | 接触+標準                    |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 39頁 | 「带状疱疹:免疫システムが正常な患者…」の項<br>「予防策:期間」欄 | DU                     | 病変が乾いて痂皮化するまで            |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 44頁 | 「感染症/病原体/状態」欄<br>1項目                | ヒトメタロニューモウイルス          | ヒトメタニューモウイルス<br>※赤字の削除   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 44頁 | 「風疹」の項<br>「備考」欄<br>下から3行目           | …曝露後 <b>控値</b> の接種の有無… | …曝露後 <b>ワクチン</b> の接種の有無… |

正誤表

| 刷                 | 頁    |                                 | 誤                           | 正                           |
|-------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 46頁  | 「感染症/病原体/状態」欄<br>3項目            | ム <b>コ</b> ル症               | ム <b>ー</b> コル症              |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 46頁  | 「ライノウイルス」の項<br>「予防策:備考」欄<br>1行目 | 飛沫が最も重要 <b>並</b> 伝播経路である。   | 飛沫が最も重要 <b>な</b> 伝播経路である。   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 73頁  | 6行目                             | <b>社団法人</b> 日本感染症学会         | <b>一般社団法人</b> 日本感染症学会       |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 77頁  | 表1注釈*2<br>2行目                   | …パルボウイルスB19 <b>や含む</b> 未知の… | …パルボウイルスB19 <b>を含む</b> 未知の… |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 145頁 | 10行目                            | <b>高度無菌的</b> バリアプリコーション     | <b>マキシマル</b> バリアプリコーション     |

正誤表

| 刷                 | 頁    |                         | 誤                      | 正                        |
|-------------------|------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 234頁 | 下から1行目、2行目<br>(計2箇所)    | PICRA                  | PCRA                     |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 247頁 | 下から6行目                  | 擦式アルコール手指 <del>薬</del> | 擦式アルコール手指 <del>消毒薬</del> |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 248頁 | 下から10～9行目               | <del>蒸気</del> 過酸化水素    | 蒸気化過酸化水素                 |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 249頁 | 下から18行目                 | 蒸気化 <del>過酸化水素水</del>  | 蒸気化 <del>過酸化水素</del>     |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 252頁 | 表3<br>「灌流法」の項<br>「注意点」欄 | <del>まず</del> 腔内を…     | まず <del>内腔</del> を…      |

正誤表

| 刷                 | 頁    |   | 誤  | 正  |
|-------------------|------|---|--|--|
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 253頁 | 表4<br>「エボラウイルス症<br>…」の項<br>「消毒方法」欄<br>6～7行目 | 70%アルコール，消毒用エタノールで <b>拭漬</b> あるいは…   | 70%アルコール，消毒用エタノールで <b>清拭</b> あるいは…   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 253頁 | 表4<br>「ベスト」の項<br>「消毒方法」欄<br>5～9行目           | 0.2%第4級アンモニウム塩や両性界面活性剤で <b>拭漬</b><br>0.01～0.1%( <b>1,500</b> ～1,000ppm)次亜塩素酸ナトリウムで <b>拭漬</b> あるいは30分<br>浸漬 | 0.2%第4級アンモニウム塩や両性界面活性剤で <b>清拭</b><br>0.01～0.1%( <b>100</b> ～1,000ppm)次亜塩素酸ナトリウムで <b>清拭</b> あるいは30分<br>浸漬 |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 256頁 | 2～3行目                                       | (Good Man <b>j</b> ufacturing Practices : GMP)   | (Good Man <b>u</b> ufacturing Practices : GMP)   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 350頁 | 「勧告文」欄<br>6 周辺環境整備およ<br>びリネンの取り扱い<br>のC     | 80°Cの温水で   | <b>洗濯時には</b> 80°Cの温水で<br><b>※赤字を追加</b>   |
| 第1刷<br>第2刷<br>第3刷 | 370頁 | 「勧告文」欄<br>5 気管切開 のb                         | <b>高度無菌的</b> バリアプリコーション  | <b>マキシマル</b> バリアプリコーション  |